

Paspalum

recurvum P. species alterni bupleburi subquadrifari, ^{per} recurro rachis

caudata flojulis subobtusis ^{longis}

Habitat in India orientali facies fere Pappi ^{ut pila uno altero} per virgati ad spica

basi cum barbato flojuli ^{seu non villosi} spica ⁱⁿ inter 10.

remoto

caudata

^{longioris}

trijollicares ^{per} majores ^{minoris} rachis ^{convexa} dorso

recta. Lemna ope lentis ^{trans} rari ^{sub} nata. Pedunculis ^{com} muni ^{alternati} excavatus

conjugatum P. spicis duabus horizontalibus conjugatis, spiculis ovatis, culmo erecto
foliis involutis Sw-prodr. pag 21.
Paspalum conjugatum Sw-prodr. Bergr. Act. helv. 7. 129. T. P.
Habitat in India Orientali occidentali

brachy
macrospachus: P. spicis alternis, floculis bifaris subrotundis villosulis

Habita in India occidentali

Stem planum longe margine scabra. Spicis alternis sespilis
peltatis, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rachis flexuosa floculis parvis

a Swartzio quoque misit sub nomine suspecti cum signis
dubitacionis

repens Paspalum spicis paniculatis subvestimentis multistachyis, densis
reperitur Berg. Helv. T. p. 129 Tab. 7.
Habundat in Surinam.

~~radice caespit.~~ non vidi

verticillatus
verticillatum P. spicis oppositis alternisque approximatis, flosculis quadreplura
seria fillofis foliis planis pilosis.

Habitat in India occidentali in Swati.

Culmus altus. Folia profertim subtus pilosa, longa. Spicae compositae
pollicares, ^{leptiles} floris inferas basi alternis deum oppositis, demum ver
ticillatae, basi pilosa. flosculi parvi subrotundi valvuli uniserialiter

appresum Paq. spici plantis fissilibus alteris culms appresis, flentibus
ovatis acuminatis hirsutis La Mart. Fr. Enc. 103 176.
Habitat in America meridionali

non pidi

erigatum speculis paniculatis alternis basi villosis, floribus geminis L. V. p. 1054

Spec. pl. p. 81 + Gaicu. coll. p. 112.

Gramen dactylon majus, panicula longa, spicis plurimis nuda crassis.

Nov. hist. 1. p. 112. t. 64. fig. 2.

Habitat in Jamaica

Culmus teres striatus vaginatus glaber. folia glabra tenuiter ciliata
elongata margine scabra. vagina ap. mo ^{superne} margine ciliata
spica ^{superne} paniculata 10. remota inter alternas ^{superne} pithamos
superius minoribus subsessilibus. rachis basi villosa ciliata undulata dorso
plana. glomeruli quadruplex ^{alter parum altior inaequaliter} ^{subrotundus} geminatus alter parum longior
nuda villatus alter brevior altero ^{subrotundus} convexo altero ^{subrotundus} planiore
valculo medio nervo, margine villosa.

villulae margine villosi

— subrotundis quadruplex
bene

quadripartitum Pasp. spicis plurimis erectis subpaniculatis, glumis ovatis 3-4
fariis, rachis pilosa La Mart. T. Exot. pag. 176

Non hist. 1. Tab. 69.

an Paspalum virgatum Gaey. coll. 1. 112. u. var. 1.

Habitat in monte Dros

glumis acutiusculis

Species Paspali virgati rachides post barbatae flosculi quadruplicate serie et
differe flosculis oblongis pilis nonnullis longis ad basin pedicellorum
se fallulo ore latis villosae

— alternis subpaniculatis, flosculis ^{oblongis} geminis quadruplicate
quadripartitis, rachis pilosa.

paniculatum P. spici paniculatis verticillato aggregatis Lin. Spec: pl. p. 81 +
gramen miliaceum, panicula viridi s. purpurea Roem. hist. 1. p. 115
t. 72. fig. 2.

Habitat in America

Tacca paspi virgati. Culmus altus. folia plana striatissima.
floresuli ^{margine} triplici serie parum missos. spica basi pilosa
alternis vel suboppositis cernitur 10

— floresuli trifarii ^{valvulis margi}
^{ne glab} alternis suboppositisque foliis margine striatis

non vidi

Centifera Papp. specis altera in seplibus, floribus compressis Centiformibus
glabris subinfans La Mart. P. Encycl. perz 1751
Habitat in Carolina

non vidi

Paspalum

Habitat monte video Commejon herb. Thonini
Culmi glabri. Folia linear-lanceolata. Vagina glabra, ore pilosa, ligula membranacea. Spica pedunculata alterna, distantes 1-3 pollicares. flosculi trifarii, ovati, acuti; valvula margine hirsuta

Ciclos folium Pappalum

Habitat in Carolina herb. Richard

Interdum monostachyum a suprema vagina

habes

Paspalum purpureum culmi inferne rursis, panícula oblonga, spicis li-
nearibus; floribus secundis bifariam imbricatis fl. Penw. 1. p. 47.
miliam latifolium

Cavan. 3. pag. 37. tab. 273.

Habitat in Penw. cultis et lina

glebula Radix fibrosa. Culmi numerosi, bi-3 pedales, inferne ramosi et radiantes
solidi. ^{truncati vel plicati} folia lanceolata. Panícula purpurea composita a spicis pluribus
spicis approximatis pedicellatis demum patentis, tandem strictis. Glumae
bivalves uni flore compressae, oblongae, purpureae acuminatae, disco nigro striata
Corolla calyce brevior, valvulis obtusis fl. Penw

describere Paspalum

Habitat in Carolina herb. Richard.

Spica interdum duo superna.

grosſum Paspalum

Habitat in Georgia herb. Guſſ.

Culmi pedales, erecti, ſimplices, vaginis veſti. Vagina inferior, villoſa, ſuperiores
glabra, ſtriata, foliis longiores. Bala glabra, glaucis viridia, inferiora basi villoſa,
marginibus ciliata. Spicula tres, altera nuda, bipollu arcu, ſeptem, basi pilis
nonnullis. Floſculi duplici ſerie, pallida virides, centi formes, majores quam
in reliquis ſpicibus

micranthum Paspalum

Habitat in Puerto Rico herb. Anj.

Culmi repentes, elongati, ramosi, filiformes. Vagina internodiis brevior; margine ciliata. Folia pollicaria, lanceolata, glabra. Spica teres, superne, unguiculari, secundo. Flosculi bifarii, oblongi minimi.

polypum Paspalum

Habitat hab. La Martini

Culmi inferne compressi, uti folia, vagina et pedunculi villosi: vagina longa
Folia laniolata, pollicaria. Pedunculi axillares et terminales solitarii, elongati.
Spica solitaria. Rachis basi barbata, fere pithamoa, dorso convexa, altero
latere pulso. Oculi gemini, alter parum elevatur

breve Paspalum

Habitat herb. La mentii
flosculi villosi

Lineare Paspalum

Habitat herb. in Mauritii

Culmi plures basi pubescenti, pedales: vagina pilosa. Folia linearia, glabra
Pedunculi terminaliter, saepe 4or, elongati, capillares. Spica 4-5. filiformes,
aetern.

Dilatatum Paspalum

~~Herbitat~~ herb ha Martini

Folia linear-lanceolata, spica 3. Duo inferiores, sespiter. Floruli 3 plus
ferri, villosa margine

Centipedium Paspalum

Habitat herb. La Martini

Folia angusta. Spicae 40x remotae, inferiores 3, subsessiles, pollicares;
biseriatae. flosculi subrotundi

mutans Paspalum

Habitat. herb. la Mantini

Culmi isomphi. vaginas et folia villosa. Folia subundulata. Spica variegata
solitaria, mutans, pollicaris, bipartita, glabra

Commespina Paspalum

Habitat herb. La Mancha

Culmi sesqui-pedales, erecti. Tota linear-lanceolata, glabra, pedalis, marginata scabra. Spica alterna, tripollicaris. Pedicelli basi barbati. Glomuli bipartiti, mediois.

Commandeleanum Paspalum

Habitat herb. la. Mantua

Spica axillares et terminales, 3-4. alternis. Florent. duplici serie

Dehile Paspalum

Habitat

herb. la manthe

Culmi ramosi - folia linearia, glabra - Spicae 5que, alternae, lineares

Desfont.

Fernigenum P. spicis alternis, flosculis bifariis orbiculatis ferrugineis glabris
in his subciliatis foliis subundulatis

Habitat in Ind. occidentali?

Solca margine patru spicae sesqui pollicari. Spicae sessiles trinites
novem sesqui pollicari ruli aequat ad basen

Scrobiculatum Paspalum spicis alternis, rachis membranacea, floribus alternis
calycibus multinerviis scrobiculatis Mart. 29 & L.V. p. 104

Habitat in India orientali 2

Culmi erecti, basi hirsuti, pedales et ultra. Vagina foliorum purpurea
fientes, margine ciliata et basi genicula reflexa, hirsuta.

Glauca tercia, supra linea alba longitudinali. Spica alternis,
lope reflexo. Rachis lata membranacea. Calyces subrotundi, orati
glabri, multinerviis, obtusi, gibbi: valvula planiore basi intrusa,
et in medio pari scrobiculorum improprie M. C.

an specimen nunc a Rongio Linnæi et ab Disperso Linnæi
est defect.

proct. P. spicis alternis, flosculis infanis, medus flosculis - Walt. fe.

carol. pag 75-

Habitat in Carolina

non redi-

obtusifolia

~~P. speciosifolia? ulatis plunmis flopiuli subulatis, folius linea
nbus obtusis~~

~~Habitat in India orientali occidentali~~

~~Calami pedales basi ramosi compressi vaginis compressis inflexis
infractis, bracteulatis. Folio sesquipedaliano glabra
specio 6-7. bipolliciano, flopiuli sesquipedali~~

an eadem ut C. radice

Coromandelianum Papp. spicis alteris sesquipedibus, floribus orbiculatis
bifariis glabris, rachis semi-septifera La Mark T. Enc. pag. 175.
Habitat in India orientali
an si orbiculatum ten.

non vid.

an orbiculatum Kunzei

~~Cymbasium~~
~~membranaceum~~ Paspalum species alternis sesquibus, rachemembranacea cymbi
formi, floribus trifloris hispidis, pennis La Mark *Fl. Enc.* pag. 177. Tab. 43
fig. 2 (membranaceum)
Habitat in Peru
flore matris: corolla glabra

non vidi

membranaceum ^{Spica alternis}
P. Spicatis bifaris, culmo ramo prostrante

Walt. fl. car. p. 75

Habitat in Carolina

non radi

trifoliata Galpica Aubl. fl. Gu.
Habitat in Guayana

pag 662. 8. 267

non vidi

obscure P. spica alternis, flosculis bifariis orbiculatis glabris, foliis
involutis

Pappalum ~~obscure~~^{se} spica alternis, rachis membranacea, flori-
bus duplici ordine secundis orbiculatis lobatis Forst. prod. pag 7
Habitu in 4^{to} Societatis in pila
Rachis plana, margine ore lentis ciliatis spica basi rollo pilis.
flos duplo minori quam in sericato et involuto

involutur P. spuis ternis alternis, flosculis bifariis glabris oblongis.

Folius involuto setaceis

Habitat in Bononia

Culmus erectus. Sagina ciliata folia involuta erecta angustissima
extus vix latis ^{geminis} villosa spica ^{pedicellata} fasciata remota basi barbata ^{altis longior} hypoleuca
vix flosculi obtusi magni lobis convexis trinerviis gemina nigrican-
tia rachis plana flexuosa.

Aspectum P. Spicis alternis, rachis membranacea, floribus alternis apice pelopis

Lin. Spec. pl. pag. 81. 4

Gramen panicum spica simplici adcaulem intervallata binis granorum
ordinibus uno versu constante Plukin. mant. 9. t. 350. fig. 2.

Habitatio America calidior

Gramen prostratum foliorum vaginis fere prothaceis. Spica panicum
rachis membranacea dilatata ad latitudinem spicae opposita
et secundo. flores umb. orbiculati valvula unneris

Lamina in meo fuso negueantia ore latis longitudinaliter
[sub]dispositi concutit quoque cum figura Plukin

racemosum Pasp. spicis numerosissimis subverticillatis brevifloris patentibus
glumis ovatis latentibus plicato-crispatis de Moench T. Enc. pag 176

Habitat in Peru

Glume acuminata, bifida. Spica 30-40 in racemo digesta

Calami vaginantis. Folia plana 3-4 polliciana unguem lata
levia, margine oreque glabris. Spica verticillata ^{unghuicillata} remota. ~~floribus~~

marginis undulatae ~~et~~ verticilli remoti, bifidae glabrae. rachis lineari angustissima. ^{subrepens} flocculi
longe lentis velo ferrugineo flavo oblongo aucto porro (marginis undulatae
lo.)

villosum P. specis alternis secundis, rachis hispida, floribus duplici ordine al-
ternis secundis Thunb. fl. jap. p. 1. v. pag. 105
Habitat in Japonia

non vidi.

parviflorum P. specio alternis lineantur, flosculis subrotundis lobis trifloris
lax-imbriatis glabris

Habitat in India orientali.

vagina sub specio infima glabra ore barbata. specio remotopaniculato
5 pollicares basi pili aliquot. flores parvi

reperitur
villosum. P. spicis alternis filiformibus brevibus; flosculis bifariis oblongis
acutis culmi basi inferne repentibus foliis villosis

Habitat in Sumatra

geniculi inferiores radiculis copiosissimis longifiliiformibus
infractis. culmi vaginati. folia angusta tripolluciana.
Spicae frequentes prolixae simpliciter glabrae - flosculi non barbati
flosculi parvi compressi

Compressum P. folios Spica alternis filiformibus floribus alternis
trifloris lanceolatis, Culmo compresso foliis lanceolatis

Habitat in montibus de Ryan.

Vagina longa glabra margine ciliata. Solia bipollicaria semina
quem lata glabra obtusa pupula spica ceteris spica, tri-pollicaria
flores foliis tamen fere uniferatis parvis acuti. Rachis flexuosa

umbellatum Paspalum spicis linearibus digitato-umbellatis, glomerulis
compressis acutis sessilibus, culmo repente La Mark ~~St. Louis~~ per

1777.

Habitat in Insula Smarica

non vidi

Asphaenon Papp. Spicis ternis subdigitatis filiformibus, glomerulis sesquialteris
oblongis aeternis La Mart. T. Cui: pag 176
Habitat in America meridionali

non vid.

Commespouii specis Vernis, infima pedunculata, flombus orbiculatis
glabris bifariis, vaginis ore pelosis La Moeth T. Enc. pag 176.
Sub. 43, fig. 1.
Habitat in Angula Francie

michi non videtur si non ~~probabiliter~~ ~~hanc~~

capillare Pasp. species geminis ternisve filiformibus, pedunculatis capillo-
ribus, floribus orato-oblongis albis La Mart. fl. T. Cap. 176
Habitat in America meridionali

non vidi

in brevifolium

vaginatum P. Specis duabus, speculis bifariis acuminatis, caule ramofo genicula
to, geniculis vaginatis Sw. prod. per. 21.
Habitat in Jamaica.

Descriptis in Diffusis quere

per

~~Michx. Gardener~~

Di. Hitchin P. spuis duabus alterna sessili, glombis acuminatis Lin. am. aia
6. p. 3914 Spec: pl. pag. 224 Sw. obs. pag 35

Habitat in Jamaica
Gramen ductylon bicorne repens, folus latis brevioribus Sloan hist. 1.
inferne vaginis textis primis conulatis

Palmis simplex ^{inferne vaginis textis} ^{radicem} ^{caudicibus} ^{folia} ^{lanceolata} ^{acuta}
plana brevia. Vaginae ^{inferne vaginis textis} ^{radicem} ^{caudicibus} ^{folia} ^{lanceolata} ^{acuta} ^{terminales} ^{breves} ^{erectae} ^{scissae} ^{per} ^{se} ^{quasi} ^{valvula} ^{uni}
nervis ^{acutis} ^{minuta} ^{ad} ^{basin} ^{per} ^{folia} ^{alt.}

interdum

tota descriptio
ad *cyperaceum*
habetinet

— floribus ovatis glabris ligulatis
foliis planis

Conjugatum
tenue Pasp. specis gemini ternoque filiformibus glomerulis trifloris geminatis.
subrotundi ciliatis
conjugatum
Paspalum Tenue V. ery. in Act. Helvet. 17. 129. 4. 0
Habitat in America meridionali.

Culmi pedales basi infracti articuli fusci, vaginati. vagina
ciliata uti fragras foliorum ore latis. Solia plana lanisolata
3 polluciana specis terminali plerumque gemini alter
pedunculatus interdum tertia inferior sessilis 5 polluciar
angusta glomeruli flavescientes parvi.

Paspalum Conjugatum specis duabus horizontalibus conjugatis, speculis
ovatis culmo erecto, foliis involutis Sw. prodr. pag. 21

trivorne Paspalum species geminis longis subfiliformibus, flopidis alternis
lesplibus, corollis hirsutis La Mark P. Enc. pag 176
Habitat in India orientali

ad hoc genus pertinet spec. Dr. La Mark

Panicum dactylon et sanguinale an Panicum glumis ciliatis

non vidi

Ulex Papp. spec. diobus, flombis subobovulatis compressis pilosulis
bifariis hispulis. La Mart. T. Enc. pag 175.
Habitat in America calidior.

an eadem cum *Ulex* ~~ca~~ conjugata

ramosum P. spicis geminis, flosculis basi orbiculatis glabris villos
ramos, foliis conduplicatis

Habitat in Cap. b. spici daldorph

Calami inferne geniculis fructis. vagina ex pilos foliis
angusta. Spicis terminales geminis sesquipedali pollicari facie
Raspali despecti basi glabri. Rachis flexuosa

Cactum P. spicis geminis altero ~~ter~~ terminali, flokulis oblongi bifariis
foliis nigre latis: ulmo ramoso
Habitat in India occidentali
Rachis valde flexuosa. Pulmi rugini laxis.

Valvula 4to villosa Rich.

~~non~~ *Di.*

Pubulata Pasp. spicis geminis, flospulis bifariis oblongis acutis glabris, foliis
involutis

Habitat in India orientali Kony

geniculis infraactis. Paei Panu: Distachythi folia glabra in-
louta sesqui polliciana glaucis vinda - Spicis duo terminalis
pedunculato pollicari utrosque curvata flospuli compressi
subspiles

an Pappal longiflorum Retzi

heri pitem Papp. spicis alternis subbinis, rachis membranacea, calycibus multi
nervis lobatis, foliis pedicellisque herpatis Petz. off. 2. p. 7.
Habitat in China

non ed:

pileolum Paprat. *Fructu solitarii, flexuili elliptici alternis confectis, rachis pileo*
foliis villosissimis ha Mack. T. Enc. pag 175.
Habitat in America calidior.

non vid.

~~filiiforme P. spica subglobosa linearis secunda, spiculis alternis ovatis com-
pressis, culmo foliisque filiformibus linearibus Sw. prodr. pag. 22.~~

Habitat in Tamaica.

Culmi ramosi decumbentes, glabri compressi geniculis inferioribus
radicantibus, ^{inferne} ~~erectis~~ foliis ~~an~~ articuli bipollicari-^{superiore}
vaginis ^{basin} ~~rectis~~. folia angusta bis. tripollicaria, ^{marginibus} ~~pubescentibus~~
marginibus ^{basin} ~~undulatis~~ ^{marginibus} ~~undulatis~~ ^{marginibus} ~~undulatis~~
et ses. minores, pedunculata axillari-
que solitarii rarius vel tres glauculi gemini brevissime ^{pedicellati}
subrotundi: altero latere convexi altero plani cum ^{valvula} ~~spicula~~ ^{minuta}
calycina ad basin

~~Decumb~~ Pappalum decumbens spica unica secunda, pedunculis longissimis
spiculis alternis orbiculato acuminatis glabri, culmo proci-
bente

— ^{spiculis}
subrotundi obtuso

culmo repente

affine repenti

non videri

filiiforme P. spicis subglobosis linearis secundis, spiculis alternis ovatis
compressis, culmo folisque filiformibus Sw. prodr. pag. 22.

Habitat in America

Culmi sesquipedales inferne vaginati superne aphylli. Folia
omnino ^{glabra} angustissima. Spica terminalis bipollicari
foliaria basi pili aequat. flori minuti gemini alter pedicellatus
valvula altera convexa emissa altera plana

Decumbens Papp. Spica unica secundata, pedunculis longissimis, spiculis
alternis, orbiculato acuminatis glabris, culmi prostrante
Sw. prodr. p. 22.
Habitat in Jamaica

non vidi

nutans Pasp. spica uncinata nutante, glomerulis alternis ellipticis hinc compressis
glabris, foliis villosis La Mart. T. Enc. pag 175.
Habitat in America meridionali

non vidi

Paspalum spicis subtus lanatis d¹⁴ Herodotus genero Distractum Tropis d¹⁵ Item

herb
Dich (Paspaliculatum
vidi pedunculis plumbis usque ad 13
paleis & vel compositum
spica pluma. raris hirsuta