

Paserna

1. *foliiformis* P. foliis linearibus quadrifariam imbricatis acutis floribus axillaribus subracemosis
2. *encodes* P. foliis linearibus quadrifariam imbricatis, floralibus subrotatis, floribus subcapitatis
3. *tetragona* P. foliis carnosissimis quadrifariam imbricatis, ramis tomentosis, floribus capitatis
4. *ciliata* P. foliis lanceolatis subciliatis erectis, ramis nudis
5. *linifolia* P. foliis linearibus supremis ciliatis erectis
6. *capitata* P. foliis linearibus glabris, capitulis pedunculatis tomentosis
7. *uniflora* P. foliis linearibus oppositis, floribus terminalibus solitariis, ramis glabris
8. *anthyllodes* P. foliis oblongis villosis, floribus capitatis hirsutis
9. *laxa* P. foliis ovatis sparsis, floribus capitatis, ramis laxis cernuis (caulis ad collum)
10. *grandiflora* P. glaberrima, foliis oblongis acutis concavis extus rugosis, floribus terminalibus sessilibus solitariis
11. *puicata* P. foliis ovatis villosis, floribus lateralibus solitariis

12. hirsuta P. foliis ovatis carnosis ceteris ramisque tomentosis floribus terminalibus
 Ceteris 4 & 5 collocatur
13. axillari foliis oblongis alternis floribus axillaribus solitariis
14. grisea P. diandra glaberrima, foliis lanceolatis acutis
15. pilosa P. diandra, foliis linearibus obtusis ramis pilosis tomentosis
16. serpyta P. foliis lanceolatis acutis pilosis, ramis tomentosis (oppositis v. oppositis)
17. prostrata P. diandra, foliis oblongis carnosis decussatis, ramis pilosis floribus
 terminalibus aggregatis
18. cornucopia P. foliis linearibus lanceolatis glaberrimis, involucri monophylli
 trisulcato, ^{marginatis} caule herbaeo
19. involucriata P. foliis lanceolatis glaberrimis, floribus ovatis floribus
 longioribus ramulis glabris

Risfuta Pasenna ^{Pasenna} foliis carnosis satius glabris, caulis tomentosus L. S. V.
pag. 374

Pasenna Metnan; foliis ovatis, incurvis, quadrifariam
ombriatis, caule tomentoso; floribus congestis, sessilibus termi-
nalibus Torff. Depr. pag. 81. no 51

Shaw iter no 5. 87.

Planta frequens in Europa Australi, Copiosissimam vero vidi
in variis locis Regni Tunciani ubi cum Rosmano profolis inseruit
Rami apice nutantes.

Flores 6-10 in capitulis, lateralibus, vel terminalibus, sulphureis
Artheni fulvis.

Involucrum pentaphyllum, sub singulo capitulo

(Planta junior absque tomento in caule et pagina superiore foliorum
foliis, deorsum foliis faciem diversam habet ad facile prodiverga
se primo intuitu differens videtur. Floret mensis Februarii
Floret mensis Februarii in Tuncia Tuncum ubi etiam profolis
cum Rosmano inseruit

1. feliiformis Passerina foliis linearibus quadrifariam imbricatis ^{acutis} floribus axillaribus
subracemosis

Thymelaea aethiopia fruticosa, foliis in longum striatis, furculis valde tomentosis

Passerina foliis linearibus Hort. Cliff. 246. t. 11. *

Passerina feliiformis foliis linearibus convexis quadrifariam imbricatis,
ramis tomentosis Lin. S. V. pag 374. *

Habitat in C. bonae spei

Index ramosis firmis. Rami teretes circiter 1/2 lineae superiores tomentosi, inferius
solia opposita, erecta, semiunguiculata, triquetra glabra: glabra
basi margine lato membranacea. flores ^{terminali} ~~in~~ ^{ad} apices ramorum

in tuis basi albis. pediculis axillaribus oppositis sessilibus tubo basi globoso villosis albidis. floribus interis
perplexis globosis

linearibus triquetris acutis ~~et~~ floralibus
ovatis acuminatis floribus axillaribus

2 encoides *Paspina* foliis linearibus quadrifariam imbricatis floralibus subordatis
^{floribus subcapitatis}
Paspina encoides: foliis linearibus levibus subimbricatis, corollis globosis
Lin. Mant. p. 236* S. V. pag 374.

Habitat in Cap. bona spetz
Semel procedenti differt foliis brevioribus videntibus obtusis. floralibus
ovatis obtusis minime in ba angustata acuminata. floribus distinctioribus
flora in capitulum fere congesti.
folia floralia ^{at cava partibus tenuis} intus hispida usque. corolla tubus basi globosis. Stamina
tuba corolla dimidio longiora. semina ovata atra nitida corollam
tubus basi basi globosis

^{truncata}
intus incana floralibus ovatis obtusis

Specimen herb. an. fide formis var

4 *Casta Parfenna* foliis ovatis parvis, floribus capitatis, ramis laxis cernuis Lin. Suppl.
pag 226. S. V. pag 394.

Habitata in P. b. Speitz

Similis *P. enicoide*, sed differt floribus capitatis hinc

Pasquina

Habitat in Pyrenaei Ramond herb. Mus. 3

Rami teretes, glabri: ramuli aggregati, breves. Folia unguiculata, sessilia, linearia, subaristata, obtusiuscula, ciliata. Flores axillares, sessiles, solitarii, folio brevioris. Calycis nervosi.

Peyrouse ejusdem speciei putat ut *Daphne calycina*, in *Daphne calycina* autem folia non ciliata, et flores longitudine foliorum

Paspalum?

Habitat ad fretum Magellanicum Comm. in herb. Desfont.
Caulis suffruticosus? palmari, erectus, ramosus: rami teretes, simpliciter, striati, glabri
caule breviores. Folia ovato-lanceolata, scapula, glabra, integerrima, frequentia, nigri-
da, in ramis imbricata, ut unguicularia, nervosa, acuta. Infloresc. terminalis
aggregata, circiter 8, villosa tomentosa. Calycis lacina lanceolata

Urtica Paspensae Poirret

Habitat herb. Guj. 5

Rami dichotomi, villosi, uti folia, tuberculati. Folia frequentis forma, subventricosa, linearia, unguiculata. Flores laterales: calicis ovata.
a vermiculato forte non diversa

Paspalum

Balleteradca Comneson

Habitat ~~habet~~ in alpubus ad fratum magellanicum Comneson herb. Mus.

8 Coseo Verminales, bini, purpureo rubentes; 1 petali. Tubo longiusculo, 4 fido.

Paspenna

Habitat ad fretum magellanicum ³Comm. ⁴herb. ⁵Mus. in sabulosis
Caulis simplex: rami frequentes, alterni. Flores spicati, obsoleti
et albedi

habes

Thyris leucosticta

7 tetragona Paspina foliis carnosis quadrifariam imbricatis, ramis ^{adnatis} ^{inter} ^{que} tomentosis floribus capitatis ~~glabris~~ laciniis utraque glabris

Habitatio Cap. b. p. et y

Rami ~~si~~ ^{si} ^{sub} ^{agite} ^{ad} ^{pice} ^{ramis} ^{obtusis} ^{impositis} ^{glabra} ^{minuta} ^{obtusis} ^{foliis} ^{imbricatis} ^{tetragonis}.
Folia: ^{longalia} ^{cordata} ^{obtusis} ^{nervosa} ^{pulvata} ^{inter} ^{hispidis}. Tubus
allops ^{canus} laciniis lanceolatis glabris

va l... ..

Lucata Pasferina

Canaliculis folijs ovatis oblongis utrinque ramisque villosis herbicenis caulis
villosa P. villosa ^{caulis folijs} ~~caulis folijs~~ ~~caulis~~ floribus terminalibus aggregatis
tomentosa

Sanamunda II. Claf. bot.

Habitat Gebaltano in Schouboe &

Frutex ramis caule tereti ramis copiosissimi ^{ramuli folijs} ^{seti obtusi} ramulosi villosi
conspectus. Folia simplicia parva ^{mollibus} in ramulis quadrifariam imbricata
copiosissima approximata in adibus patentem acuta utrinque
villosa vixi conspectus. Flores terminali simpliciter ^{se}
velis densissimi albedi cincti foliis lanceolatis ramorum paululum longis
ribus perinquinularis

4 Ciliata *Paspenna* foliis lanceolatis subciliatis erectis ramis nudis Lin. Spec. pl. p.
514

~~Sanamunda p. 1 Cliff. h. p. p. 88.~~

~~*Thymelaeae* foliis chamoisae minoribus hirsutis Benth. Bot. Beech. p. 469.~~

Paspenna foliis lanceolatis Hort. Cliff. 146. Gron. orient. 126.

Habitat in Hispania, Oriente &

~~Spec. Pruss. plant. ut et in mea ciliata officinum~~
num Cliff. Sanam. l. vel ne. ciliata caperis Lin. ut
et Barq. in mea unifolia

~~meta ciliata~~

5 *Ciliolata* ^{linianus supremus} *Pasenna* foliis lanceolatis ^{caulis superioribus ciliatis subimbricatis} *pubescentibus*, floribus ^{terminalibus} *racemosis* ^{nodis}

^{Ciliolata}
Berg-Cap. 126.

Habitat in Cap. bono spitz

Rami filiformes perennantes apice ^{pubescenti} pilosissimi. Folia glabra ^{caulis} *convexa* intus *concava* *obtusiuscula*, alterna *suprema* pilis *mollibus* *longis* *nitentibus* *ciliata*.

Pasenna *ciliolata* foliis *lanceolatis* *ciliatis* *subimbricatis* *floribus* *aggregatis* *terminalibus* Berg-Cap. pag. 126

floribus *terminalibus* 4-5 folia *spatha*
tubus *corollae* *superne* *nervosus* *senes* *herpeticus* *albidus*

~~*Dwarf* *folia* *lanceolata* *Bergii* *ciliata* *capensis* *lin*~~

6 capitata *Paspenna* foliis linearibus glabris, ^{arbori ramis} capitulis pedunculatis tomentosis
Lin. S. V. pag. 374 *

Thymelaea foliis linearibus alternis, flore ex uno petiolo copiosis Burm.
Afr. 133. t. 40. fig. 3.

Paspenna capitata: foliis lanciolato linearibus glabris, floribus capitatis
receptaculo incrassato Lin. Am. 6. Afr. pag. 164.

Habitat in cap. bono p[ro]p[ri]o

Trinax ^{virgata} ~~virgata~~ glaber, ramis ^{terribus} ~~terribus~~ feli formibus. Foliis alterna
semirangulata acuta ^{in ripariis} ~~in ripariis~~ Cora. Capitula terminalia, globosa
pedunculata. Pedunculi tomentosi, incrassati. Flores multi abque
tubo ^{brevissimo} ~~brevissimo~~ sessile. Stamina supra faucem 16, quorum 8 interna castrata
Lin

Lochnera phyllioides herb La Mart

7 uniflora Passiflora foliis lineariibus oppositis, floribus terminalibus solitariis
ramis glabris Lin. S. V. pag. 374 + Pers. Cap. 120.

Thymelaea foliis linguatis emicantibus oppositis, floribus ~~solitariis~~ ~~terminalibus~~
~~lobis~~ flore fericeo Burm. afr. 132. t. 40. fig. 2.

Thymelaea ramifera, linearibus foliis angustis flore solitario Burm. afr.
131. t. 40. fig. 1.

Habetatini Cap. 6. fig. 7. ^{caulis cinereo}

Prutia vicia fruticosa ^{partes} glaber ramis patentibus apice subullosi
^{ramulis, per opposita}

folia ^{partes} extus convexa ^{partes} seminaeque ulana, ^{caulis} acuta ^{caulis} imbricata. Flos
floralis ^{partes} concava ^{partes} terminalis ^{partes} sessilis ^{partes} extus ^{partes} canis ^{partes} intus ^{partes} conulis. ^{partes} anthera ^{partes} ad ^{partes} faucem
tubi ^{partes} rudimenta ^{partes} & ^{partes} latens ^{partes} in ^{partes} fundo ^{partes} corolla

12 axillaris Paspalia foliis oblongis alternis, ^{subtus villosis} floribus axillaribus solitariis.

Habitat. --- 5

Truncus ramis vixatis apice ^{tunc hinc velis, et prope subcarecentibus} pubescentibus, tuberculatis a caelo foliorum ^{obtusiuscula}

folia sessilia conspicua femineunguiculata, ^{acutiuscula} ^{terminata} ^{subtus glabra} ^{in superioribus} basi panum angustiora. Capsula oblonga utrinque ^{subtus} acuta.

an diversa a Pasp. puerata

Celesta Pasenna

11 *Guaiata* *Paspura* foliis ovatis vellofis, floribus lateralibus solitariis Lin. Suppl.
pag 225

Habitat in Cap. b. spec. 4

Tamulis floriferis refert speciem foliosam. Lin

Endiculus s. empedalis. Rami sparsi, breves vellofi. Folia oblonga, vellofa,
imbricata, obtusa supra glabra, semunquiculata. Flores axillares, solitarii
sessiles herb. fus.

10 grandiflora Paspina glaberrima, foliis ~~ovatis~~ oblongis acutis concavis extus rugosis
floribus terminalibus sessilibus solitariis Lin. Suppl. p. 226 & L.V.

1374

Habitat in cap. bono specis

Rami uniflori. Colia opposita, subumbriato, obtusa cum acumi-
ne, extus quasi venis elevatis rugosa, intus concava glaberrima.
Ramina octo supra tubum. Stigma capitatum extra tubum.
Diffinguitur facile magnis florum lumbis extus pericis

S. anthylloides ^{foliis} ^{flora} ^{suprema}
Paspina foliis oblongis villosis, floribus capitatis hispida. ^{folia} ^{suprema}
noy. 225

Habitat in Cap. b. sp. t. ^{municati}

Rami inferne villosi, ^{superne} ^{hispidi}. ^{Testes} unguicularia alterna
^{obscure} ^{trinervia}, ^{suprema} ^{hispidissima} uti corollo extus. Flores
pollicares in capitulo ^{obscuro} infra foliis collecti. ^{nitida} ^{lacinia} limbi
flori ^{semitate} nigricantes. ^{tubus} ^{feliformis}