

Passiflora

mollissima Passiflora foliis ovato-lanceolatis villosi mollissimis

Habitat in Martinique Frax.

Caulis terre, uti folia villosi mollissimis tomentosus. Folia 3-4 pollicaria
acuta, triplicinervi, venosa, margine scabriuscula. Petioli breves,
utrinque glandula minuta. Circhi purpurei, villosi. Flores non vidi

pandurata Passiflora foliis cordatis repando subquinquangulatis, petiolis bi
glandulosis, pedunculis multifloris

Habitat in Guinea Frax, an potius in America meridionali?

Caules teretes, glabres. Folia breviter petiolata, bis-tripolliciana, basi sub
transversa, sive nerva, simpliciter venosa, glaberrima, obtusiuscula,
in medio et versus basin parum coracata-lobata, integerrima. P
dunciuli unguiculares, rigidi, 4-5 flori; flores unguiculares. glandula
duo prope basin folii in petiolo laterales.

Passiflora

glandulosa
Passiflora glandulosa, foliis ovatis oblongis utraque glabris integerrimis, corollis
tubulosis.

Passiflora glandulosa, foliis ovatis integerrimis, corollaeis. calyci
nis foliatis biglandulosis: corona omnium brevissima Cavancl.

dissect. 10 pag 453. Tab. 281.

In Cayenna legit von Rohr 5

Rami teretes, fusci, glabri, laeves, rigidi.

Folia petiolata, tripolliciana, ovato-oblonga, firma, venosa; supra
nuda; subtus subreticulata, glaucoscescentia.

Petiolus unguicularis, glaber, versus basin biglandulosus.

Circhi axillares: tuberculum parvum parum supra horum axil-

las
Stipulae caducae.

Pedunculi axillares, longitudine petioli. Pedicelli tres, alter
ni, pollicares, uniflori. Flores purpureae.

Corolla tubus sex pollicaris: laciniis lacunculata exterioribus lan-
ceolata, longitudine tubi; interioribus angustioribus.

Fructus dulcis von Rohr.

rotunda folia Pers. foliis sublobis obtusis subrotundis, subtus punctatis Lin. S. V.

Sp. 322. Gaucq. obj. 2. t. 46. fig. 1. Caban Du J. pag 455. tab 290.
Granadilla folioschederacea, flore albo, fructu globoso villos Plum
Spec. b. Ge. 130. fig. 1. Bamel. obj. proptat. 1. Vitul. fig. 2.

Habitat in America australi &

Folia subtus inter nervos longitudinali ordine punctata. Petalis explan
dulosis. her folia subtus tomentosa puncta nigra

Cuneifolia P. foliis trilobis serratis basi cuneatis byglanulosis,
foleolis calycinis dentis, corona brevi Cavan. Desf. pag
460. tab. 292.

Habitat in America &

Caulis striatus uti tota planta glaber. Stipulae setosae
flores axillares solitarii pedunculati folio brevioribus. Corolla
Impolliciani Cavan

punctata Paschl. foliis sublobis oblongis subtus punctatis: intermedia minore
Lin-Am. Acad. 1. p. 224. fig. 12. tab. V. p. 822x

Granadilla folio truncato obtuso et oculato Sewall. penw. 1. p. 718. V. 11.
Habitat in Pen 4

affinis repens at lobis in medio tres interdum oblongos, rotun-
datis. petioli eglandulosi. Caulis angulatus striatus. Stipulae
setaceae. Glandula axillaris oblonga basi purpurea apice
flavescenti

Passiflora punctata foliis sublobis in latum oblongis subtus punctatis: lobis obtusis intermedio brevior Cavan. des. pag 446.
tab 269.

petioli eglandulosi

Lutea Passifl. foliis trilobis cordatis glabris: lobis ovatis, petiolis glandulosis Hort
New. G. p. 300

Clematis pasionali triphyllis, flore luteo Monf. hist. t. p. 7. f. 1. tab. 2. f

Passiflora lutea: foliis trilobis cordatis aequalibus, obtusis glabris integerrimis
Lin. Am. acad. t. p. 224. fig. 13. S. V. p. 222. Jacq. collect.
2. p. 202.

Habitat in Virginia. ~~et Germanis~~ Jamaica glaucis, saxosis &
Caulis pubescentibus ^{petioli et calyx ex his} foliis subtus glauca impunctata. ~~Tota Louisiana~~ glabra lobi mucro
nati. Sinula petaloeo. Pedunculi filiformes versus apicem geniculati.
Flores parvi lutei.

Passiflora lutea foliis trilobis cordatis glandulosis subpubescentibus:
lobis aequalibus obtusis subanfractis La Mart. Dict. Encycl. no 21.
Caran. dict pag. 444. tab 267

Semilata Cas f. foliis trilobis semilatis, pediculis medio by glandulosis Jacq
obl. tab 46 fig. 2.

Habitat in America.

lobis medio longior lateralibus obliquis glabris glabra. gland
dula conica et albatno. Corol. albo purpurea. Calycis
foliola integra Jacq.

non vid.

lunata Passiflorae foliis bilobis punctatis basi subcordatis byglanulosis, rectam
radiis exterioribus compressis clavatis obtusis Smith. Sic. pict. 1. Tab. 1.
Granadilla foliis lunato, flore parvo albo, fructu succulento ovato
Houstoni Mad. Sic. var. 52.

Passiflora biflora Cavan. Desf. 457. t. 200.

Habitat in Vera cruce, Mexico, Panama &

Caules plures basi lignosi teretibus, superne acutanguli. Folia
basi opposita cordata: lobi valde divaricati elongati integerrimi obtu-
si apice setula armati et setula in medio inter lobulos; subtus
subglanulosa, inter venas majores linea punctarum mellese
rarum. Petioli eglandulosi. Squala parvo semi lanceolata inte-
gerimo. Cuski simplicis. Peduncululi petiolo duplo longiores uni-
flori breviter pubescentes. bractea 3 minuto. Corolla alba defici-
tis Passifl. punct. 1. v. huc pertinet non vero differente

orbiculata Pers. foliis orbiculato-3lobis, tubo conico fructum caete va-
ginante Cavan. Desf. pag 456. tab 286.

Habitat in Insula St. Thomae

Caulis teres. Folia 3 nervii puncto latifrentis ad nervos
laterales interne parallelis. petioli eglandulosi. Stylus
capillares. Circhi breves rari decidui. Flores axillares
bini. Cavan.

non vidi

Congifolia Pasf.

Paspiflora *Congifolia* foliis inferioribus semitrifidis acutis
superioribus integris lanceolatis longissimis: petiolis
biglandulosis La Mart. Det. Enc. no 31. Cavan. Desf. pag
446. tab. 270.

Habitat. in Insula St. Dominici

deberophylla Pasf. ^{indivisi & trilobisque} foliis linearibus oblongis trilobisque glabris, integerrimis,
petiolo ~~periglanduloso~~ Hort. Kew. 3. p. 309

Habitat in India occidentali ^{debili} Innervia ^{ovata}

Tota glabra. Caulis ^{anagyrioides} inferne ^{debulis} suberosus. Folia interdum lanceolata
venosa, ^{utrinque} serrata basi rotundata. alia ² f. triloba: lobo intermedio productione
glabra lanceolata acuta - glandula ^{mucronata} vna in petiolo parum infra basin
foliorum. Stipulae lineari lanceolatae. Pedunculi axillares
gemini oppositi. Flores magnitudine Passiflorae minus

Ciliata Pers. foliis trilobis glabris ciliato-serratis: intermediis longissimis, petiolis
eglandulosis Hort. Kew. 3. p. 316

Habitat in Jamaica

Rami triquetri foliis ovato lanceolatis simpliciter venosa petiol.
pilis raris dispersi

~~1200~~

Raffata Pres. foliis trilobis hastatis, lobis lanceolatis serratis, calycibus multi-
fidis capillaribus

Habitat in Jamaica

Caulis densis tota glabra, petioli eglandulosi flores solitarii. Sepala setacea
Petala anastata. Territura setacea diffanthes. seta etiam amarynosa
petioli utriusque. Sepala ciliata lunata

H. pulcherrima conditis glabris lobis

p-19
parviflora Pasf. foliis glabris: lobis ovatis integris, intermedis productiore, pe-
tiolis biglandulosis, caule herbaceo Schw. prod. p. 97

Habitat in Tamaica

Parsiflora minima Gaertn. bot. 1. p. 1. tab. 20 cum Syn: Loefl. & 247+

Habitat in Tamaica. 4

Differt a minima caule inferne minime pubescente, petiolis glandulosis
Tota glabra. pedunculi saxe gemini. fructus magnitudine lenis

Parsiflora minima foliis trilobis apice acuminato subulatis: petiolis
biglandulosis, fructu globoso nigro Caran. desf. pag 444. tab 266

— lanceolata

minima Paspfl. foliis trilobis glabris: lobis lan. coloratis integerrimis: intermedio prode
tione, caule in ferne suberoso petiolis glandulosis

Paspflora s. flor passionis curasfarica, folio glabro trilobato et angusto
flore flavescente omnium minimo Pluk. alm. p. 202. Tab. 210
fig. 3.

Paspflora minima foliis trifidis integerrimis: lobis sublanco-latis
intermedia longiore Lin. S. V. p. 823. Am. acad. 1. p. 229. f. 18. Cost.
~~Her 247x. Jacq. bot. p. 7. Tab 20~~

Habitat in Curasfao

Pauli junior suberosus. Folia pubtus vix pubescentia

Petiole ^{lineari} glandulosi. Stipulae ~~setae~~ ^{setulae} setosae. Flores parvi
caudae geminis

~~Paspflora minima foliis trilobis apice acuminato subulatis; pe~~

non vidi

~~abiam habes foliis indivisis trilobis quae tota glabra tota heterophylla~~

peltata P. foliis peltatis profunda trilobis: lobis divaricatis, petioli bi
glandulosi Caran. Desf. pag 447. tab 274

Plematis indica, folio angusto trifido, fructu oleoso for mi Plum
Amer. Tab 15

Habitat in Antillis 5

Tota glabra. Caulis teres. Lobi lanceolati. petiolo folio brevior.
Flores axillares solitarii. Corolla plusquam pollicari Caran.


Hederaceae Jacq. foliis peltatis basi orbiculatis supra trilobis crassis cora-
ceis Cavan. du pag 448.

Clematis indica foliis hederaceis majoribus oliviformi

Plum. amer. pag. 70 tab. 04

Habitat in Antillis

Petiole biglandulose

 non vidi

suberosa Passfl foliis trilobis subpeltatis, cortice suberoso ^{glabro} petiolis glandulosis
Passiflora affinis, ^{hirsuta folio americana} folia hederaceo major, fructu oliviformi Pluk
alm. 202. t. 210. fig. 4.

~~Clematis Indica, folio hederaceo, major, fructu oliviformi Plum.
Amer. 70. t. 84.~~

Passiflora suberosa foliis trilobis subpeltatis, cortice suberoso Len. Am.
ai ad. 1. p. 226. fig. 14. Spec. pl. pag. 135. t. 823. Gaerth.
vol. 2. t. 163.

~~Habitat in Dominica, Antillis t~~
β. Clematis Indica folio angusto trifido, fructu oliviformi Plum Am.
p. 70. tab. 85.

~~Habitat in Dominica, Antillis t~~
Cauli debilis glaber. Folia ovata lobi acuti laterales minores breves
horizontales intermedium productior ovatus glandula petiolaris
pino alberrimo. Flores interdum gemini. Pedunculo geniculato
Passiflora suberosa foliis trilobis nitidis, petiolis glandulosis: fructu
oliviformi Casan. de J. pag. 442. tab. 265

aurantia ^{reticulata glandulosa} foliis lobis parabolicis distantibus, ^{emarginatis} medio productione
Gort. prodr. p. 62. C

Habitat in nova Caledonia

Tota glabra folia fere passifl. suberosa at lobus intermedius brevior
late parum longior quam laterales latioribus. subtus glauca impuncta
fo. Caulis angulatus. Flores duplo majores quam in suberifolia
cui affinis videtur. Glandula petiolaris bina opposita

Passiflora aurantia foliis trilobis obtusi lobis medio longiore, petio-
lis biglandulosis tubo vaginante dentato Cavan. Diss. p. 105

457

Solanum lobis subaequalibus parabolicis emarginatis glabris petiolis glan-
dulosis

holosericea Paschl. foliis basi utrinque denticulo reflecto Lin. Am. Ac. 1. p. 226. fig
15 + Si. V. pag 223 + Cavan. Des. p. 459. tab. 290

granadilla foliis hastato holosericeis, petalis candidantibus: fimbriis est
purpureo et luteo vario Mart. Cent. 51. tab. 51.

Habitat in vera Cruce;

glandula duo versus basin petoli oppositi, lobi intermediis productis
re omnes seta terminati. ^{obtusissimi} Trinervia nervi ultra folium et infra

est currentes

Tota planta mollescente villosa. Stipula setacea. Pedunculi saepe
gemini involucris triphyllis foliis setulatis et rudimenta florum
in axillis parvulorum glandula duo in medio petoli.

tomentosa Pasj. foliis trilobis serratis tomentosis, petioli glandulosi, corolla

tubus Conspicuis

Pas siflora ^{tomentosi} foliis trilobis serratis, petioli glandulosi
calycis tubuloso de Mark Det. Enc: pag 450

Habitat in Pennsua &

Caulis, uti tota planta, tomentosus. Petioli pollicari, glandulis & pedicellatis. Stipulae magnae falcatae. Flores axillares solitarii magni. Calyx 3partitus. Corolla rosea tubus sive pollicari. fructus ovato oblongus.
Cavan.

4
hirsuta Puffl. folus villosis: inferioribus supra glabris lobis oblongis integer
nibus; intermediis productione fl. & New. 3. p. 309. ~~Commisuras~~

Fl. passifloris albus; folis ibidem pinnatis trilobatis Herm. pand. 176. t. 176

Plematis indica, flora minima pallida Plum. Am. 74 t. 80. fig. a

Passiflora hirsuta foliis trilobis villosis, floribus oppositis lin

Am. acad. 1. p. 227. fig. 16* Cavan. Ins. pag. 443

Habitat in Dominica, Curacao &

Petrolii biglandulosi

non vidi

foetida Paspfl. foliis cordatis pilosis, calycibus multifido capellanibus. Lin. Am. Acad.
1. p. 228 fig. 17. * Phil. Botan. 260 * Lin. S. V. pag 823. * Caran. desc. pag 450

Clospasponis albus reticulatus Herm. par. 173. tab. 173. 4a 1289

Clematis indica hispida foetida Plin. Amer. 71. tab. 86.

β. *Paspiflora vesicularia* hederacea, foliis lanuginosis odore fetido, filamentis
florum ex albo et purpureo variegatis Plin. alm. 302. tab. 104. fig. 1.

Habitat in Dominica, Martinica, Curacao & C.

Tota hispida, folia ovata ^{cordata} ~~cordata~~, proster pilis ciliata, adnata fetida
^{opaca} glandulosa remota ^{mollior} ~~mollior~~ in margine. Lobi laterales breves,
acuti uti anthermedius. Glandula nullo in petiolo. Involucrum
sebo glanduloso

glauca Pasf. foliis trilobis cordatis glabris: lobis ovatis aequalibus, petiolis glandulosis,
stipulis semicordatis Hort. Kew. 3. p. 300x

Herbat in Cayenna

Covisima. Folia subtus glauca, impunctata. glandulae 2. 4 infra medium
petioli. Stipulae acutae, integerrimae, semuncia longiores Petala
alba longitudine calycis. Nectarium petalis dimidiis brevius: radii
virescentes, apices albi. Flores seu aevolentes 4. Kew. 6. 6.

Talces incarnata et folia integerrima. Differt a lutea magnitudine
foliorum florum longitudine incarnata lobis majoribus fere
acutis nec obtusis, stipulis quinque nervis quinque nec tres

vata Pas. foliis trifidis serratis, floribus tubulosis Lin. Suppl. p. 400. L. V. p. 223.

Smith Pl. Ic. pag. 25. tab. 257

Habitat in Nova granada

Facies P. Incarnata. Caulis glaber angulatus. Lobis foliorum aequalibus serratis, utraque glabris subtus venosis. Stipula lunata, acuta, serrata. Flores nudi ante rubri. Calyx monophyllus, tubulosus, pubescens trif. quinque dentatus corolla triplo brevior. Corolla tubulosa ante expansionem mollis sine pubescens. Tubus digitalis pubescens. Limbus uter ad ult. venia. Funct glandulis ciliata Smith. L. c.

max. Pas. siflora facio foliis sive lobis serratis glabris inferne reticulatis, corolla tubo longis sine Cavan. Desf. pag. 451

tab. 277

Solentri loba: lobi laterales interdum sublobati, quinque nervii. Stipula falcata pollicares serrata, subtus glauca herb. Gust. folia ~~lobis laterales interdum sublobati~~

Lobi lanceolati oblongi laterales subfidi.

non vidi

Calyx Lin. potius petala Jac. Dr. Smith. Involucrum Lin. Calyx

Serrata Raf. foliis palmatis serratis Lin V. ps. Am. acad. 1. p. 232. fig. 21. S. V. p. 223.

Caran. ^{2. fol. 449 tab 276} Clematis indiae polyphylla major, flore clavato fructu colocynthidis
Plum. Amer. 62. tab. 79. Raf. suppl. 3401.

Pasiflora digitata Jacq. pl. pag. 1360

Habitat in Martinica.

Folia glabra. Petioli 4 glandulosi, glandulis petiolatis, 2 oppositis
prope folium.

Silamen toza P. foliis 5 lobis serrulatis: lobis inferioribus brevioribus.
coronis 5que. Caran. des. pag 461. tab. 294

Habitat in America &

Caulis glaber. serratus infimo foliorum glanduloso. Petalis glandu-
dulis? alternis. Sepala canaliculata. Pedunculati foliis
breviores uniflori. Corolla bipollucari. calycis foliis
serrulatis obovatis basi bidentatis

Coculea Pass. foliis palmatis integerrimis Lin. Am. acad. 1. p. 231. fig. 20. S.V.
p. 223.

Granadilla polyphyllis, Luidu ovato Tournef. inf. 241.

Granadilla pentaphyllis, flore copiosa magna Boerh. Lugd. 2. p. 81. Dubamel
arb. 1. p. 272. Tab. 107.

Granadilla Indica scandens et sempervivens, radice repente, foliis palmatis
multiflor. 46*

Habitat in Brasilia ^{sans piquet}

Tota glabra. Lobi foliorum lanceolata mucronata subavenia, intermedia
~~longiora~~ ^{longiora}. Petali bi. s. triglandulosi. Corolla calycina lanceolata ~~seta~~
terminata. Involucrum petalis concolora. Involucrum triphyllum
foliolis cordatis. Sepalo semiovato, unguiculari, seta terminata

Passiflora coculea foliis palmatis integerrimis, sepulis
lunatis nervis integris anfractis La Mark Hort. no 33
Cavan. disp. pag. 461. Tab. 293.

Plectra Raf. *Folius pedatis serratis* Lin. Am. acad. 1. p. 293. f. 22 *

Clematis indica polyphylla, flore crispato Plum. Am. 66. t. 81. Raf. suppl. 344.

Habitat in Dominica herb. Mus.

Petroli biglandulosus. folia glabra.