

Passiflora

467
in Tria genera artificialia quidem non autem naturalia, a med. usq. s.
granadilla petalis internodibus filamentosis Bacca
muscivora Cereca. petala extenon nulla internodibus filamentosa. Bacca
mimusippa. Petala filamentosa nulla Bacca
Passiflora flores granadilla fructus inflatus absque pulpa

incarnata bas. foliis trilobis serratis aequalibus, petiolis by glandulosis Hort. New 3

p. 310

I. V. p. 223

Pasiflora incarnata foliis trilobis serratis Lin. Am. acad. 1. p. 230 * Faigu
Coll. 1. p. 107.

Granadilla hispanis, flos passionis italica Hern. Mex. 800 & 800.

Clematis trifolia flore roseo clavato. Bauh. pin. 301.

Clematis trifolia f. flor. pasionali flore viridi Monf. hist. 2. p. 6. fl. t. 1. f. 9

Muricya mali formis alia Martz. Brasilia 71.

Habitat in Virginia Brasilia, Peru & ^{subsp. villosa} villosa ita neri hys

Sotia trinervis
Caulis teres
serratus

lobis orbem ovato lanceolata, ~~glabra~~ ^{pubes} villosa, obtusa. Glandulae 2.
ad basin folii. Folia calycis lanceolata ~~folia~~ ^{folia} serrata villosa

Pasiflora foliis trilobis serratis basi by glandulosis, foliolo
calycis viri acuti crenulatis glandulosis Curan. Desf. pag
460. Tab. 293.

hebesifolia Pasiflora

Habitat herb. La Martini

Præmi glabri. ^{sub} Folia 3 - vel 5-loba, glabra: lobi ovati; intermedio longior
laterales obtusi, integerrima vel obscure repanda.

1 Caspflora

Habitat Capnae herb. h. Manthi.

Caulis glaber, teres.

mucronata Passiflora foliis subcordatis oblongis

Habitat herb. Guaf.

Caulis teretiusculus. Folia b. s. tripolliaria, membranacea, venis sine venosa
obtusissima absque mucrone. Petioli superne biglandulosi. Stipulae semipolli-
cari.

Coccinea Paspiflora foliis subcordato-oblongis denticulatis subtus tomentosis

Habitat herb. Guss.

Caulis teres: folia 2-3 pollicaria, venosa, supra glabra, subtus tomento venosissima
acuminata, denticulata: denticuli distantes. Petioli semipollicares, glandulae
quatuor, duas superne alterno, duas opposita ad basin. Pedunculi bipollicares, crassi
sicuti fere rami, teretes.

peltata Passiflora foliis trifidis: lobis lanceolatis integerrimis, petiolis by glandulosis

Habitat in Guadeloupe herb. Kuzf.

Vaccies Passifl. minima. Rami superne angulati, subfiliiformes. Folia subpeltata: 6
lobis intermediis sesqui pollicari; laterales parum breviores; divaricati. ^{Petiolus unguiculatus} Glandulae in
medio petioli. Pedunculus petiolo parum longior, medio articulatus.

Subsp. folia Passiflorae

Habitat.

Folia subtus mollissima, venosa stri vel 4 pollicaria, basi cordata: lobi ovati
acuti, inaequaliter remote dentati, obscure repandi. Petioli eglandulosi. Squa-
la foeta cœo laciniata. Involucrum ut in foetida
aliud specimen totum glabrum, aliud est horti Panphno totum villosum quod foete
nil nisi varietas foetida

Tomentosa Passiflorae

Habitat herb. Guss.

Caulis, uti tota planta, villosa - Tomentosa. Folia subquinque nervia: lobi oblongi, acute serrati. Pedunculi folio longiores, pollicares.

orbiculata Passiflora foliis oblongis trilobis: lobis fere aequalibus-

Habitat herb. Guaf.

Tota glabra. Sola supra nitidiuscula subtus venoso reticulata. Circhi et pedunculi
purpurei

biflora Passiflorae foliis bilobis: Lobis ovatis divaricatis

Habitat herb. Aug.

Lobi obtusissimi, mucronati, interdum absque in lobis deest: Lobi pollicis 2-3 lobi,
Stipula subulata. Petioli unguiculares. Pedunculi petiolo parum longiores,
medio bractea duo subulata.

sematifolia Passiflora foliis ovatis serratis Lin. Am. Acad. 1. p. 217. fig. 1. f. V. pag. 821
Gouan. Hort. Tab. 10

Grandælla americana, folio oblongo leviter serrato, petalis est vix
pubescentibus Mart. Cent. 36. Tab. 36.

Habitat Sinnami

venis reticulatis

Rami foliisque ^{oblongis} subtus villosa pubescentia. Stipula petalis, glandulosa
bina vel quatuor alterna in petalo 2. vel 1. abeque
remota. Caulis teres. Folia ovata oblonga venis acuta

Passiflora sematifolia foliis ovato oblongis serratis
corolla calycem superante. Cavan. Des. pag. 452.
Tab. 279

acuta
ovatis oblongis subserratis subtus villosis petalis
et glandulosis

pallida Passfl. foliis ovatis integerrimis: petiolis bíglandulosis Lin. Am. 1. p. 218 fig. 2 &
V. p. 81 Paron. Des. noz 449

Clematis muncluja pappiformis minor Monf. hist. 3. p. 7. f. V. 2 fig. 4

Clematis undica alia, flore minore pallido Plum. Amer. 74. t. 89.

Habitat in Brasilia

Tota glabra ^{statur} caulis angulatus glandula ³ opposita in medio petioli folia
tenera cuspudata cuspidetrolli. Bipulo setaceo. Pedunculi axillares
interdum biflori Flores parvi

Folia ovata, trinervis venosa, oblusa cum mucrona brevi subtus pallida
opae latis punctulis numerosis semis infesantibus. puncta 2-3. remotissima prope
impresisa flaeffentra inter nervos. pedunculi gemini alter abortivi Pedunculi
semipollucari versus medium bractea 3 minuto, fructifera reflexa. Cernis
sape coarctati.

Folia utrinque villosa, molle, ovata oblonga. Petioli ad apicem bíglandu
losi: glandula fupler. Caulis villosus, tener. Pedunculi axillares, 4. Stipul
la setacea. Flores parvi calyces villosi. specie igitur differre videtur
a mea herb. 4 usq.

utrinque glabri mucronati

Cuprea *Pasifl.* foliis ^{ovalibus} ovatis subintegerrimis; petioli aequalibus. Am. acad. 1. p. 219.

Fig. 34 S. V. p. 821.

Granadilla foliis serratis trinerviis, flore purpureo, fructu oliviformi coruleo. Cat. Car. 2. p. 93. t. 93.

Granadilla americana, fructu subrotundo, corolla floris esca, petalisamine fulvis, foliis integris. Mart. Cent. 37. t. 37.

Granadilla flore capreo, ^{fructu} flore oliviformi. Dell. Eth. 165. t. 130 fig. 165.

Habitat in Providentia, Balatna &

Sotia trinervia. Glandula mucronata in axillis. Stipulae minutae filiformes dec. duo. Sotia glabra

Pasiflora *Cuprea* foliis ovatis ciliatis, corolla 10 fida corona spinulosa brevi nyda. Cavan. Diss. pag. 440 tab. 273

~~Aspalathus~~ P. foliis acuminatis integerrimis, petioli glandulosis, stipulis latis
oblongis inferne productis acutis Aubl. pl. Gu. 2. pag. 830
Habitat in Guiana

non vidi

angustifolia Pas/ foliis subcordatis lanceolatis integris, petiolis breviter glandulosis,
floribus solitariis Schw. prod. p. 97.
Habitat in Tamaia 4

non vidi.

Coccinea P. foliis cordatis serratis petiolatis glandulosis Aubl. fl. Gu. pag 220

tab. 324

Habitat in Guana 3

Paspiflora coccinea foliis ovatis serratis subcordatis, calyce
corollam superante Ravan. Desf. pag 452. tab. 280

Serratus foliorum rubro, folia subtus glauca subtomen-
tosa profertim tenera. petioli 4 glandulosi. Stipula
angusta, subdentata. foliola calycis magna ovata
serrata aurantia tomentosa. Corolla tubi brevissimi
Ravan.

mucronata P. foliis indivisi cordatis obtusis integerrimis, stipu-
lis ovatis ~~conspicuis~~ mucronatis Casuar. Desf. pag. La Mart.
Dut. Enci: no 4 Casuar. Desf. pag. 453. tab. 202.

~~Caulis prostratus~~
Habitat in Brasilia 5

Caulis stratus, uti tota planta glaber. Folia coriacea
petioli biglandulosi. Pedunculi bipollicares. foliola
calycis canaliculata. Casuar.

non vidi.

with the last

Uleiifolia Pasifl. foliis cordatis integerrimis: petiolis aequalibus Am. acad. 1. p.
219. fig. 4. L. V. p. 821. Carun. disj. pag 455. tab. 205.

granadilla pomifera, Klotz folio Persic. penus. 1. p. 720 Tab. 12.

Habitata Peru Lima

folia subtus reticulata. Stipula ovata acuta

~~maliformis~~ Passfl. foliis cordato oblongis subdenticulatis, petiolis triglandulosis
involvens integerrimis. Am. Acad. 1. p. 220. fig. 5. *

Clematis indica latifolia, flore clavato, fructu maliformi Plam
amer. 67. t. 82. Raj suppl. 340

Habitat in America ad de La Tortue &

Caulis tetragonus uti tota planta. folio in acumine definentia superiora
saltem denticulis minutis remotissimis ad medium ^{sub} serrata, superne
integerrima, glandula bina supra medium petioli. Stipula lanca
olato-lunata integerrimo unguiculares. folia involvens cordato
Flo Passf. incarnata

~~Specimen hic descriptum est in Thesoro de N. S. de Francisco cultum, forte diversa a matre
folia hinc cum diff. serratis foliorum eorumque figura caule et stipulis forte
ut videtur a figura Plurimici adstruuntur adstruuntur determinanda. Cum ut species
diversa proponenda est.~~

alata Pasf. foliis ovatis subcordatis lobis p. ut nervis, caule membranaceo
tetragono, stipulis lanceolatis serratis Hort. kew. 3. p. 306
Habitat in India Occidentali } ^{integerrima}
Petioli⁴ glandulosi Petala subonacea. folia venosa nervis
alternis remotis

quadrangulans, *Pasp.* foliis ovalibus subcordatis glabris ^{multinervis} petiolis glandulosis
caule membranaceo tetragono, stipulis saepe oblongis integerrimis.

Paspiflora foliis amplioribus cordatis, petiolis glandulis sex, caule
quadrangulo alato Brown. Jam. 327. Jacq. Amer. t. 143 p. 231.

Paspiflora quadrangulans foliis indivisi subcordatis integerrimis,
petiolis sex glandulosis, caule membranaceo tetragono Lin. S. V.
pag. 821. Carr. Des. pag. 457. Tab. 2 83.

Habitat in Jamaica &

Tota glabra. Caulis equator angulis quatuor membranaceis.

Folia magna podrantalia integerrima acuminata nervo
plurimis transversis. Stipulo ultra pollicares, lanam multi
nervia mucronata basi angu parum angustior. glandula
in petiolo 2-1-1-2.

Launifolia Passiflora foliis integerrimis. petiolis by glandulosis, involucri dentatis
Lin. Am. Ac. 1. p. 220 fig. 6. x S. V. p. 822. Gaeyn. obs. 35. Hort. V.
vol. 2. 7. 162. ~~Parand. des. j. roy.~~ 454 ~~tab.~~ 204

Marques ^{inscr.} junn. 21. 7. 21.

Passiflora arborea, Laurini foliis americana Pluk. alm. 202.
V. 211. fig. 3.

Clematis india, fructu citriformi, foliis oblongis Plum. amer.
64. t. 80.

Habitat in surinamo 5

Tota glabra, caulis & vasa folia oblonga in mucronem definentia
venose reticulata. Petiolus versus apicem by glandulosus
Stipula subulata. Involucra triphylla glandulose serrata
glandulosasque venosae serrata folioli ovati

— oblongis

multiflora Paspfl. foliis oblongis integerrimis floribus confertis Lin. S. V. p. 1022
Am. Acad. 1. p. 221. fig. 7. 4 Cavan. des. pag. 448. tab. 272.

Clematis india polyanthos odoratissimo Plum am. 75. tab. 90
Paspflora, launinis foliis, polyanthos americana Pluk. alm. 202.

Habitat in Dominica 5 alterni

Petiole biglandulosi. & Coris parvi Tractus globosi magnitudinis
pisi glandula ad basem folii gemina. Rami et folia utraque
villosa, mollia, supra minus. Stipulae steriles. Folio nervoso
venoso. nervi 4 inferiores oppositi

Abutilon Puffl. foliis oblongo-ovalibus integris, ^{crummi} floribus tubulosis lino. Sup
pl. pag. 400. S. V. pag. 822. Smith. pl. ii: pag. 24. Tab 24. Caron
No. 1. pag. 400. Tab. 270

Habitat in nova grenada

Caulis teres angulatus pascim lanuginosus. Folia integerrima
margine revoluta subdenticulata, supra glabra subtus tomentosa
Stipula lineari lanceolata dentata

Flores pediculi purpurei Calyx triphyllus ovato lanceolatus deci-

dentatus multoties brevior. Corolla tubulosa persistens infundibuli-
formis. Tubus digitatus, subangulatus. Limbus decapetalis
petalis ovatis infra apicem mucronatis: petalis quinque extra
nonbus crispioribus minus coloratis. Nectarium in faucibus brevissi-
mum ciliatum. Stili tres divaricati. Bacca ovata maculata

Calyx potius involucrium dicendus non od.

perfoliata Cassp. foliis bilobis oblongis transversis amplexicaulis perfoliatis
subtus punctatis Lin. Am. 1. p. 222. fig. D. S. V. p. 222.

Sto. passioni perfoliatus f. parilymeni perfoliati folio Sloan
herb. 1. p. 230 t. 42. fig. 123. 4.

Pasiflora foliis trilobis: cuneatis oblongis obtusis: intermedia
oboleto petala terminato Brown. Jam. 320.

Habitat in Jamaica & Syria saxosis.

Folia trinerve glabra, lobis emarginato mucro e divaricata ~~lobis~~
Rami superne pui bescentes, flores oppositi. Sepala petala ea

non vidi

nigra Passifl. foliis cordatis acuminatis, subtus subtomentosis Lin Am. acad. 1.
p. 222. fig. 9* S. V. p. 222. Gaertn. Coll. 1. p. 136. u. 174

Clematis india flore clavato, foliis bicorni Plum. Amer. 68. t. 83.

Passiflora foliis & nervibus trinerviis bicornibus lunatis: sinu ante
nerv. obtuso Brown. Jam. 920.

Habitat in Jamaica, Dominica, Martinea, Cayenna & h. Guaf.

Folia trinervia villosa. stipula setacea. Vana foliis glaberrimis

Passiflora nigra foliis bilobis cordatis acuminatis tomentosis mollibus.
fructu rubente Cavan. Desf. pag. 445 tab. 2 60

villosa subtomentosa. Folia cordata biloba: lobi ovati acuti, sesquipedali
variis, latiora quam longa, integerrima. lobo intermedio plerumque rotunda
to, mucronato. Petioli folio breviores

est sola inter congeneres qui gaudet capsula trivalvi subrecessu
Richard

normalis Pasifl. foliis basi emarginatis, lobis linearibus obtusis divaricatis: inter
medio obsolete mucronato Lin. Am. 5. p. 400. N. p. 022.

Coarctata Ell. f. Contrajerva Herb. Mex. 301.

Pasiflora foliis trilobis: crenibus angustis oblongis: intermedio fere obsolete
to Brown. Jam. 320.

Habitat in America meridionali &

Solia lobis angulo recto divaricatis. Petioli eglandulosi. Lin.

Divaricata margini altera
non vidi

Municya Pasfft foliis obtusis basi indivisi, nettanis monophyllis Lin. Am.
ac. ad. 1. p. 223. fig. 10 + L. V. p. 222.

Clematis indiae, flore puniceo, folio lunato Plum. Am. 72. V. 07. Rajf. 342

Habitat in Dominica 5 herb. 4us 7

^{venoso, rictu ulgato}
Folia subtus punctata. Petala inter lobos. Petali glandulosi.
Stipula minuto subulata punctata aequalia glandulo nullo in
pagina ad basin foliorum

~~Gracillima folio lunato, flore parvo albo, fructu succulento ovato~~
Mant. Pent. 52. Tab. 52

Pasfflora divaricata Mant. 491.

Pasfflora municya foliis bilobis obtusis subtus punctatis
corollis decemfidis, corolla nulla Cavan. Desf. pag

456. Tab. 287

Tota glabra. Caulis angulatus. Folia 12 pollicaria, basi vix cordata. Lobi
oblongi, obtusissimi. Stipula subulata, colorata, uti petali, ceteri ad pedun-
culi. Puncta subtus in folio 2-4. Petali unguiculata. Pedunculi polli-

Farco, superne articulati. Affinis normali.

~~mea forte divaricata deinde fuerit Mant.~~

biflora Paspiflora foliis bilobis semilunatis obtusis glabris subtus punctatis
his Caulis quinqueangulo, axillis bifloris La Mart. Dist. no 15
Cavan. Dio. p. 457 t. 630
Granadilla foliis lacinato, flore parvo albo fructu succulento
ovato Houstoni Mart. Dec. 4. p. 52. tab. 52.

Habitat in America

Caulis glaber. foliis foliorum obtusis divaricatis tri nervi tres
in partem depresso. petioli glandulosi. Stipulae laniculae
to. pedunculis pollicibus erectis. Cavan

non red.

Resperitella *Paspfl.* foliis basi rotundatis lobis acutis ^{in angulis lobis, quae} divaricatis, subtus punctatis
Lin. Am. Acad. p. 223. fig. 11.

granadilla bicornis, flore candido: filamentis intortis Lill. Bot. 164.
t. 137. fig. 164.

Habitat in America

Folia subtus punctata, basi puncti duobus majoribus, setula nulla
inter lobos. Petioli eglandulosi. Lin.

Paspflora *resperitella* foliis bi-lobis ap. bas. cuneatis biglandulosis
lobis acutis La Mart. Dict. Enc. no 17. Cavan. Desf. pag 447
tab 271.

capularis Paschl. foliis cordatis oblongis petiolatis
grandis fructu rubente, folio bicorni Plum. spec. 6. Fe. 130. fig. 2.
Banc. obs. prof. 1. Titul. fig. 1.
Habitat in Gallia aquinoctiali.

oblongata Pasf. foliis ellipticis anticis lobis subtus punctatis, lobulis acutiuscu-
lis, intermediis brevioribus Schum prodr. p. 97.
Habitat in Jamaica &

non ord.