

Pavetta

Pavetta salicifolia Desf. Kunz.

lanceolata Pavetta glabra, foliis lanceolato-oblongis, corymbis axillaribus ter
minatibusque compositis fastigiatis

Habitat in Sierra Leone Per. 5

Arbor. Rami ^{oppositi} inferne teretes, superne tetragoni apice alternatim com-
pressi. Folia petiolata, opposita, 1/2 pollicaria, lanceolato-oblonga,
basi acuta, apice obtusiuscula, integerrima, utrinque glabra.

Subvenosa. Petioli unguiculari, subtus convexi. Stipula campani-

atuminata lata, ramum ambiens, utrinque dente subulato ^{ad} axillari termina-

ti et axillares, ^{pedunculati} pariales oppositi, ultimi triflori. Calyx 1-phyllus
glaber, apicis lacinus rotundatis. Corolla 1-petala, hypocrateriformis,
unguiculari profunde ^{quadrifida} quadrifida. filamenta 4 inferne in tubo brevissi-

deflorata contorta clavata ma. Anthera linearis, erecta. Germen inferum. Stylus unicus

se Pavetta facque congenet

parviflora Pavetta

Habitat. ad Sierram Leonam Reip. Thaurini & opposita
Rami Verdes, fusti, uti reliqua partes glabri. Sola bi s. hypoleucana, lanceolata
elliptica, arena, enervia, supra nitida, subcoriacea. Petioli semunquidulares,
Pedunculi axillares, solitarii, petiolo parum longiores. Pedicelli copiosi, subumbella
ti, capillares, pedunculo parum breviores

nitida Pavetta

Habitat ad Serram Leonam h. b. Thonuni t.

Rami, uti reliquæ partes abis glabri, cortice griseo superne Vetrogovi, solo petiola
la, opposita, trijollucaria, elliptico-lanceolata, supra nitida arenia, subtus
remote oblique nervosa, utrinque acuta. Pedunculi axillares, solitarii, folio tri
plo breviores, terminaliter compressi: pedicelli oppositi, triflori. & laxis pedicellati.
Stipula truncata

Parvella P. stipulis subulatis deciduis, ramis panicula brachiatu fructu
torollis tubo longiori, laciniis patentibus Sw. prodr. pag. 45.

Lonicera foliis lanceolato-ovatis Plum. ii. t. 156. fig. 1.

Censu affinis arbor baccifera, fructu conico verruculato Boerh. hist.
2. puz. Gb. t. 104. fig. 4.

Habitat in India occidentali

Thysiflora Pavetta

^{g. Kunze}
Habitat in Cap. b. pra. herb. fusc.

Tota glabra. Rami teretes, cortice albedo, apice compressi. Folia pollicaria, oblonga vel obovata, basi in petiolum attenuata, glabra, obsolete nervosa venosa, integerrima, obtusa, stipula mucronata subulata terminata. Flores vermiculari in fasciculis densis congestis, unguiculares, glabra. Calycis laciniis subulata. Corolla laciniis lineari, obtusa

Zaffa P. foliis ovatis integerrimis, capitulis terminalibus sessilibus, calycibus seto-
sis longitudine tubi Lea Recept. p. 121. S. V. p. 153

Printa capensis Houttuyn Pflanzens: ves. germ. 5. pag. 357. Tab. 40. fig. 1.
Habitat in Cap. b. frei & herb. hageni

arbor glabra ramis verticibus. Folia opposita petiolata venosa. Receptaculi
cum capituli p. lobum. Calyx 4 phyllis foliolis f. bulatis. Bacca ob-
^{longa} ^{semis} oblonga latere exteriori convexa interiori plana len-
tium f. h. coriis cinereo. ~~lobis petiolatis~~, pollicaria, ramis attenua-
ta, v. venosa, glabra. Capitula magnitudine Cerassi. Coracis cos. ileo - Caly-
cis laciniis subulatis

indica P. foliis oblongis utrinque acuminatis, umbellis terminalibus fasciculatis

calycis brevi acuto len: Suppl. p. 121. Burm. ind. 354. 13 fig. 3.

Arbor malabaricum, fructu Centifoi Bach. pin 399.

Pavetta f. Malle omothe Rheed. Mal. 5. p. 19. Tab. 10.

Pavetta Raj. hist. 1501

Bump Camb. 4. 4. 47

Pavetta indica len fl. deyl. 564

Habitat in India ^{indone}

Rami tota glabra rami teretes superne compressi cortice cinereo. Folia
petiolata opposita palmari et ultra per petiolum parum decurren-
tia acuta Petiolus plenus int gemma venosa nervosa. Petiolus
semipollicari stipula inferiori tubulosa superne ~~con~~ avata con-
nata Fasciculi florum terminali trichotomi multiflori fastigiat
Calyx margo subintegerrimus 13 ractes sub primis ramificationi-
bus ardo lanceolata. Corolla tubi semipollicari latius
limbi oblongo obtusipula. Stylus corolla duplo longior
glabra, foliis lanceolatis allepticis stipulis intus glabri, calycibus
obsolete quadridentati, floribus fasciculatis

arenosa Pavetta foliis tuberculosis oppositis ramis bracteatis Lous fl.

Cochinchina pag. 73.

Habitat Cantonum Linanum &

frutex erectus quæ dupleuris. Rami scilicet folia lanceolata
indurata nitida utraque tuberculis plurimis prominentibus

stibus quasi granulis aeneo coactis. Flores terminales
ostigati. Calyx 5 dentatus bracteatus. Corolla hypocrateri
formis tubo longo 5 fido. Antheris 4. filamenta subnulla

Bacca orata parva 1 sperma

non vidi

parafitica Pavetta folus verticillati, glomeratis axillaribus Lour. fl.
Cochinch. pag. 73.

Habitat in Cochinchina

Caulis pedalis ramosissimus parafiticus. Folia ovata tomentosa
integerrima - flores fusco-lutei parvi vellosi axillares
glomerati. Calyx tetragonus vellosus, truncatus. Tubus
corollae longus. Hypanthio crispifloro. Basis parva

non vid.

pentandra Pavetta foliis lanceolatis ellipticis, ramis panicula
brachiatis trichotomis, floribus pentandri

Lourea foliis lanceolatis - ovatis Plum. ii. t. 156. fig. 1.

Ceraso officinis abor baccifera, fructu loculeo Ventrulato
Stoan hist. 2. p. 6. t. 109. fig. 4.

Psychotria Pavetta fructu subulato deciduo, ramis panicu-
la brachiatis trichotomis, corollae tubo longiore, laciniis
patentibus Sw. prodr. pag.

Habitat in India occidentali

Rami varietis glabri. Folia petiolata, opposita 5que pollicia
na integerrima attenuata utraque acuta oblique
remota nervosa sub^{glaberrima}verna. Stipulae parvae subulato

Panicula terminalis ter trichotoma ramis compressis
patentibus calyx parvis dentibus 5que subulatis parvis
Corolla laminae unguiculatae breviter pedicellatae et glabra
Pacc. magnitudine Pipeni

22 villosa Parveta ramis calycibusque villosi incanis, foliis lanceolato-ellipticis,
floribus fasciculatis Symb. bot.

Habitat in Arabia felici Fosna^o &

Rami oppositi, tetragoni, articulati, dense villosi, incani, articuli ultimi
compressi.

Folia breviter petiolata, opposita, bistripollinaria, acuminata, basi attenuata,
integerrima: juniora utrinque villosa, canescentia, adultiora ^{supra} fere
glabra ~~et quae supra glabra nervosa, arearia~~

Stipula oblonga obtusa, longitudine fere petioli, altero latere
oblique dehiscens.

Calyx quoad visum, parvus, incanus

Corolla glabra, calyce in quadruplo longior

Stylus superne versus inaequaliter.

(Fructum non vidi, potui tamen ad Parveta quam ad Proeram retuli
et cum stipulato, stylis et stigma simili ut in Parveta Indica.

Coryphora. Pavetta ramis glabris, foliis lanceolato-ellipticis, stipulis intus pilosis,
12 calycibus quadrifidis, ~~petalis~~ floribus fasciculatis
Arabia occidentali Forskäl Catal. pl. Arab. pag. 105.

~~Ad Pavettae speciem stipulatis?~~
Stipulatis, stigma et fructus Pavettae. Num varietas procedenti ^{fit} ~~esse~~
ne dubium habes. Rami ^{et} folia gl omnis glabri, calyx non nisi orculo
armato pilis aliquid minutis adpressis, corolla sesqui polliciana, coe-
rum similis. A Pavetta india differt stipulis latere interiore pilosis
nec glabris, floribus duplo majoribus, calycibus quadrifidis, nec ^{melius} ^{hinc} ^{est} ^{p.} obfusa
obsoleta quadridentatis. Si varietas, ^{petalis} ^{est} ob calycem ^{petalis} cum villosa
conjungitur.

Pasetta ramis glabris foliis lanceolato ellipticis serratis fructibus in pelosis