

Paronea

an Species ad Uenan referendo non requiritur fuit

Rohrii Poo. spiculis triplum, flosculis glabris, culmo basi monoso.

Habitat in India occidentali v. Rohr. 26.

Taxa omnino Poo Trivalis. at culmus palmari vel pithomou et
flosculi basi glabri

pannicula pubescentia folia angusta linearia spiculis pallidis
des valvula corollina margine glabra alba.

Parsonia

Habitat in Puerto Rico herb. Fus.

Caulis herbaceus, erectus, inferne glabrescer, superne angulatus hirtus, tomentosus.
Folia petiolata, 4-5 pollicaria, cordata, integra, vel ex rorsum subtriloba, atten-
nuata, 7-9 nervia, acute et subinæqualiter serrata, supra mediocordata, subtus
pallidiora, pilis raris subpellatis dispersa. Stipula lanceolata, falcata. Pedun-
culi axillares et terminalis, longitudine folia, incani. Flores in corymbo
composito. Calyx exterior foliolis 10, hirsutis, subsetaceis, calyce interiori longioribus.
interioris lacinis 5 coactis, trinerviis; nervis hirsutis. Capsula quædam depresso
dorso linea elevata, marginata.
paniculata videtur affinis

coerulea Paronia

Habitat herb. Gusf.

Rami villosi, incani. Sola bipollicaria, cordata, inferora ad basin sublobata
acuta, crenata, crenis mucronatis; juniora ^{stellato} quinque nervi, supra punctata
pilosa: juniora ad triquetra molles, data supra mediocula, subtus incana,
tomento tenui so stellique pilosis rari. Stipula setacea, reflexa. Petioli in
cani, inferiores foliis aequantibus.

Columella Parvica.

Habitat herb. Tus.

Rami teretes, striati sculi, villosi. Solia inferiora sequipolliciana, quinqueloba.
Lobi ovati, attenuati, grosse subaequaliter serrati, glabri, simpliciter venosi,
subtus pallidiores, nervis villosis, superiora ovato-lanceolata, vix pol-
liciana, remote serrata. Stipula setacea. Calyx interior villosus: laciniis
ovatis, attenuatis, villosis nervosis.

paniculata Paronci

Habitat herb. Guss.

Folia utraque pilosa, State supra glabriora, adulescentia extra vespem subtulobata, acuta, lata, quadri pollicaria, inaequaliter obtuse serrata. Stylis lanicolata. Pedunculi axillares, uniflori.

Sprunfer Par. foliis ovato oblongis inaequaliter serratis capsulis trinitis spinosis
abutilon americanum fruticosum, folio subrotundo flore luteo
fructu aculeato major Plam. u. 1.

Hibiscus sprunfer foliis cordatis serratis indivisi capsulis spinis
exstantibus Lin. 1. V. pag. 629. * Jacq. hort. 2. 8. 103.

Ravonia sprunfer caule arborescente, foliis ovato lanceolatis
inaequaliter dentatis tubo et stygmatibus decumbentibus
capsulis anistatis Caran. Diss. p. 133. tab. 48. fig. 2.

Habitat in America meridionali.

Caulis ramosus rami teretes glabri apice subpubescentes.
Folia petiolata, ovato-oblonga juniora utraque velis
rari pellati adpressa adulescentia supra glabra subtus palli-
diora inaequaliter serrata circa 2-3 pollicaria stygma
setacea unguiculata. petioli et pedunculi subpubescentes
1-2 pollicaria longitudine petioli. axillares
calyx exterior 7-8 phyllis folioli lanceolatis ciliatis exteriori
longioribus laciniis interiori lanceolata ciliata capsula
vel in anistata. omnibus partibus 2 vel triplo major anistata.

~~frutifer. H. foliis cordatis crenatis indivisi, capsulis spinis exstanti-
bus. T. V. pag. 629. Jacq. Hort. 2. 4. 103.~~

~~Abutilon americanum fruticosum, foliis subrotundo flore luteo,
fructu circuleato majore Plum. fr. 2. 11. 1.~~

~~Habitat in America meridionali~~

~~frutic. ^{humilis} caulis ^{et} pedalis rami teretes, glabri folia petiolata ovata
peltata basi subcordata inaequaliter sinuata subglabra
supra glabra subtus ovato armata ^{sub} pilloso stellata acuta
petiolo ^{perpetuo} breviter
culano ^{perpetuo} usque petiolo ^{perpetuo} - pediculi axillares solitarii petiolo breviter
res frutiferi ad latera deflexi. Calyx exterior foliolis
6-7 lineis longis extrospum parum latior. ~~Conjuncturae fere interius~~
vix frutiferi in stellam aperti Corolla flava parva
Capsula 5, que subtriangula spinis duobus laterales patentibus
inter. Tertii terminalis unguiculari subulato retrospum
loso~~

Paroma anastata, caule fruticoso humili, foliis cordatis
ovato-lanceolatis, venatis, scaberrimis, floribus
solitariis parvis, capsulis anastatis Cavan. 2. 1. 133
tab 45. fig. 3.

Zeylanicus H. foliis cordato hastatis, pedunculis alternis unifloris
 geniculatis L. V. p. 630 ^{276*} *Tr. Syst. Mant.* 436. Burm. ind. 153. V. 48 fig. 3
 Alcea pentacarpos, ramundali aunciomi folio et facie Plukn
 alm. 13. V. 125. fig. 3.

Hetmia zeylanica urno pilosa annua Seb. Thef. 2. V. 18. fig. 3.
 Habitat in zeylona O

Caulis erectus ~~simplex~~ ^{intyma subrotundus} hirtus; rudimenta ramulorum
 in axillis folia petiolata remota. inferos quoque

caule hirtus
 serratus
 foliis infimis subrotundis
 Ois superioribus
 5-3 fadiis que ~~parvis~~

petiolo superiora tripartita laterali lanceolatis obliq:
 petiolo exteriori serrata una altera intermedia ~~parva~~

longiora ut pollicari versus apicem ut inque serrata
 utraque pelis raris subtus pallidiora. Stipula
 fetacea pedunculi axillari solitaria vel gemini
 folio longiore superne geniculati Calyx exterior

10 phyllis glanduloso pilosis fetacis interior longior
 nervi ~~interius~~ ^{conis 5 que inquebri} arcuatis interior lanceolati
 Hamen 10 capsula globosa ^{conis 5 que inquebri} cancellata & calyce
 exterior fere idem ab axilli cancellata calyce in
 tenore Hamen longior sem. 1. in paralo

Pavonia zeylanica caule hirt herbaceo hirta, foliis cordatis
 crenato dentatis inferioribus subrotundis; reliquis profuse
 3-5 fadiis pedunculis elongatis geniculatis uni
 semi Burm. Ind. p. 134. tab. 40. fig. 2

concellatus H. caule debili herbo, foliis cordatis serratis, calycibus
globois: radiis vicinis subulatis heris Lea Suppl. p. 311. 7
P. V. pag. 624
Habitat in Surinamo

non vidi

odorata P

odorata P

cancelled ①

paniculata. P. caule herbo, foliis cordatis subrotundis adnatis serratis
subtrilobis, racemis ex illantibus terminalibusque
Panicum paniculata caule herbo ramis, foliis cordatis subro-
tundis: floribus paniculatis genitalibus, delectatis Casen
Disf. pag 1354. 46 fig 2.
Habitat in Peru 5

non vid.

. racemosa foliis simplicibus cordatis ovatis serratis superne scabris, raie
mo terminali erecto. Sw. prodr. p. 102.

^{ovato-} foliis cordatis *Alicea frutescens aquatica* Sloan. herb. 221. t. 139. fig. 2.

^{ovatis acuminatis serratis} *Pavonia pinnata* Cavan. desf. 3. p. 136. t. 46. fig. 1.

^{herb. rug. op.} ^{floribus thyrso} ^{terminali} Habitat in Tamaucan;

racemosa P. foliis cordatis ovatis acuminatis subserratis racemo terminali
erecto

Rami teretes glabri superne sicc. subt. inaequaliter et villis minutis
stellatis. Folia petiolata, alterna 3 pollicaria obtuse
venosa nervosa forma supra scaberrima utroque glabra
Cheta Cavan. p. ovata nuda) subtus pallida. Stipulae lineares.
Racemum petiolus 1-2 polliciarum. Pedunculi parciales alterni
13-15 distantes ut communis caespitatus bipollicares
per sum minores. Cal: exterior ovato ^{partita} laciniis
cuneolatis longioribus interioribus interioribus sedus lacini
nervis ovato ^{intra concavitate} cuneolatis. Corolla calyce longior vix polli-
cans bracteae lineares cuneolatis

urens P. foliis cordatis serrulatis villosissimis, floribus axillaribus glomeratis ^{sub} sessilibus.

Paronica urens caule fruticoso suberecto, foliis palmatis floribus axillaribus glomeratis subsessilibus *Cavan. Disp. p. 137. Tab. 49. fig. 1.*

~~Habitat.~~

Tota hispida. Caulis superne penna asperius crassior, pilis flavo-
vescenter, raris. Folia 4 pollicaria: lobis ovatis, attenuatis, in qua-
liter dentato-serratis. Petioli flavescents, incurvi. Calycis exten-
sio foliata lineana herb. frusf

hastata P. folius lanceolatis hastatis ^{obtusis} grosse serratis pubtus inanis, pedunculis axill
lombus solitariis

Paronea hastata folius hastatis crenato-dentatis desuper punctatis,
floribus solitariis longe pedunculatis Caran Desf. pag. 130.
Tab. 47. fig. 2.

Habitat in Proplea 5

Rami teretes alterni ^{sub cuneis} foris cineriscentes, ramulis brevibus
ex omnibus axillis. Folia petiolata distantia, basi pollinaria
ramulorum unguiculata, basi cordata, obtusiuscula vel acuta obtuse
grosse serrata supra arena ^{obtusis} fistulata renosa. Calyces tomentosi; corani
folioli et laciniis ovatis. pedunculi in ramulis uniflori longioribus
parum longiores

columella P. folus ^{int} angulatis serratis inferioribus angulato sublobatis super-
ioribus ovatis, pedunculis axillaribus solitariis
Pavonia calymella folus dentatis angulatis inferioribus latis
superioribus oblongis, floribus axillaribus solitariis, pedunculis
lobis Cav. Desf. pag. 139. tab. 48. fig. 3.
Habitat in insula Bourbonis.

Chrysoscolymus ab hac forte non differt

promorsus *H. hesperus*; foliis ovatis angustato-cordatis apice promorsis
crenatis ~~cuneatis~~, calycibus tomentosis, seminibus tuberculatis L. Sappé
pag. 309 & S. V. p. 620.

Habitat ad Cap. b. spei 5

Truncus ramosus Ramis 4 pedali
tenuis cuneato
subrotunda
utraq. tomentosa
Fertiles pubescentes incani. folia petiolata ^{cuneis} foliis
cuneiformi subcordata, ^{apice} truncis ^{trans} versa pollicaria squae
nervia supra pulsi variis stellatis subpubescentia vincta seran
dum nervos lineata subtus incana simpliciter venosa
hatis dentata. Petioli unguiculati. Stipulae setae
pedunculatae axillares solitariae foliis longiores canescentes
superne articulatae supra geniculum incurvae. Calyx ~~trilobus~~
interni exteriori folioli 10-14. annulo parvo inserto setae
interior longitudine fore interiori interiori lacinae subrotundi
petala subrotunda. Capula ^{sub} ovata.

Cavonia cuneifolia canle furticosa, foliis obsolete cordatis ovato
tuncatis crenatis, floribus solitariis erectis longe
pedunculatis calycibus glabris Casan. du. pag. 139
tab. 45. fig. 1.

Coccinea P. foliis cordatis subtrilobis pubescentibus, floribus solitariis revolu-
tis. Cavan. Decid. 3. p. 140. no 200 t. 47. fig. 1

non vid.

Syphaloo Ca

papilionacea P. folus cordatis serratis, pedunculis solitariis, caule tomen-
toso Car. Desf. pag 140. tab 49. fig. 2.

Habitat in Tahiti

Raulis teres ramosis. folia longitudine petiolorum distantia, alte-
rnata. Stipulae lineari-concoloratae. Pedunculi longitudine
petiolorum. Calyx exterior folioli 10 lineamibus villosis
interior longior. Corolla magna lutea. Caran.

brasiliensis H. foliis cordatis denticulatis, calycibus exterioribus du-
plo longioribus; caule fruticoso: ramis herbis. Lin. Sp. pl.
pag. 9774

Habitat in Brasilia &
pedunculis et calycibus herbis. Capsula 5 coriis

on Pavonia species

Plum. v. 160. fig. 1. ? ^{Plum} species excludend. non vidi



116