

Pectis

~~prostrata~~ ^{Pectis} ~~prostrata~~ foliis ovato-linearibus cernatis basi ciliatis
supra nitidis subtus punctatis Cavan. 4c. vol. 4 pag. 12. tab. 324
Habitat in nova Hispania ☉

— linearis oblongis floribus ^{in dichotomis} axillaribus sepalibus solitariis
non ab humifusa diversa

multiflora Pectis

Habitat Guamanga Per herb. his. 5

Caules fruticulosi, humi fissi, glabri, variet. Folia sessilia, opposita, unguiculata
vel panic longiora, glabra, subtus ^{ves punctonum} serrata, saepe subgeminata, ad apicem usque
ciliis longis. Flores terminalis cum ramulo, sessilis, solitarius, multo major
quam in reliquis. Calyx pentaphyllus: foliola oblonga, purpureo punctata
Pappus ferrugineus, pilosus. Pili dentati. Flores ubi plerumque
odor atramenti.

Ciliata: Pectis. foliis cinereis ciliatis, ramis oppositis.

Pectis ciliata foliis linearibus ciliatis Lin. S. V. pag. 771.

In america meridionali legitur a V. Koch Conno rusticis Hispanis dicta

Rami filiformes, purpura fiores, glabrisculi: ramuli axillares, oppositi, breves, foliis et floribus onusti.

Folia pollicana, minora in ramis, opposita, semiamplexicaulia, linearia, basi remote ciliata, reliqua parte oculo armata serrata, apice seta terminata, glabra, subtus punctis adpressis.

Peduncululi in axillis solium ramulorum, solitarii, breves, uniflori.

Calyx pentagonus, pentaphyllus, glaber, pallidus.

No 252

Cunila memosa

montserrat

No 253. *Boehmeria ramiflora*

Dichotoma Pectis foliis linearibus subtus punctatis basi ciliatis, pedunculis axilla-
ribus unifloris, caule dichotomo

Habitat in America meridionali Ch. v. Robt.

Caulis herbaceus, filiformis, dichotome ramis diffusis, glabris.

Folia sessilia, pollicis opposita, pollicaria, glabra, subtus utrinque series punctu-
torum, basi ciliis longis

Flores axillares et terminales, primum sessiles, demum pedunculati: pe-
dunculi longitudine foliorum, uniflori.

Corolla flava.

(minime convenit cum figura P. ciliata Plumieri, ac punctata Lin.

Cinifolia Peckii

Caulis sesquipedalis erectus simplex, superne divaricatus in
ramis floriferis dichotomis, purpurascens glaber
subangulatus

Folia sessilia linearia glabra pollicaria margine
parum revolute subtus ad marginem series punctorum
basi ciliata.

Pedunculi capillares flores purpurei flores proprii
rei

No 71. Martha

Congifolia. Permatocis glabra, foliis lanceolatis ~~max~~ ^{sub} ~~marginibus~~
~~que~~ ~~scabri~~ ~~floribus~~ ~~semiverticillatis~~

~~Cong. Aub.~~

~~caulis erectus fructus tetragonus. ram glaber purpureo
levis lani apice c. neraputei - peli brevis finis oculo armu
to videntis ramofus rami alterni~~

~~Folia subpetiolata patentissima in mea sequipolliciana
distantia ad apicem conferta lanceolata, utraque attenuata
in ^{retro} ~~marginibus~~ ^{marginibus} ~~sub~~ ~~marginibus~~ ~~pallidioribus~~, nervosa ope
lenti aculeoli minutissimi in nervis vix tamen scabra
Petioli & basi folii attenuati.~~

~~Stipula multifida lacina utrinque 6. 7. setacea erecta
coloris est in altera axilla in capitulum conglomerata ceteris
iniqui quatuor & vellosetulsi ramulus vel exi- rudimen
tam ex axilla opposita
calycis lacina ovata~~

H HENDRICH
VAHL