

Pelargonium

elongatum pedunculati folio longior herb. Kurf.

adde characterem P. laciniati

pygmaeum Pelargonium

Caules: plures erecti semipedales herba ei teretes pubescentes, parum in ramosi folia ^{longe} petiolata cordata ~~ob~~ ^{ob} ~~vers~~ lobata, obtusissima ^{crenata} venosa glabra stipulae subulatae. Pediculi ^{medio articulati} oppositifolii elongati flores umbellati breviter pedicellati uniter duodecimnervi Calycis foliola lanceolata glabra pedicelli geniculati petala uniaformia calycis parum majora duo ^{albido micarnata} superiora duo linea ramosa & aurata purpurea & inferiora in linea purpurea versus basin. Capsulae pubescentes.

netiolai folio
triplo vee
quaduplo longis
vsi remotis & uni

imbricatus C. Culmo triquetro nudo, umbella decompota, umbellularum radiis
imbricatis, involucri hexaphylli foliis tribus longis formis, tribus bre-
vissimis ^{aphyllis} Retz. obs. 5. p. 124
Habitat in India orientali

non vid.

regium P.

Habitat in C. b. spec. herb. Royeni
Pedunculis triflori

amstelredamum ~~Wintersonne~~ pedunculis aggregatis serminalibus caest. in Com: Gott. 1789.

reg. 34. pag. 7.
Gronovs Wintersonne

anceps y umbelli multiflori subcapitata, foliis cordato-subrotundis
obsolete lobatis, caulebus triquetris ancyntibus Hort. kew. 2 p 220.

Habitat ad Cap. b. p. 24

Pelargonium anceps Jacq. coll. 4. p. 104. tab 22. fig. 3 y

Caules plures ascendentes ramosi, obsolete triangulari, fu-
sco purpureiscenter, sesquipedales; glabrescunt. Folia opposita
obtusissima crenata, glabra pum, aspera, venosa inferora
magis integra longius petiolata foliolo inter ovato. Pedun-
culi axillares alterni 3-4 pollicares, pedicelli 5. St. supra
medium geniculati incurvati. Involucra ovata hispida
foliolo calycis striata acuminata hirta. petala cuneifor-
mia purpurea aequalia, superiora duo lineis duabus sutura
tionibus inter uno altero incumbente. Germen ovatum hipe-
tum Jacq.

tabulare pelarg. pedunculis paucifloris, foliis subrotundo corda-
tis 5 lobis obtusi caulebus decumbentibus pelosi Hort.
Kew. 2. p. 414. L'Herit. Geran. tab. 9

geranium africanum, floribus tubellis foliis glabris
cordiformibus serratis caule purpureo ~~non~~ canulo
purpureo capitulo Rari sup. pl. p. 514

Geranium calycibus monophyllis, foliis peltatis
rotundatis angulatis dentatis glabris, caule fruticis
J. Burm. Ger. 44. t. 1. fig. 44.

Geranium tabulare foliis cordatis sublobatis crenatis den-
tatis glabris subsiliatis caule fruticoso Linn.
Spec. pl. p. 947. *

elongatum q. caule herbaceo prostrato hispido, foliis longissime petiolatis oppositi-
tis, pedunculis elongatis cæcis fructibus ternis Cur. Dis. p. 233.
tab. 101. fig. 3.

Officinalis: Cap. b. p. 1. & ex horto Taurinensi

Caulis teres ramosus prostratus hirsutus, densè spinulosus. Folia opposita
cordata subrotunda dentate crenata scabra, quandoque glutina
medio zone inflexa rugosus. Petioli semipedales. Stipulae lan-
ceolatae reflexae. Pedunculi oppositifolii, longitudine
foliorum. involucria subtrophylla, pedicelli 1. 2. 3. semipolli-
cari, laciniis calycis ciliatis. Petala superiora majora
facies alba hemisphaericae caulis tuberculis minutis
siaber hispida. Lobi oblongi tri-dentati.

Geran. tabularis
Ler.

— *Stipulae lanceolatae*

verte

odoratissimum G. caule carnosissimo brevissimo, ramis herbaceis longis, foliis

ovatis mollissimis. L. V. Burm. ger 245. Cavan

Desf. pag. 241. tab 103. fig. 1.
Geranium africanum humile, foliis fragrantissimis
mollibus. Willd. Elth. 157. V. 131. fig. 130.

Habitat in Africa C. b. spec. 4 mollissimis

odoratissimum G. foliis subrotundo cordatis pedunculatis subsaepe floris
Hort. kew. 2. pag 419

Caulis bi pollicari, rami herbacei pedales decumbentes
folia opposita, venata nervosa venosa. Petioli ^{longi} folia 3-4
plo longiora. stipula ovata. pedunculi axillares petiolo
aeque plerumque longiores. involucri foliola saepe 6 ovata
radii saepe 6. semipollicari. folia calycis lanceolata acuta

afriarum 9 folus alternus cordatis dentatis villosi. inferius
orbiculati superioribus sublobis, floris umbellis paucifloris
Cavan. Desf. pag. 242. tab. 104. fig. 1.

Habitat in Cap. b. frei

Caulis herbaceus, uti tota planta, villosus. Folia petiolo ^{sub}oppositi
lobis obscure lobatis. Stipula ovata acuta. pedunculati
oppositi folii. pedicelli 4. Petala superiora majora
Cavan.

non vidi

Althoodeo G. foliis ovatis plicatis sinuatis tomentosis crenatis, caule prostrato
herbaceo. R. V. Mant. 433. Burm. ger. 54.

Geranium foliis Althoo, africanum, odor melissa Boeck.
Luzsb. 1. p. 283.

Habitat in Africa ♂

Potargonium althoodeo-Thaiqu. Coll. 4. p. 105. 4

caule plures depressi ramosi crassitie calami teretis pedalis
vellopi. Stipula lanceolata tomentosa. Folia opposita
ovata obtusa crenata ut incano vertice petiolo breviori
Pedunculi axillares alterni hispiti. Flores unbellati 5. Anthero
penta phylla lanceolata hispita. pedicelli hispiti
calycis foliola lanceolata aequalia hispita. Petala calycis
vix longiora cuneiformia purpurea margine alba. superiorum
panum longiora et latera maculis saturate rubris colorata
germen vellosum. Semina hispita

althoodeo P. pedunculi multiflori foliis cordato ovatis sinuatis
dentatis summo pinnatifidis, petalis calycis aequalibus
libris H. Kew. 2. p. 420. L'Herit. geran. tab. 10

Geranium althoodeo caule herbaceo tomentoso foliis oppositis cordato-ovatis
sinuatis crenatis, umbella longissime pedunculata floribus minimis Cavan.
Diss. 1. 242. tab. 123. f. 2.

alchemilloides G. foliis orbiculatis palmatis incisive pilosis, caule herbaceo
decumbente. Hort. Ups. 1974 R.V. Burm. ger. 55.

Geranium aegyptiacum, alchemillo herpeto folio, floribus
albidis St. J. bot. 107. 107. Herm. Lugd. 282. 7. 283.

Habitat in Aegypto

Geranium alchemilloides caule herbaceo, foliis orbicu-
latis pilosis sivepartitis, lobis trifidis, umbellis longissi-
mi ^{multi} flori Caran. Desf. Gray. 234. Tab. 90. fig. 1.

Caules teres uti tota planta pilosi diffusi. Solia
radicalia longissime petiolata caulina opposita
sive ^{una} ~~superiora~~ alterna trifida lobi oblongi tri vel quiden-
tati obtusi. Stipula ovata. Pedunculi axillares
1-2 flori. lacina calycis aristata. Petala superiora
latera. Capsula tomentosa ferruginea parva

alchemilloides P. pedunculis subquadris flori, foliis orbicu-
latis palmatis incisive pilosis caule herbaceo
decumbente strigatis sepibus H. Kew. 2. p. 419
— stipula ovata

betonicum g. caule herbaceo, foliis subrotatis lobato pinnatis crenatis obtusi
umbellis paucifloris Baran. Desj. p. 264. Tab. 118. Fig. 1.

Geranium africanum foliis betonico Rivin. pentap. t. 106.

Geranium pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis foliis
lobato-pinnatis crenatis obtusi Hurm. Ger. no 37.

Geranium africanum betonico foliis laciniato et maculato, floribus
incarnatis Herm. Lyod 279. t. 201.

Habitat in C. b. spici

Caulis simplex, vix pedalis. Sola longe petiolata radicebus cordato-
ovata crenulata caulibus opposita vel alterna breviter petiolata. Stipuli
laevia ovata acuminata. Pedunculi elongati. involucri polyphylli
pedicelli 4

albicoides G. foliis ternatis trifidis laciniatis, caule herbaceo horto
Linn. Spec. pl. pag. 948 & L. V. Cavan. det. p. 256.

Geranium africanum hesperum, uve infra folio lacinia
to, flore duabus maculis purpureis Raj. suppl. p. 515.

Geranium pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis,
foliis lyrato-multifidis, cotyledonibus lobatis Burm
ger. 36.

Habitat ad C. b. spec. 4
Caules longi prostrati. folia caulina reticulata
tenuius dissecta sive multifido lyrata. Pedunculi
longi. pedicelli 5-6. petala 2 superiora majora
calycis acuti Linn.

non vidi

pedunculis ~~laevibus~~ ^{infloribus}
triangula Pellay. foliis superioribus oppositis sessilibus serratis
tunc
longatis, stipulis cordatis.

Habitat in Cap. b. Spei.

Rami glaberrimi. Folia inferiora non vidi superiora
remota semipollicina, extorsum profunde serrata in cyma
nervosa venia conspicua glauco viridia. Stipulae late
acuta colore florum. Pedunculi elongati. involuella
ovata acuta viridia. Calyx laciniis lanceolatis acutis
viridis glabris viridi purpureo fatis.

minimam 9 foliis pennatis inferioribus radicalibusque cespitosi caulibus oppositis
umbellis terminalibus Cavan. Diss. pag 260 Tab. 121. fig. 3
Habitat in Cap. b. spici glaucis rubescens
Planta pusilla glabra caulis filiformis 3-4 pollicari. Folia radicalia
numerosa longe petiolata interdum bipinnata pinnulo obtuso mi-
nuta. Stipula ovata ^{acuta} involucrum 4phyllum: pedicelli 4. Pady 25
canescenter lunicolato
foliis pennatis pinnis pennatis fissis lineariibus obtusis, umbellis qua-
drifloris

Palmyra

~~hawaii~~

Coriandifolium G. foliis bipinnatis linearibus squarosis, caule herba
eae Coriophulo. L. V

Geranium agricanum coriandifolium, floribus incarnatis
Munus Herm. herb. 274. t. 200

Habitat in C. b. p. p. C.

~~Geranium coriandifolium ramis reclinatis erectis nodosis foliis
bipinnatis linearibus, umbellis paucifloris Cavan. Desf.
pag. 263. tab. 116. fig. 1.~~

~~Coriandifolium Pel. pedunculis subtrifloris, corollis subtetrapetalis, foliis bipin
natis linearibus, caule herbaceo Coriophulo G. Kew. pag
2. 4. 21.~~

Conjunctur cum myrsinifolio a Cavanillas.

michi ignota

myrtilifolium G. foliis biinnatis: inferioribus cordatis lobatis, caule herbaceo
calycibus frugosis L.V. mant. 433. Burm. ger 59.

Geranium africanum, betonica folio laciniato et maculato
et, floribus incarnatis Herm. legib. 279. t. 201.

β. Geranium africanum tuberosum, anemones folio in
carnato Herm. parad. 179. t. 170

Geranium aethiopicum myrtilidis folio 3, flore magno
fructu Breyn. cent. 129. t. 59.

Habitat ad cap. b. p. 7

myrtilifolium G. pedunculis subtrifloris, corollis subtetrapetalis
foliis bipinnatifidis: inferioribus cordatis lobatis Herm.

caule frugoso
sculo

2 p. 421.

inferior multo

folia opposita vel alterna petioli breviora pennatifida
cordato oblonga lobis incisive dentatis, extropium dilatato

Geranium conan superiora bipinnatifida, laciniis linearibus apice latioribus
Driffleum incisive dentatis omnia subtus, margine frugis parvis raris.

Caran. dis. Voy ad p. 267. t. 116 fig. 1.

Stipula cordato acuminata brevis. Pedunculi
oppositi folii elongati foliola involucri ovata mar
cescunt 5-6. pedicelli et calyces subfrugosi. Calycis lac
ina linearis lanceolato fructu acuto petala superiora

herbarium G.

geranium calycibus monophyllis corollis papilionaceis, foliis pennatis
multifidis caule villosi Burm. Geran. no 64.

Geranium herbarium caule brevi hirsuto, foliis duplicato pennatis: laciniis
capellentibus, umbellis pluribus terminalibus elongatis Cassan
Cus. pag 250. Tab 117 fig. 2.

Habitat in Cap. b. spec. 24

Planta humilis est digitalis ^{caulis} ^{altus} ^{plurimum} ^{major} ^{Rader} ^{causis}
2 digiti minoris apice squamose a ^{stipula} ^{lanceata}. Solita

dicelna frequentia caule ^{florifero} ^{dimidio} ^{breviori}
petiolata ^{petioli} ^{pinnuli} ^{angustissimi} ^{brachis}. Stipula lanceo

ni erectus ^{superne} ^{diphyllus} ^{foliis} ^{structura} ^{radicalium} ^{ad}
^{angustulantis} ^{superne} ^{pedicelli} ^{longitudine} ^{caulis}

^{pedicelli} ^{superne} ^{lanceolatis} ^{alternatis} ^{pedicelli} ^{fero}
solitarii vel 400. laciniis calycis lanceolata hirsuta

colla inaequali

Pelary

non vidi

Longifolium G. (P.) acaule foliis lanceolatis longissime petiolatis, scapo radice
ca. ramolo, umbellae multiflorae

— Caran. Diss. pag. 235. Tab. 102. fig. 1

Geranium calycibus monophyllis, foliis simplicibus, oblongo-lan-
ceolatis radice tuberosa Burm. ger. 67. Tab. 2.

Pelargonium Longifolium Walp. coll. 24 p. 192 *

Habitat ad Cap. b. p. 2

Radix rapacea. Folia radicalia, lanceolata integerrima,
glabra, convexula bipollicaria. petioli inferne villosi.

Stipulae scariosae dentato-ciliatae. interdum folia ^{pinnata} pinnis

Petioli mucronati

prodeuntia folia pinnata pinnis lanceolato lineantur. Scapus
debilis glaber semipedalis. Umbella pinnata semipedalis
villosa quadriradiata. Involucra et involucella linearia
villosa. Calyces villosi. Petala cuneiformia purpureo-rosea
duo superiora parum latiora filamenta 4. quatuor fertilia ad
insequente. Germen subrotundum villosum fere

Longiflorum (P) g. acaule foliis lanceolatis interprimis glabris cimbellis
compositis paucifloris

Pelargonium Longiflorum Jacq. Coll. 4. p. 1944

Habitat ad Cap. b. p. r.

Radix napaea. Folia radicalia, lanceolata basi attenuata, acuta
interprimis, utraque glabrescens, margine ore lente villosula,
tri-pollucaria, stipula utraque in petioli basi, angusta glabra
scabra. Squamulae simpliciter glabrescens. Umbellae radii septem
scapo duplo brevioribus. Antheriæ foliolis linearibus lanceola-
ta villosa inaequalia, parvula familia aequalia. Pedicelli quatuor
7. villosi pollicares. foliola calycina ^{linearia} lanceolata villosa.
summo tantum exoto. Petala ^{separatim} linearia acuta, canaliculata
obovata basi fossa purpurea petalum summum saepe ad
basin fere bifidum. Germin villosum Jacq.

non vid.

Depressum f. (P) caulis foliis lanceolatis integerrimis glabris, umbellis compositis
multiradiatis

Pelargonium depressum Jacq. coll. 4. p. 1934

Habitat ad Cap. b. p. 24

Radix rapacea. Folio radicalia, anguste et longe lanceolata basi
vel attenuata, integerrima glabra, 3-4 pollicaria. Stipula
acuta, ciliata, purpurea. Scapus gracilis, erectus, glaber, semi-
pedalis. Umbella primaria 3-4 radiata radii 4 pollicibus
villosi partialis 8 radiatus. Involucra et involuella lanico-
lata linearia villosa. Foliole calycis lineari lanceolata
villosa. Petala lanceolato-linearia ochroleuca semiflexa
duo superiora basi atro sanguinea. filamenta 9. germen
longe ovatum villosum Jacq.

non vid.

Ciliatum (P) *G.* acule foliis lanceolatis integerrimis subtus glabris supra pilosis

Guayana

Pelargonium ciliatum Gaerth. Coll. 4. p. 195.

Habitat ad Cap. b. spec. 4

Radix repanda. Folia lanceolata attenuata integerrima subtus
glabra supra et margine pilosa. Involucra nonnulla basi
solido parvo linearilanceolata appendiculata. Squamula
Lanceolata hispida. Scapo semipedalis erectus, hirsutus. Umbella
primaria tri- & 4 radiata pedunculis hirsutis parvioribus 5 radi-
ta. Involucra et involuella linearilanceolata hispida.
Calyx foliola lanceolata supremo erecto, hispida. Petala
cuneiformia octoblenia superiora duo basi atro sanguinea
germen velosum

non vidi

Helianthus Peltagoneus

L Herbarium tab. 7.
prope

non vid.

ciliatum g. aciculae foliis oblongis ciliatis ceteris ciliatis; umbellis
simplicibus Cavan. Desf. p. 234. tab. 110 fig. 2.

Habitat in Cap. b. sp. i. superi. & proliquis

Radix globosa. folia petiolo subaequalia proliquis
cuneata. involutum ephyllum petiolum villosum
pediceli 3. Calyx villosus. Petala 2 superiora majora
Cavan

non vidi

auntum *G. Scapis radicalibus umbella composita dispersa, foliis*
ovalibus planiusculis *man. 433 L.V. pag. 615 x*

Burm. ger. 61.
Pavan. Desf. *Geranium prolificum* A. L. J. *Spec. pl. par. 950*
n. 236 *Geranium capense* herbustum, radice raris, flore alio purpureo
Seb. mus. 1. p. 20. t. 10. fig. 0

E *Geranium africanum* foliis plerumque aurtis, flontibus
et rubro purpurascantibus *Com. hort. 2. p. 121. t. 61.*

~~Longifolium *B* *Geranium* calycibus monophyllis, foliis simplicibus oblongo
lanceolatis, radice tuberosa *Burm. ger. 67. fig. 67.*~~

~~oxaloides *G* *Geranium* calycibus monophyllis, foliis ovato-hastatis
carnosis, radice rapacea *Burm. ger. 71. fig. 71.*~~

Habitat ad Cap. b. p. 7

Folia radicalia reticulata ovato oblonga dispersa
aut tridoba integerrima utraque pubescentia
margine pilosa crassa lente virentia. Scapus
pilosus petiolis triplo longior involucri non penta
phyllum. Pedicelli plures inaequales. Calyx
pubescent.

Pelony. non vid.

Dipetalum Pelargonium acule folii acuti

Herb. Germ. Tab 43

non vid.

oxaloides ^{ae. aule} folio bracteato hastatis carnesi Burm. Gemm. no 7. Cassin
Pl. n. 237. t. 97. fig. 2

Geranium aurtum V. Lin. Spec.

α geranium floribus parvis rubellis foliis subrotundis procumbens
Herm. pl. afr. p. 11.

• Habitat in Cap. b. sp.

Radix rapae folia petiolata crassa. pedicelli sex
flores emulsi Burm.

non vid.

^{acaule}
bifolium g. foliis breviter cordato-angulatis Sturm german. no 73. Cassan

Dessl. pag. 254. tab 115 fig 3.

geranium africanum humile latifolium tuberosa radice floribus
incarnatis Herm. paradis. bot. app. p. 12.

Pelargonium rapaceum bifolium, floribus maculatis Sturm
abr. got. 35. fig. 1.

Habitat in Q. b. spec 4

folia duo crenata nervosa vix plana. Scapus pithameus
purpurascens erectus. involucri foliola plura oblonga. pedicelli
septem. Petala superiora 2 majora Cassan

pilosum ~~Erodium~~ ~~Clarygonum~~

geranium pilosum radice napiformi, scapis proliferis, foliis subova-
tis trilobis Cavan. ~~disf.~~ p. 273. Feb. 199

Habitat in Cap. b. p. 27

Tota planta pilis albis vestita, exceptis foliorum pagina. Folii
radicalia, glabra ciliata subtus nervis protuberantibus. Stipulae
lanceolatae. Scapi numerosi 4. 5 pollicares. foliola in volucri
6. 7. lanceolata. pedicelli sub 12. semipollicares. Caecum calycis
lanceolata. Corolla petala 2 superiora emarginata majora macula
atro rubra notata. - Cavan.

biflorum g. foliis ternis lobato-incis acutis pedunculis terminalibus
bifloris Carandus. p. 251.

Geranium africanum nocte oleo, flore ruberimo anemone. Folio
lobato Pluk. phyt. p. 106. fig. 5.

Pelargonium bifolium et biflorum Harm. afr. p. 95. tab. 37.

fig. 1.

Habitat in Cap. b. p. 4.

Radix crassa nodosa ^{caulis} sesquipedalium. Solae crassa. Petala

Duo majora

— folio oppositi

non vid.

mollissimum Pel. ^{tomentosum incanum} ~~caule~~ foliis oblongis ^{ternatis} ~~tomentosis incanis~~ mollissimis
subcaulescentibus stipulis ovatis.

Geranium calycibus monophyllis, foliis ovato oblongis serratis
caule nullo radice lignosa Burm. Geran. no 62.

Geranium glaucum: acaule foliis ovato-oblongis serratis incan-
no tomentosus, scapis radicalibus Cassan. Desf. pag 238.
tab 103. fig. 2. excluy. Lyn. Shaw

Habitat in Cap. 6. sp. 1. Bulw. nulli

radix perpendicularis ^{caulis teres nulli} superne divisa in ramos nonnullos
simplices vel bifidos squarrosos e basi stipula-
rum persistentibus, apice foliosos floriferosque. folia petiola
na nervosa ovata crispifolia pollicana? Petioli
folio duplo longioribus stipula lato ^{imbricati} lincio. scapi erecti
laterales vel terminales elongati bifidi. involuella
4-6. ovata. Pedicelli 2-3. fovea calycis lanceolata
Petala duo majora

Stipulaceum *g* acule, calycibus monophyllis, foliis oblongis
inæcis serratis, stipulis subulatis rigidis albis, floribus umbella-
tis Lin Suppl. p. 306. S. V. p. 619
Habitat in Cap. b. p. 1

Gen. num. stipulaceum caule herboso imbricato, foliis
sublobatis inæcis crenatis, stipulis apice bifidis
lanceolatis reflexis, florum pedicellis longis
Pavan. dos. p. 254 Tab. 122. fig. 3.

Caules imbricati stipulis aridis rotundatis. Folia petiolo
breviora villosa obtusa. Stipula petiolo adnata
scapus sulcatus 3 vel 4 pollicari involucri folioli
lanceolata brevia villosa. Pedicelli saepe 4^{or} longi-
tudine fere scapi. Lacinia calycis ovata reflexa
Petala superiora longiora Pavan.

Pelag.

non vidi.

articulatum & articulis foliis 5-que lobis in se, umbella subquadriflora,
pedicelli longissimi Cavan. Des. p. 252. Tab. 122. fig. 1.

Habitat in Cap. b. sp.

folio breviter 5 pollicari.
Radix articulata squamosa. Scapi articulati. Folium radiatum, longissime petiolata cordata, obtusata, lobis trifidi mollioribus
vellosa. Stipula orbiculata emarginata. involucri in poly
phylla. pedicelli 4 longitudine scapi. Calicis calycis
oblongo. Corolla pollicari petala 2 superiora majora
Cavan.

Adrum Pelargonium

caule foliis oblongis integris pennatisque

L. Herod. - Geran. tab. 44

non vid.

Pelarg. 1
hirsutum q. acaule umbella composita, foliis obovatis lancicollatis
ve integerrimis pinnatifidisve hirs. ciliatis Hort. Kew.

^{2. p. 417}
Geranium hirsutum Burm. geran. no 60. tab. 2. foliis ovatis
laciniatis rugosis hirsutis Burm. geran. no 60. tab. 2. Cav.
Geranium lobatum β. Spei. pl. pag. 450

Desf. pag 247
tab. 101. fig 2

Habitat in Cap. b. Spei 24

Radix crassitie digiti turbinata apice ~~stipulis~~ folia
radicalibus, petiolata sesquipedaliana, comosa hirsuta
lancicollata, obovata integra vel pinnatifida.
petioli utrinque stipula adnata ferruginea lancicollata.
Scapi plures digitales hirsuti simpliciter
involucris polyphylla petioli hirsuta inaequali linea
ni lancicollata. pedunculi 6 in umbella pollicia
res inaequali. Cavinis calycis linearibus - lancicollatis
to. Capsula tomentosa.

an Pelargonium ciliatum L. Hort. Geranod.
tab. 7

add. 1/2

arenanum ^{acaule,} G Folio pennat-fidis foliis ~~oblongis~~ ^{oblongis} ~~enisp-~~ serrati
a Geranium africanum humile, adianthi foliis Herm parv. Boter
100 Raij hist. 3. p. 511. no 9.

Habitat in Cap. b. frei

~~Rad.~~ Scapi folio altiores, umbello 4-5 floso Calyx aristatus Burm

non vidi

heterophyllum (P) ^{ex glabris} acule, foliis ciliatis simplicibus Vernatis que, umbellis
compositis

Pelargonium heterophyllum Gayus coll. 4. p. 197

Habitat ad Cap. b. p. 2

Radix repacca. Folio radicalia plura, ~~undia~~, margine pilis copiosis erecti
rigidulis ciliata utrinque glabra. Petalo basi utrinque stipula lanceolata
lineari hispida alata, acuta vel obtusa Vernata lobo intermedio
profunde trilobo interdum maximo interdum lateralibus aequali
lateralibus integerrimis vel excisi, simplicia ovata, vel obsolete
triloba. Scapus erectus hispidulus, 1-2 polliciarum. Umbella 3 vel
4 radiatus radii semipedales hispidi. Anvolucron foliola lanceolata, hispida,
inæqualia saepe cum foliolo Vernato. Anvolucella lineari-lanceolata
hispida, reflexa aequalia. Pedicelli 2 polliciarum. foliola calycis lineari
lanceolata hispida. Petala cuneiformia alba, duo superiora
parum latiora macula sanguinea ad basin. Germin ferocum
4 ad qu.

non vidi

Triphyllum G. (P.) acule, foliis ternatis: foliolo ovato crenatis glabro
umbellis compositis

Polygonum *Triphyllum* Jacq. Coll. 4. p. 199.

Habitat ad Cap. b. p. 4

Radix rapacea. Folio radicalia plura, ternata. Foliola ovata, obtusula
brevissima petiolata, crenulata glabra, subtus sine ore lenticulata;
latum lobis parvis, in medio squipollicari. Petiolus inferne hirsutus
basi alatus utrinque styula lineari acuta hirsuta. Scapus breviter
ciliatus ter, hirsutus ^{ter} erectus. Umbellae compositae ex radiis mu-
ltis non solito succedentibus duobus vel tribus simplicibus
hirsutis. Involucrum foliola parva, lanceolata, hirsuta, inaequalia.
Involucelli foliola plura lanceolata parva reflexa hirsuta.
Pedunculis ciliatis hirsutis. Calyx reflexus foliolo hirsuti
aequalibus lanceolatis. Petala cuneiformia rola duo superiorum
duplo latera. Germinis cum haec

non vidi.

Infidum 9

geranium africanum noctu oleis flore rubro, anemone folio angu
stiore Plukn. tab 186 fig 6.

Pelargonium rapaceum foliis ternis trilobatis et tridentatis flore
languineo Burm afr p 91. t. 35. fig. Petw. gar. 84. fig. 11

Geranium calycibus monophyllis foliis ternis trilobis et trifidis
radice rapacea Burm. Geran. no 74

Habitat in Cap. b. frei t

Radix subrotunda. Oblio crassa. Scapus pithameus. In floris

Corolla irregulari Burm

non vidi

^{ocule}
nervifolium (P.) ^{folius} Ternatis Inlobis ve glabris integerimis bifidisve, umbell,
^{compositis}

Pelargonium nervifolium Jacq. coll. II. p. 198.

Habitat in C. b. sp. 2

Radix rapacea. Folia obtusa glabra margine ~~pub~~ ciliata ad costam,
reticulata, subovata, ternata, vel triloba folioli integerimis
vel inaequalifidis. Stipula lanceolata acuminata hispida. Ca-
pus erectus sculis truncatis, teres pilosus. Umbella radii tres,
semipedales pilosi teretes. Folia involucri σ . lanceolata hispida
aequalia involucrii similia. Pedicelli 5-10 hispiti. Calycis
foliola acuminata, lanceolata, margine lanata aequalia. Petala
cuneiformia alba, patentissima duo superiora lobata stria duobus
immixtis rubris. Germen sericeum Jacq.

Lobatum G. Caule truncato, scapis subradicalibus, umbella composita
Linn. l. V. Barro. ger. n. 50

Geranium africanum noctu oleo tuberosum, vitis foliis
hirsuti Comm. hort. 2. p. 126 t. 82.

~~hirsutum B Geranium calycibus monophyllis, foliis ovatis laciniatis
negosi, radice tuberosa Barro. ger. 60. fig. 60.~~

pennatifidum G Geranium calycibus monophyllis, foliis duplicato
pennatifidis: laciniis linearibus obtusis, radice tuberosa
du Barro. ger. 69. fig. 69.

Habitat ad Cap. t. p. 2

Geranium lobatum radice tuberosa, foliis ternatis
crassis magnis tomentosis scapis radicalibus
divisis umbelliferis Barro. des. p. 250. tab
114. fig. 2.

Lobatum Pel. acaule, umbella composita foliis ternatis quina
tive lobatis tomentosis Hort. Kew. pag 410.

Caule vix ullus. Radix superne squamosa. Colca radicata petiolata terra
interdum foliolo reticulata vel quinato pinnata. Colcola opposita inferiora petiolo
scapo subternato ad 4th reliqua sessile, terminalis 3 vel slobopinnatifida oblonga
actenuis latius altero venosa villosa subtomentosa, venosa subtus subnigra iniqua
cum terminale cordata

liber serrata, polliciana vel ultra stipula oblonga obtusa petioli villosa
foam plureserati hirti fruticatos interdum simplices interdum sursum
in pedunculis umbelliferis. Involucra polyphylla lobis colorata. pedi-
celli circiter 8 sesquipedales lacinis calycis lineari lanceo-
latis villosis ~~in~~ stipula.

barbatum (P) 9 acule foliis pennatis pennis linearis lanceolatis

Pelargonium barbatum Haïqu. Coll. 4. p. 196.

Habitat ad Cap. Spei 7

Radix saryacca. Tollea radicalia, plera, semipedalia, costis videntur
glabra, basi utraque stipula lanceolata linearis umbella 9 labra
alata, pennata: pennis linearis lanceolatis acutis integerrimis
decurrentibus, apice pilis 2. 3. barbatis bif. trifurcatis. Scapi vix
unciales erecti, subpilosuli. Umbella videtur cernitur 3. bipollicares
4 involucria polyphylla, linearis lanceolata, subequalia villosa
4 involucria polyphylla hispida subequalia. Pedunculi villosi vix
involucria superantes. Calycis foliola linearis lanceolata villosa
ciliata, 4 vix reflexa 4^{thum} erectum. Petala cuneiformia semireflexa
pallidiorum rosea duo superiora duplo latiora inferiora linearis duobus
vix inferiora linearis unia. Germen semel cum Haïqu.

non vidi

astragalifolium G. radice crassa: foliis pinnatis foliolis ovatis acuminatis
latentibus cineris hirsutis: scapus subradicalibus elongatis umbelliferis
Cavan. Desf. p. 257 Tab 104. fig. 2.

Geranium africanum astragalifolium Commel. plantae exoticae p. 53.
fig. 3.

Geranium pennatum Burm. no 66

Habitat in Cap. b. p. 2

Radix crassa. foliola cuneata subpinnatis ovatis acuta cineris hirsutis
scapus foliis longior. Involucrum foliola ovata acuta Cavan.

pennatum P. caule umbella subcomposita foliis pinnatis folioli
subrotundo-ovatis indivisi utraque hirsutis

H. Kew. 2. p. 417 L'Herit. Girard. Tab. R.

astrag. Totum villosum. foliola oblonga, ut usque velona, intus
nervi minus basi attenuata, acuta, integerrima. Calycis lacinae
lineari lanceolata herb. Guss.
pennatum: ~~pet. lobis~~ ~~scap. foliiformes~~ pet. herb. Guss.

~~lynnatum~~ P. acule umbella subcomposita foliis pennatis: foliolis subrotundis
do oratis ad corpi utraque, ~~hispidis~~ ~~H. Kew. 2. p. 417~~ ~~et~~
geranium calycibus monophyllis foliis pennatis foliolis oratis

~~geraniol.~~
~~tab. 8~~

Murm-geran. no 66

Geranium prolificum pennatum & Lin. sp.

Geranium pennatum radice turbinata tuberosa foliis pennatis:
foliolis parvis oratis subsessilibus ~~Cavan. Disp. p. 257. tab~~
115 fig. 2.

Habitat in Cap. b. sp. 4

Stem erecta 4-5 que supra foliola subter tomentosa. Scapi pitha
moi. foliola involucri oblonga pedicelli 2-7. petala 2 superum
maiora Cav.

~~pennatum~~ petala et scapi filiformi pilosi. Calycis lobis
cuneolatis

~~nudi~~

glutinofum G

Geranium glutinosum Jacq. coll. 1. pag. 25.

Habitat in Africa

frutex quadripedali crassitie digiti ramosus. Rami juniores uti folia juniora visco
resima. Rami juniori et pedunculi scabri. Folia longe petiolata alterna, inter
dum opposita, supra lucida subtus venis exstantibus hispida, basi cordata, profun
de triloba lobo intermedio elongato trilobo acuta inaequaliter serrata: lobi
laterales saepe obtusius velobati. Pedunculi axillares, umbellati. Peduncul
axillares saepe obtusius velobati. Sepala lanceolata acuminata. Bractes ovatis, acuta
hirsute saepe. Calyx hispidus, 5phyllus, basi campanulatus. Lacini ovatis acuti
petala cuculliformia purpureo rubra superiora 2 tubus vel quatuor maculis san
guineis notatis filamenta 7 fertilia. Jacq.

proliferaum γ . Scapi radicalibus, umbella composita globosa. Lin. S. V

geranium africanum myrtidis folio, flore albicante
radice rapacea Comm. hort. 2. p. 125. t. 63.

Plukn. t. 415. fig. 1.

proliferaum β Geranium calycibus monophyllis, foliis pennatis
divisi, foliis ^{tri-} et quoque partibus linearibus, radice
tuberosa Burm. ger. 70 Caran. Diss. p. 259. Tab. 120 fig

~~pennatum γ Geranium calycibus monophyllis, foliis pennatis
foliis ovatis Spec. pl. t. p. 677. Burm. ger. 66.~~

Habitat ad Cap. 6. Spec. 2

Planta vix palmaris. folia radicalia pericardium caput in
lacinis tenuissimis dispersa. Scapus folis longior solitari
us in ramos diversos apice umbelleferos, pedicelli 3-5

Geranium

Pelag.

non vidi

melananthon. G. Cel.

Petargonium melananthon Gaerq. coll. 4. p. 180.

Habitat in Cap. b. p. 4

Radix rapacea. Folia radicalia pennata pilis adpressis hirsuta
Dila 4. s. pollicaria; pinna inciso lobata saepius opposita
Pesples et decurrenter proster duarum subreticulata
lobi oblongi. Stipula lanciolata villosa. Scapus uncialis
erectus hirsutus. Umbella primaria tridivisa hirsuta.
partialis multiradiata involucri et involuella lanice
lata hirsuta. foliola calycis lanciolata hirsuta. Petala
cuneiformi linearia alba papillis atropurpurea. Germen
hirsutum Gaerq.

non vidi.

car
carnaeum 9. (C) aciculae, foliis bipinnatis. pinnulis decurrentibus incisose lobatis.
umbrella simpliciter

Pelargonium carneum Jacq. coll. 24. p. 189.

Habitat ad Cap. b. p. 4

Radix rapacea. folia radicalia ^{bipinnata} oblonga 5 unciata sublobata
Stipula linear-lanceolata. pinna opposita utraque terminata
pinnulis decurrentibus in lobos duos vel tres oblongos incisos.
Capit. erectum, semipetalis rare pilosis. Umbrella simplex
& involucrium isophyllum linear-lanceolatum. pedicelli bi-
polliaeres 7. foliola calycis linear-lanceolata villosa acicula
munita. Petala subaequalia duo superiora triplo latiora
rubra venosa, omnia primum pallida deinde carnea. Ger-
men siccum Jacq.

fenilae cum ~~g~~ foliis pinnatis folioli lobatis incisivi revoluti: petalorum
unico superiore ^{erecto} meta, reliqui quatuor dependentibus. Car. in d. r. /
pag. 265. tab. 110 fig. 2.

Pelargonium foliis fenilaeis multifidis, flore rubello Burm.
abr. 938. 36 fig. 1.

Geranium calycibus monophyllis, foliis laciniatis multifidis
radice tuberosa Burm. gener. no. 72.

Habitat in Cap. l. hei 5.

Radix crispus. foliola subtus tomentosa a pice rana denticu-
lata. Sapi foliis longiores superne ramosus: ad ramulos
folium. umbello radius 3 Car.

non vidi

rapaceum q. acaule, umbella compoſita, foliis delcompoſite lacinatis
villoſis Hort. Vind. p. 418.

Geranium africanum myrtilloſo folio, flore albicante radice
rapacea Comm. Hort. 2. p. 125. tab. 63.

Geranium proſperum a
Gen. Pelargonium rapaceum Gaertn. coll. 4. p. 190
Habitat in Cap. b. frici 4

Folia raris cilia pilofuſcula ^{longe} pedalia, duas unicas lata
pennulis lancolato linearibus, trifidis bifidis ſimpli-
bus. Umbella compoſita. Scapus communis teres, hirsutus
partiter plures. Involucra et involuella polyphylla
lanceolata acuta piloſa. Corolla ^{alba} deumma
gu roſea. Duo ſuperiora maculis ſanguinei Corolla duo
foliola linearia ^{trina} ~~aut~~ oblonga Corolla papilionacea
foequ.

Triste G. caeruleo-flores, scapis bifidis monophyllis Lin Spic. pl. pag

950 + L. V.

Burm. ger. 57.

Geranium triste Corn. canad 109. V. 110

Geranium noctu oleas otheopium radice tuberosa foliis myrti
dis latioribus et angustioribus Breyn. Cent 126. V. 50.

Habitat ad Cap. b. p. 4

Geranium triste radice tuberosa foliis longissimis bipinnatis
hirsutis, floribus umbellatis noctu fere olentibus, corollis
fulisqualibus atro maculatis Caran. d. s. p. 261.
Tab 107. fig. 2.

Triste Pelargonium subcaulescens umbella simplicis, foliis
multifido laciniatis velloso laciniis lanceolatis
Caran. d. s. p. 2. p. 410

Radix e vno tuberculo subrotato in filum attenuato
in vicem emissa. Calicis vni velloso ubi tota

planta. Folia longissime caulina opposita
bipinnata vel bipinnatifida foliolis oppositis alter
nusque. Stipula laciniis lanceolato acuta. Stipula
la ovata. Pedunculis axillaribus pediculis. Antheris

^{foliolo ovatis}
enim. Pedicelli 2-12. In pollicares. Lacinia calycis lanceola
to obtusifida. Corolla subaequalis vix luteo-
nigra matula atra. Capsula tomentosa

Clavum G. foliis trifloram alternatum pinnatis: foliolis pinnatis
Scapulis hirsutis Burm. prodr. 14. Lea. Man. V. 257. t. V. 614.

Geranium daucifolium calycibus monophyllo, foliis hirsutis
alternatum tripinnatis, foliolis pinnatis fides Murr. in Conn.
gotth. 1700. p. 13. t. 4

Habitat ad Q. b. spei 4

Geranium daucifolium, radice globosa tuberosa, foliis
hirsutis tripinnatis: pennulis alternis foliolis
minimis ut plurimum lanicollatis Cavan. Dis.
pag. 260. tab. 120. fig. 2

Clavum Pelarg. subt caules ensi umbellis simplicibus foliis de com-
positis laciniatis hirsutis: laciniis linearibus G. Kew
2. p. 410

Folia radicalia, longissima tripinnata pennulis alter-
nis minimis. Scapulis pedales. involucri foliola
ovata. Pedicelli cuneatis decem, sesquipedalia
rei corolla albedo pallens. petala reflexa

non vidi.

pinnatifidum 9 foliis duplicato pinnatifidis: laciniis linearibus obtusi
radice turbinata Cav. Diss. p. 260 tab. 120. fig. 1.

Geranium africanum foliis bipartitis longis venis distinctis flore albo
punctis purpureis radice tuberosa Her m. pl. Afric. p. 11.

Habitat in C. b. Speitz

Folia glabra. Scapi umbellata irradiata verminati

Pelargonium

non radi.

appendiculatam g. calycibus monophylli, foliis radiatis supra
decompositis hirsutis, petiolis appendiculatis, umbella scapo
longiore h. suppl. p. 304. * L.V. p. 610.

Habitat in Cap. spec. 4

Geranium appendiculatum radice rampica nupserante
foliis radicalibus tomentoso laciniatis duplicato penna-
tis. stipulis longe decurrentibus apice latissimis, umbella
radis scapo ^{sub} equalibus Cavan. disp. pag. 262. tab. 121.

fig. 2.

Folia radicalia, longe petiolata, pinnula breves. Stipula
petiolo adnata lobis cordatis acutis. Scapi plerumque duo
erecti tomentosi foliis brevior. Pedicelli 10 foliolo
involucris plura tomentosa subulata. lacinis calycis
acuta

Pelarg. non vid.