

*Pelargonium*

*glandulosum Scop. Spithamei herb. Thauri.*

*acnifolium* g. umbellis subquaquefloris, foliis palmato-quinque  
lobis serratis inferne cuneatis indurpis Hort. Kew. 2. p. 427.  
L'Herb. <sup>tab.</sup> <sup>geran.</sup> Habitat in Cap. b. p. 5

non vidi

hispidum G. foliis palmatis dentato-hispidis, umbellis compositis, involu-  
cris reflexis, caule intricato hispido Lin. Suppl. p. 304. & V. p.  
614. ~~Caerulea pag. 240 tab 110 fig 1~~

Habitat in Cap. & p. 5

Caulis teres ramosus uti tota planta hirsutus. Folia alter-  
na, petiolo longiora Robi. crenato dentata. Stipulae  
ovatae, acutae. Pedunculi axillares et terminales. folio-  
la involucri cuspidata. pedicelli 3-5. lacini-  
calycis ovatae angustae. Petala superiora latiora

Pelag.

non vidi

*aculeis*  
*muniatum* Pelarg. pedunculis triflori foliis subcordato ovatis crenato dentatis  
ramisque scabri stipulis ovatis serrulatis

Habitat in Cap. b. <sup>o</sup> *minuto* <sup>o</sup> *obscure trilobis*  
Rami teretes aculeati <sup>o</sup> *scabri*. Folia petiolata opposita et  
alterna superiorum petioli parum longiora, consistentia  
glacis viridi saepe cum rubore alioque, pollicaria avena  
subtus nervosa nervi aculeatis serrulatis perpendicu-  
ter ope lentis glandato serrulatis. Stipulae acute consistentia  
foliorum. Pedunculi axillares vel oppositi foli. elongati  
aculeati. involuella lanceolata ut lacinae calycis

*aculei*  
*pelluc*

~~Geranium foliis 5 fido lobis incis, pedunculis bifloris calycibus  
incis petalis integris longitudine calycis~~

~~Ex horto Dr. Buchi Hamburgi~~

~~Caulis striatus striatus dichotomus rami villosi rami apice  
incis. Cilia inferna petiolis breviora: Lobi infidi lacini  
3 profunde dentatis dentibus obtusi mucro  
natis. Stipulae supulatae. Petioli foliorum juniorum  
incis. Pedunculi biflori. Calyces striati anastata  
Petala alba~~

~~an varietas Gerani fibrici~~

acetosum G. foliis subbinculatis glabris <sup>obovatis carnosis,</sup>  
~~crenatis integris,~~ caule fruti-  
coso lato L.V. Burm. ger. 47.

Geranium africanum frutescens, foliis crasso glauco, acetoso  
Sapon Com. prol. 84. 114.

Habitat ad C. b. p. 5

Pelargonium acetosum Ehrh. Beytr. 7. pag 160

Geranium acetosum caule fruticoso, foliis cuneato ovatis  
crenatis carnosis, corollae petalis superionibus angustioribus  
Cavan. obs. pag. 239. tab 104. fig. 3.

acetosum Pelargonium umbellis paucifloris foliis obovatis crenatis glabris  
carnosis petalis lanceatis. H. Kew. 2. p. 430

Caulis ramosus succulentus. Tota alterna inferora petalis  
longiora basi attenuata subrotunda crasso glauca  
stipula ovata parva. Petioli ope lentis pedalis pubescentia  
vel glabri. Pedunculi axillares elongati univulvata  
ovata. Pedicelli 4 laciniis calycis lineari lanceolatis  
Petala inferora parum latiora

*stenopetalum* Pet. umbella multiflora, foliis cordato subrotundis crenatis  
carinosis pubescentibus, petala angustissima

*Pelasgonium stenopetalum* Em. Beyb. pag. 7. p. 166.

Habitat in cap. b. p. ei

Rami superne uti reliqua partes plantae pubescentes. Folia  
sopra zona notata. Stipula ovata subsericeo angustata  
involucella ovata. Pedicelli 7. sesquipedales lacini  
calycis laciniolata margine albido. Petala lacini calycis  
multo angustiora corina

revolutum G.

*Geranium revolutum* Jacq. Coll. 1. pag. 84

Habitat in Africa

Index byedalis, odore balsamico. Caulis pollicem crassus uti rami seniores acati-  
cati glabri & teretes. Folia opposita petiolata simplicia vane multi-  
partita: laciniis ovatis linearibus acutis margine revolutis, uti petroli  
quidamuli, calycis et rami junioris ad lentem pilis brevissimis albidis hisp-  
tula supradula. Sepala cordata acuta. Pedunculi axillares 1-3 flori.  
Sedula calycis lanceolata. Petala oblonga obtusa substrata duo superio-  
ra basi sanguinea macula media pallidiora stamina 7 fertilia. Stigma spi-  
da. Seminum cauda tortilis pelosa Jacq.



hybridum *G. foliis suborbiculatis glabris crenatis integris, caule fruticoso*

*Sp. Len. Mart. 97. t. V. p. 613.*

*Geranium africanum aborescens, malva folio pingui varietate*  
*Deill. Elth. 152. t. 125. fig. 152.*

*Habitat ad C. b. p. 5*

~~*Geranium*~~  
*Pelargonium coarctatum* *Erh. Beytr. 7. pag. 162*

*Geranium hybridum caule fruticoso succulento foliis alternis orbiculatis crenatis umbellis elongatis, floribus maximis carmineis*  
*Lavan. disp. pag. 239. Tab. 105. fig. 1*

*Pelargonium hybridum umbellis multifloris foliis obovatis crenatis glabris carnosis, petalis linearibus*  
*Hort. kew. 2. p. 424*

*β. Pelargonium roseum* *Erh. Beytr. pag. 167.*

*Rami teretes. folia alterna inferiora petiolis brevibus cordato subrotundis, glabra crenis magnis. Petioli <sup>emarginatis</sup> ovato <sup>ultratis</sup>*

*Petiolis glanduloso pubescentia. Pedunculi laterales axillares*

*6-12. pollicares involucri ovati. lacina calycis linearis*

*lanceolata. corolla maxima*

*umbellis multifloris*

*foliis cordato subrotundis crenatis carnosis, petalis carinatis*

Cotyledonifolia cordato-obtusiata peltatis cucullatis coenatis pubescenti-  
bus Lin. Mant. 569. P. V.

Habitat ad Cap. b. frei

Cotyledonis Pel. umbellis compositis, foliis cordatis peltatis rugosis caule  
carnoso H. New. 2. pag. 42 et L'Herit. Guian. tab 27

non vidi

cordatum G. umbellis multifloris, foliis cordatis acutis dentatis, petalo  
li inferiori linearibus acutis Hort. Kew. 2. p. 427 Cat. Bot. mag. t. 16.

Geranium cordifolium ante fruticoso, foliis cordatis, subrotundo-  
di denticulatis <sup>lati t. omentopi</sup>, umbellis numerosis terminalibus  
Cavan. Desf. 4. p. 240. tab. 117. fig. 3

a foliis indivisi molles simis planis  
b. foliis laciniatis crispis c

Habitat ad Cap. b. frei t  
Caulis fruticosus ramosus, teris Rami capite glabri, superne  
velli longiusculis, articulati. Solea petioli squarrea  
supra etate glabra subtus vello molliter villosa, venosa

varietas culta  
minus villosa  
brannonibus villosis

denticulata sesquipedaliana, alterna. Squala femi  
gines ovata. Pedunculi terminalis pelis longis mollebus  
villosi uti pedicelli et calycis Involucrum polyphyllum  
foliis ovato lanceola <sup>si ferrugineis</sup> Pedicelli pollician  
ab <sup>longice ad</sup> ~~medicamentis~~ <sup>crispores nectinotopi</sup> ~~geniculati~~ <sup>prostruberrate</sup> foliola calycis linearis lan  
ceolata <sup>3m</sup> mucronata. Petala purpurea superiorum  
longiora latera inferiora alba

Pelagoum

— denticulatis subtus villosa subniana

*Crispum* G. foliis reniformibus crispis scabris caule fruticoso Lin. Mart.  
257. & Berg. Cap. 176. L.V. p. 6137

*Geranium crispum*: calycibus monophyllis, foliis reniformibus quin-  
quelobis plicatis crenatis crispis, caule fruticoso Berg. Cap.  
176.

Habitat ad Cap. b. Spei.

*Geranium hermannifolium* calycibus monophyllis, cau-  
le fruticoso, foliis lobatis crenatis pubescentibus, stipu-  
lis cordatis in volucribusque hispido mucronatis Lin.  
Suppl. pag. 305

*Geranium crispum* caule fruticoso, foliis cordatis loba-  
tis dentatis crispis, stipulis cordatis, pedunculis  
uni-bifloris Cassan. Desf. pag. 252. Tab. 109. fig. 2

*crispum* Pel. pedunculis subbifloris, foliis distichis cordatis, trilobis  
crispis mucronatis Hort. Kew. 2. p. 430 & Cent. Geranoid.  
Tab. 32. <sup>20</sup> quipedali

Caulis ramis paucis cortice fusco, villosis, erectis. Folium  
petiolo squarato, alternis frequentem in ramis disticha  
inferiora subreniformia reliqua triloba, conduplicata  
lobi plicati, nervos, dentata nervi dentibusque <sup>lobis</sup> <sup>sub</sup> <sup>lobis</sup>  
culis minuti mucronatis. Stipula unguiculata

superiora minor

Stipula cordato mucronato. pedunculata superiorne oppositifoliae unguiculata  
res foliis longioribus puberulis pabris uni vel bifloris. involucri  
401 ovata. foliola calycis acuta canalicolata margine  
tomentosa extus pubescentia. Petala 2 superiora majora

Adaltemum g. pedunculis subbifloris, foliis cordatis 5-lobis undulatis  
villosis mollibus. Hort. kew. <sup>2</sup> pag. 431. L Herbar. german. 834  
Habitat in Cap. b. p. 5

non vidi

Glutinosum q umbellis paucifloris; foliis cordatis hastato quinque-  
lobis viscosi Hort. New. 2. p. 427. L'Herit. Jardin. tab. 20

Curt. Botani  
magaz  
tab 143

Geranium glutinosum Targu. coll. 1. p. 85.

Geranium viscosum caule fruticoso foliis cordatis quinque-  
lobis viscosis, floribus umbellatis

batu acuti dentatis ~~in foliis~~ ~~floribus~~, floribus umbellatis  
Cavan. des. 4 p. 246. t. 100. fig. 2. Scop. in subr.  
2. p. 27. tab. 14.

Habitat ad P. b. pei <sup>uti tota planta</sup>  
Rami <sup>hinc</sup> cortice fusco glutinosi <sup>supra luteo</sup> scabi declinati. Folia  
alterna <sup>supra luteo</sup> superne suberum opposita <sup>lobi ovatis acuti</sup> lobis ovatis acuti  
va magna cordat <sup>venis stipulis</sup> subsimilata  
in aequaliter simulatis subtus <sup>venis stipulis</sup>  
dat & acuminato. Pedunculi axillares, oppositi foliis  
ta tetrales foliis longioribus pilos <sup>pilosis</sup> inflo. involucri  
si ovata manifeste. Calycis foliolo villosa ovata  
reflexa mucronata. Petala duo superiora majora  
Capsula tomentosa

Pelag

*Catenipes G. umbellis multifloris*, foliis cordatis quinque lobis subdentatis  
lobis carnosiss, ramis teretibus. Hort. Kew. 2. p. 420. L'Herit. Jern.  
tab 24 Habitat ad Cap. b. p. 15



*Fusiatum G. Pelonj*

*Pelargonium fusiatum* Jacq. Coll. 4. p. 106

Habitat ad Cap. b. p. 1

Caulis teres quadripedalis teres ramulos cicutinatus. Folia alterna ad pedunculos saepe opposita cordato subrotunda tri-5 lobata acute crenata, utrinque glabra excepto in venis subtus superius in profunde lobata lobis oblongis sono sanguines fusio maculata. Stipula ovata acuminata dentata. Pedunculi & abriusculi atilares alterni. Flores qui umbella. involucri ovata ciliata Calycis foliola lanceolata aperta alutrasnata ciliata summa latius inferiora & reflexa. Petala 3 inferiora oblonga breviora rosea superiora cunei formis triplici latiora subarsate rubra. Stylus pelosus.

collected in Pelag. foliis cordatis subrotundis 2-5 lobis, caule carnoso  
peripetio breviter, umbellis multifloris. Rust.  
Botan. mag. tab. 307.

*Hydrocotyle* Cass. bipart.

Petala 2 breviora parva majora vix macula peripetio

non vid.

aculeatum P. foliis oblongis incise - lobatis umbellulis trifloris, caule spinescente

Paterfons A. p 67 cum ic.

Habitat in cap. b. pres 3

novi

~~Cerodophyllum. Pelag. umbellae multiflorae, foliis remote pin-  
natis cernosis teretibus: laciniis corollae lobatis albo-  
luteo infusi Herb. Vind. 2. p. 422. (Herb. german. tab.  
Quart. botan. n. 313.)~~

~~Habitat in Cay. - b. p. 1~~

non in vidi

ex stipulatum Galarg.

umbellis paucifloris, foliis cordatis tripartito lobis  
fid. dentatis canis, stipulis subnullis Hort. kew. 2. p. 431

L'Herit. Geran.

geranium exstipulatum caule fruticoso, ramis erectis, foliis alternis duplicato

Tab. 343

lobis venatis glabris Cavan. Desf. 4. p. 253. Desf. 5. p. 271. Tab. 123. fig. 1.

exstipulati

Habitat ad cap. v. p. 1

Rami teretes, glabri. Folia sparsa glauco viridia glaberrima unguiculata obtusa supra crenata <sup>lobi trilobi. obtuse den</sup> ~~crenata~~ <sup>venis</sup> ~~venis~~ <sup>avenis</sup> ~~avenis~~ subtus puberula. Petioli longitudine folii. Umbella biflora laciniis calycis lanceolatis

peltatum G. foliis quinquelobis integerrimis glabris subpeltatis, caule  
fruticoso. Lin. t. V. Burm. 40. Mill. Dict. 7. 140 <sup>Coran</sup>  
<sup>do h. pag 232. tab 100 fig. 1.</sup>  
Geranium africanum, foliis inferioribus oppositis, superioribus  
agris maculatis splendens et acetofo sapore Comm. prod.  
52. tab. 2.

Habitat ad Cap. b. sp. 5  
glaberrima. Caulis carnosus partim erectus partim declinatus  
articulatus. Folia alterna petioli breviora, carnosae foere  
macula nigricante versus centrum. Stipula ovata carnosae  
Pedunculus communis oppositifolius elongatus. Pedicelli  
3-5 bipollicares. Involucrum foliola 4-5 ovato-lanceola  
9a Calycis foliola ovato-lanceolata mucronata. Germen  
vellosum Petala superiora latera

<sup>peltatum</sup>  
Pelargonium

umbellis paucifloris foliis  
ramis angulatis Hort. Kew. 2. p. 427.

carnosi peltati

variegatum g. glaucum calycibus monophyllis, foliis alternis  
trif. quinque partitis. lobis trifidis serratis, stipulis cordatis  
ovatis, umbella pauciflora Lin. Suppl. p. 305 & L. V. p. 620

Habitat in Cap. b. p. c.

geranium variegatum. foliis alternis lobis lobis trifidis serratis  
to-dentatis, stipulis latis cordatis pedunculis bif. triflo  
ris Caran. Desf. pag. 251. Tab. 110 fig. 3.

Tota glaberrima glauca. folia alterna petiolis  
brevioribus crassiuscula, basi subcordata. lobi lanceolati  
profunde pauciserratis serraturis infescentibus.  
stipula lato, acuta. Pedunculi oppositifolii involu  
cella 4-phylla. Pedicelli 2-3. pollicari. Calycis lacinae  
lanceolatae acuminatae. Petala 2 superiora majora

Pelargon

— glaberrimum

fulgidum G. foliis tripartitis incis: intermedio majore, umbellis ge-  
minis, caule carnos. lenticoso. L. V. Burm. ger. 52.  
Caran. Desf. pag. 253. Tab. 156. fig. 2.

Geranium furnanense, chelidonii folio, flore corcineo petalis  
aequalibus. Tell. p. 60. t. 26.

Geranium africanum, folio albes, flore corcineo fulgidis  
Dill. Elth. 156. t. 130. fig. 137.

Habitat ad Cap. b. p. 5.

Caules carnos, tortuosi. Folia copiosa petioli longiora  
mollia tripartita incisa, lacina intermedio pro-  
nutiore serrato dentata, planta floente emarida  
stipula per basin petioli decurrentes. Pediculis  
communis tomentosus. pedicelli pollicares tres vel  
quatuor. lacina calycis 4or reflexa. Petala  
duo superiora majora Caran.

fulgidum Pal. umbella gemini, foliis tripartitis pennatifido  
incisi lacina intermedia maxima Hort. kew. 2. n.

422.

non vidi.



bicolor. g. foliis cordatis tripartitis lobatis hirsutis, floribus capitatis, caule  
fruticoso Jacq. in S. V. pag. 614. Hort. 1. 8. 39

Habitat ad Cap. b. frei

bicolor. g. caule brevi fruticoso, ramis teretibus foliis oppositis  
tripartitis hirsutis lobis cuspidatis dentatis umbellis multiflo-  
ris paucis capitatis Caran. des. pag. 240. Tab. III. fig. 1.

Caulis tortuosus cortice auresco, ramis sub<sup>ter</sup> hirsutis  
Solea superiore alterna longe petiolata, se ab inferioribus  
Stoba subpinnatifida lobo inferiore bifido, pro medio dente  
tuo dentibus obtusis mucronatis, utraque parte sublongioribus  
nervis villoso hirsutis basi subcordata subtus hirsu-  
tis stipula ovata acuminata villosa ferruginea. Pedun-  
culi oppositi folii et terminales elongati angulati.

Pedicelli ~~2~~ 15 pollicariis subhirsuti uti calycis  
involucrum polyphyllum foliolis 6 ovatis mucronatis  
natis calycis lanceolatis mucronatis. Petala vix  
caerulea margine alba duo superiora parum latiora

Palangon: bicolor umbellis multi floris, foliis ternatisifidi lobatis  
dentatis undulatis villosis H. Kew. 2. p. 425  
Curt. Bot. Mag. Tab. 201

*Cortusa folium* g. umbellae multiflorae, foliis cordatis inciso-lobatis unda-  
tis obtuse dentatis, stipulis subulatis Hort. Kew. 2. p. 420. 2 Her.

Habitat ad Cap. b. p. 5 Germ. tab. 25  
germinum tabulare Carun. Desf. p. 232. tab. 100 fig. 2

non vidi.



graveolens G. umbellis multifloris subcapitata, foliis palmatis septem  
lobatis: laciniis oblongis obtusis; marginibus revolutis Hort.

New. 2. p. 423. Her. L. Her. Geran. tab. 17

Geranium verbenaceum caule arborescente foliis duplicatis  
crenatis umbellis multifloris

Infidi lobi lobi infidi Cav. Desj. 4. p. 250. T. 114. fig. 1.

Habitat ad Cap. b. p. 15

Caulis corymbosus. Rami villosi. Folii oppositi vel alterni  
trifida lobis intermediis in lobis laterales bi. lobi laciniis  
obtusis dentatis supra obtuse fere nuda subtus villosula  
proferentem marginem. stipula subcordata acuminata  
Pedunculi oppositifolii foliis parvis longioribus in solium  
foliola saepe ovatis villosi. laciniis calycis oblongo mucro  
natis. Petala superiora latera.

Pelarg

abrotanifolium *Q. foliis multifidis linearibus incanis; caule suffruticoso*  
Lia Suppl. pag. 304 & L. V. pag. 614.

Habitat in Q. b. spec. 5

Caule fruticoso, cortice cinereo ramosis, rami a basi stipula  
num persistente inferne sic ful. & pen. folia numerosa petio  
lata ternata: foliolo trifido linearibus obtusi. Stipula  
setosa brevissima basi dilatata. Pedunculi raris apices ramorum  
pedicellares pollicares involucrium polyphyllum lanceolatum. radii  
umbello 2-5 semipollicares. facies calycis orato villosa  
Corolla inequali

Rami oppositi saepe teretes, inferne basi petiolorum  
persistente squarosi, raris raris, raris raris. folia  
villosa incano, unguiculata. Calycis lacinae lanceolatae  
herb. 4. usq.

Pelay

~~manuscript~~

quercifolium g. calycibus monophyllis, foliis pennatifidis paucibus ro-  
tundatis, lobis crenatis, floribus umbellatis Lin. Suppl. pag 306

L'Hortus quercif. S. V. pag. 619. ~~Caran. def. p. 246 & 119. fig. 2.~~

tab-14 Habitat in Cap-6 p. 15

15. pennatifidum L'Hort. quercif. tab. 15. foliis pennatis lobi

Germium quercifolium caule fruticoso foliis pennatis lobi  
rotundatis crenatis oblongis floribus umbellatis Caran

theseranthium Desf. pag 426. tab 119. fig. 1.  
cum Murray in Pommert. gotth. Pami pubescentes. Stipulae oppositae, petioli interdum brevior  
7. p. 100. tab-4 basi subcordata oblonga subtus venosa utraque villosa  
lobi oblongi obtusi extusque laterales laterales crenulati  
intermedii utraque saepe et iterum lobatis crenulati  
Stipulae subcordatae. Pediculi axillares folios longior  
res foliola involucri marcescentia 6-7 ovata acuminata  
to. pedicelli unides brevissimi pilosi uti calyces  
calyces foliola oblonga, mucronata reflexa. Petala  
2. majora

Pelary.

umbellis submultifloris, foliis cordatis pennatifidis  
crenatis paucibus rotundatis filamentis apice asperis  
dentibus

*Radula g. umbellis pauciflora*, foliis pennatis fido-laciniatis  
fiabni margine revolutis: laciniis linearibus Hort. Kew. 2.  
p. 423. & *Herbar. Geran.* Tab. 16. *Curt. Bot. major* tab. 95-  
*geranium revolutum* Gaigu. coll. 1. p. 84.

*Geranium radula*. caule fruticoso, foliis profunde pinnatis  
multis  
lobis  
laciniatis, pedunculis paucifloris  
Cavan. *Diog.* p. 262. Tab. 101. fig. 1.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Caulis ramosus. Rami teretes subpubescentes subnervi  
folia frequentia, opposita <sup>lobis</sup> ~~petiolis~~ <sup>venisque</sup> ~~venis~~ <sup>venis</sup> interne  
petiolis aequalia 3-4 fida laciniis <sup>venis</sup> ~~venis~~ <sup>venis</sup> interne  
div. trifido lateralibus bifidis laciniis linearibus  
pennatis fidis laciniis linearibus inaequalibus utraque  
vare subulosis. Sepala margine parum revoluta,  
Sepala ovata acuminata. Pedunculi axillares  
solitarii, 2-3 flori longitudine vix folii, involucri  
subpentaphylla lanceolata. Calycis laciniis oblongo-  
lanceolata pubescentis mucronato. Petala 2 superiora  
v. lateralia Cappula villosa odor Plantae Theriacalis  
naucis

Pelony

*Carnosum* G. caule furticoso, articulis carnosis gibbosis, foliis pennatifidis,  
petalis linearibus Lin. Am. acad. 201. & Barm. ger.  
5. 1. Caran. Desf. voy. 266. tab. 99. fig. 1.

*Geranium africanum carnosum*, petalis angustis albis  
Sibth. Bell. Eth. 153. t. 127. fig. 154.

Habitat in Othiopia 5

Tota glaberrima. Cauli humili. basi ramorum napiformes  
rami superne oculo armato vellosi. Folia petiolata alternu  
laucina alterna extropum parum latius apice serrato  
in se oculo armato vellosa. Stipulae breves ovatae pedun  
culi oppositifoliae elongatae involucri foliola 5-6 ovata  
nava. Pedicelli 5que laucina calycis linearis lanicolata  
subpubescentes mucronata margine membranaceo revoluta  
Petala subaequalia. Pappus ferrugineo tomentoso

*Carnosum* Pal umbellis multifloris, foliis pennatifidis laciniatis  
petalis linearibus, articulis carnosis gibbosis H. Kew. 2. p. 421



*Corrigatum* G. glaucum calycibus monophyllis, caule erecto, foliis pinnatifidis: laciniis integris lanceolatis hinc Suppl. p. 306. r  
P. V. p. 619

Habitat in Cap. b. p. r

*Geranium corrigatum* caule fruticoso glabro pubescente  
foliis ternatis sublinearibus trifidis glaucis pedun-  
culis bifloris Cavan. des. pag 255. tab. 121. fig. 2.

Folia opposita glauca petiolis longioribus stipulis subula-  
ta. pedunculi <sup>biflori</sup> glabrescentes, involucri foliola 4  
lanceolata acuminata, fol. laciniis calycis  
reflexis. Petala superiora majora. Capsula mono-  
sperma Cavan.

foliis ternatis foliolis linearibus trifidis



lanicolato reflexo. Petala rotundata superiora parva lutea inferiora



*Ceratophyllum*  $\gamma$  umbellis multifloris, foliis remote pinnatis imo  
pinnatis, laciniis canaliculatis obsolete trifidis Hort. Kew.  
2. p. 422. L'Herit. Gen. tab. 13. Curt. Bot. mag. tab. 315  
Habitat ad Cap. b. p. 17.

Pelarg.

non vidi

Fructu operum Fel. folus oppositi bipinnati, pedunculis bifloro Cavan  
Desf. pag: 263. tab- 122. fig- 2.

Habitat in Cap. b. p. 5. Ramuli carnosif filiformes ore latis villis  
lanceatis adiculati glabri folia petiolata, carnosif pinnis  
lineantibus brachis subtus ovato armato mucronato, <sup>folio pinnis longioribus</sup> ~~obtusifolia~~ <sup>vel pollicari</sup>

Foliola opposita  
utrinque 2-3.  
Pinnula alter-  
na

Stipula parva ovata pedunculi axillares glabri. pedicelli  
pedunculis longioribus adpressifolia calycis fecti nris albidis lacinis  
calycis lanceolata. Capsula nris tomentosa. Petala 2 superiora  
majora

ramosissimum. G. caule frutescente foliis bipinnatis, pinnulis subrotundis  
glabris Cavan. Desf. pag 260.  
Pelargonium frutescens ramosum, folioli plurimi subrotundi. Burm  
Afr. p. 89. Tab 34. fig. 2.  
Habitat in Cap. 6. Mai 5  
Foliola opposita minima subsessilia. umbella terminalis 3 flora

non vidi

*Crithmifolium* Pel. umbellae multiflorae paniculatis, foliis bipinnatis  
carnosis apice dilatatis incisae, petalis obtusis supero-  
obtusis Smith. Icon. part. fasc. 3. Tab. 13. v. 13.

Habitat in Cap. b. p. 5

Caulis 1-2 pedalis simplex valde carnosus gibbosus teres glaucus  
glaber apice florifer. Folia sparsa carnosae, glauca glabra.  
foliola alterna cuneiformia irregulariter incisae apice  
dentata: dentibus acutis. Stipulae parvae fuscae. Panicula  
solitaria vel plures in apice caulis alternatim subdecim  
nuptae. in umbellae depresso 3-5 floris, numerosae. Pedun-  
culi et pedicelli carnosae teretes pubescentes. Bractea ora  
to saepe geminae fuscae. Involucrum subquadratum bracteis toiformibus  
lacinis calycis apice subvillosae. Petala aequalia Smith

non vidi



Verni folium g. umbellis multifloris, foliis de compositis pennatis multi-  
fidis linearibus hirsutis, caule carnos, ramis floriferis gracilibus  
Hort. Kew. 2. p. 421. L. Heret. Geran. tab. 12.  
Habitat ad cap. b. p. 5

Polygon

non vidi