

Peltaria

1. alliaea P. foliis ampl exi caulis oblongis indivisi
2. capensis P. foliis caulinis quinatis pennatis linearibus subternis

alluacea P. foliis amplexicaulis oblongis indivisi Lin. Suppl. p. 295. 1. V  
pag 591 Gaigu. fl. austr. Tab. 123.

Thlaspi montanum 1. Clus. hist. 2. p. 130.

Thlaspi montanum, gladi. folio, majus Bauh. pin. 106.

Clypeola perennis, foliis inferioribus petiolatis cordato-angulatis,  
superioribus amplexicaulis lanceolatis, filii oculis uniloculari-  
bus Ard. spec. 16. t. 6.

Habitat in Alpibus Giffraam inter et Cratiam 7

Tota planta glabra levis. Caulis erectus ramosus sesquiped alio  
inferiora

folia in culta tri vel quadri pollicaria, integerrima obtusa  
fima venosa glauca undia remota. Racemi axillares.

Pedunculi folio duplo longior. Flores albi corymbosi.

Demum suberosi

varietatem foliis lanceolatis acutis in horto Hafnensi  
sagittatis  
observari

Boadichia non uti a Crankio appellatur allionis dud &

capensis P. foliis caulibus quinato-pinnatis lineariibus subcarinatis  
Lin. Suppl. p. 296 + Pr. p. 591.

Habitat in C. b. p. p.

Caulis erectus ramosus teres. Coris pedalis foliatis foliola quin-  
to-pinnata linearia subcarinata, glabra acuta. Racemi longi pedunculati  
et calycibus vix pubescentibus. Petala alba emarginata  
calyce quadruplo majora, patenter sessilia. Stylus brevis si-  
mili stigma capitatum. Siliqua pluma subrotunda, ovata  
compressa in egra dissepimento parallelo. Semina in  
centro ut in C. p. p. solitaria in quovis loculo compressa  
lin

non vidi

1. *Arbus*