

Petefia

parviflora Petesia ^{glabra} foliis ovato-oblongis, paniculis terminalibus

Habitat in Guinea 4215

Rami glabri, uti totā planta, inferne verdes, superne compressi. Folia
petiolata, subsperithamsea, acutiuscula, remota oblique nervosa, avenia
subovata. Petioles unguiculares. Stipula parva, ovata. Panicula termi-
nalis cum ramulo utrinque ulterius est erescens, patens, pedicellis ultimis
bifidis cum flora in divisura per floris subumbellati, subspites minuti.
Calyx superus; 4 dentatus. Corolla infundibuliformis; laciniis linearibus obtusis
7 lobis. Anthera longitudine limbi. Silamenta brevisima. Stylus longitudina-
geris tubi, bifidus. As hujus generis? Fructum non vidi.

Triflora Petasii foliis lancicolato-ellipticis glabris, pedunculis axillaribus subtrifloris
Habitat in Montserrat In. Ryan.

Caulis herbaceus? erectus, striatus, purpurascens; glaber

Folia petiolata, opposita, quinquepollicina, integerrima, basi valde attenuata,
apice acuminata, subtus pallidiora, costae et nervi subtus purpurascens,
adultiora utrinque glabra, juniora ope lentis pilis raris v. purpurascens
bus prostratis in costa, adpressa.

Petioles bipollicares

Pedunculi axillares, oppositi, unguiculares, filiformes, leviter pubescentes, pur-
purei, plerumque triflori, rarius quadriflori. Pedicelli unguiculares.

Calycis laciniae parvae,

Corolla glabra: laciniae linearibus

antheris erectis, lineatis, limbo brevioribus

Basia subglobosa, calyce quadridentato coronata, substrata, magnitudine
Piperis nigri, bilocularis.

Semina copiosa, minuta

Carnea Petefia

Forst.

Habitat herb. Mus.

Rami, uti reliqua partes glabri, teretes. Stipulae petiolatae, bipollicariae, oblongae,
utraque acuta, integerrima, obsoleta nervosa, arena. Pedunculi ex apice
ramorum, terni, triflori, in terminis breviter pedicellati. Calyx campanu-
latus, levissimus: lobi ovati

Stipularis Petefia foliis lanceolato-ovatis subtus tomentosis, thyrsi laterales Lin Sp. pl.
p. 160 t. V. 153

Petefia fruticosa, foliis ovatis oppositis, stipulis rigidis interpositis, racemis minoribus
axillaribus, calyce quinquefido Brown. jam. 143. t. 2. fig. 2.

Habitat in Jamaica &c.

Fruticosa. Folia opposita integerrima. Racemi axillares bracteati, laterales
foliis breviores Lin. Sp. l. c.

Trifida Pet. foliis 3 cuneatis corymbis Verminalibus Lour. fl. Coch. pag 77.

Habitat in montibus Cochinchinae.

Caulis suffruticosus 4 yonnis caespitosus 1. pedalis, erectus. Folia lanceolata
lespica, inaequaliter, opposita. corolla alba

non vidi

Simplex forma Petesii foliis lanceolato-linearibus, micem subter muralibus. Lour. fl.

Cochin. pag. 77.

Habitat in Cochinchina.

Caulis herbaceus, simplex semis pedalis, tetragonus, erectus. Folia integerrima glabra ^{opposita} ~~duo opposita~~ ^{majora} stipula vel foliola minora fasciculata. Racemi erecti subdivisi. Baccis parvis & locularis polysperma. Stigma bifidum vellosum.