

Pelivonia

f. alliaica P.

alluacea Petiveria floribus hexandris Act. Holm. 1744. p. 287. t. 7. C. n. l. V. p. 350. Trew.

Christ. 33. 4. 67. Sw. obs. pag. 1304

Verbero aut Scordoneo affinis anomala, flore albedo, calyce aspero, allii odore Sloan
fam. hist. 1. p. 172.

Petiveria foliis oblongo ovatis, spicis longioribus terminalibus. Brown. fam. 274.

Habitat in Tamaica nemoribus

Frutex ergyalis, ramis laxis. Rami subangulati, remote tuberculati, superne
pubescentis. Folia alterna, petiolata, elliptica integerrima acuta glabra
venosa. Spica terminalis, semipedalis apice nitens. Flores remoti

octandra Petwera floribus octandris Lin. Spec. pl. pag. 436. & S.V. p. 350. Jacq.
Amer. 201.

Petwera foliis, Coculis spinosis Plum. Gen. 50. Fc. 219.

Habitat in America meridionali

Simillima Praecedenti ut vix nisi ab exentitate distinguatur. Differt
vero caule breviori striato; staminibus octo; filamentis purpura
reis, nec albis; foliis rigidioribus. Et omnino q. Cabris Lin. Spec. l. c.
a priori specie non differt teste Sw. qui non raro speciem hanc et in eadem
specie observavit