

# Pseudanum

1. officinale P. foliis squamis tripartitis filiformibus lineantibus
2. japonicum P. foliis squamis tripartitis: foliolis lanceiformibus trifidis
3. alpestre P. foliis lineantibus ramosis
4. minus P. foliis pennatis: foliolis pennatifidis: laciniis lineantibus oppositis, caule ramoso sesquipedali
5. Bellardi P. foliis inferioribus bipennatis superioribus pennatis: pennis linearibus lanceolatis subdivisis
6. Silaus P. foliolis pennatifidis: laciniis oppositis lineantibus, involucri uniseriali subnullo
7. albatium P. foliolis pennatifidis laciniis trifidis obtusiusculis, caule paniculato
8. nodosum P. foliolis alternatim multifidis
9. aureum P. foliis tripennatis: foliolis caulinis linearilanceolatis radialibus oblongis multifidis
10. geniculatum P. foliis simplicibus obovatis crenatis

nodosum Piccedanum

Laurus di Candia de alt. detti fascili nodoso Pons Bald. 12 ?

Habitat in Candia herb. Jusj

Caulis teres, striatus, glaber, ad articulos nodosus, penna anserina crassior. Solca oppo-  
sita, supra et opposita: pennula trifida, angustissima linearis, crassiuscula. Semi-  
na oblonga, sulci ex partibus membranaceis angustis



Japonicum P. foliis quinqueis tripartitis: foliolis cuneiformibus trifidis Thunb  
Jap. p. pag. 200

Gamma Boku. Kämpf. am. Ex. 5. pag. 825.

Habitat in Japonia Lib. Royeri

Tota glabra. Caulis sex pedales flexuosus ramis teres. Rami  
alterni divaricati ramulif. Petioli saginantes. Semina ova  
la compressa, lineis elevatis exarata, margine parum alata.

Thunb. glabrum. Caulis striatus, crassitie penne anserinae. Folia bipinnata  
ternata  
la bipinna: foliola inferiora pennata, bipinna, sequentia ~~ternata~~  
penna lanceata, apice serrato inciso

non vid.

confertur cum umbellatis Thunb.

officinale P. foliis quinque tripartitis filiformibus lineari-bus Lin. S. V.  
gmel. hb. 1. tab 41.

*Peucedanum* Bauh. hist. 3. p. 36

a *Peucedanum germanicum* Bauh. pin. 149

b. *Peucedanum majus italicum* Bauh. pin. 149

Habitat in Europa australi praeae pinguibus &

Caulis erectus tripedalis fl. & duo glabris inferne foliosis. Folio  
petiolata glabra: foliola linearia attenuata bipollicaria. superio  
ra ternata petiolo vaginante superiori nulla nisi vagina  
in folio filiformi attenuata vagina superiori opposita pedun  
culi <sup>apiculi</sup> ex vagina. Involucrum et involuella <sup>stae</sup> en



alpestris P. folioli linearibus ramosis Len S. V

Semula foliis libanoticis brevioribus, alpestris, umbellis amplissimis Boiss  
Leydb. 1. p. 65.

Habitat.

umbella ampla

<sup>caule</sup>  
Meca gaudet sulcato glabro foliis triennatis pinnis plerumque trifidis  
involucro polyphylo reflexo

Dubito num illa quam sub hoc <sup>no</sup>mine habeo hanc esse attamen  
ex herb. <sup>Boiss.</sup>  
Leydb. 1. p. 65.

minus <sup>P.</sup> foliis pinnatis: foliolis pinnatifidis: laciniis linearibus oppositis caule  
ramosissimo patulo Hudf. flo. Angl. 101. Lin. S. V. p. 200

*Peucedanum minus* Bauh. pin. 149.

*Selenium montanum* pusillum Clusii, flore albo Bauh. hist. 3. p. 17.

Habitat in Anglia

michi ignota



Bellardi: P. foliis inferioribus bipinnatis superioribus pennatis,  
linearibus lanceolatis ~~suppinnatis~~ ~~subovatis~~  
Habitat in Italia Bellardi qui misit sub nomine Peui.

<sup>minoris</sup>  
Habrum Caulis ~~sesquipedalis~~ parum ramosus. Folii pinnas  
bipollicares, eximis coherentibus. Involucrum  
nullum. Semina ovata laevia.

an eadem planta cum Sclino Carvif. Chabraci

*Silene P. foliolis pennatis fidis: lacinis oppositis, involucri universalis diphylli Lin. S. V.*  
Spec. pl. p. 354 Jacq. fl. austr. 1. V. 15.

*Siler altinum pratense Dod. pempt. 310*

*Septi pratense Bauh. pin. 162.*

Habitat in Helvetiâ, Narbona, Germania, Anglia subhumidis  
glaberrimum. Caulis tripedalis ramosus angulatus fistulosus & luteo  
virens. Folia triplicata pennata. Soleola opposita linearis lanceolata  
ta, mucronata spinula exigua alba extimici coadunati umbello  
inæquales. Involucrum nullum 1-2 phyllon. Semina ovato oblonga  
fistis tribus elevatis notata.



Alfatium P. foliis pennatifidis: lacunulis trifidis obtusifidis Lin. S. V  
Jacq. fl. austr. 1. t. 70

Daucus alfatius Bauh. prodor 77. Hall. opusc. 310. \*

umbellifera alfatia magna, umbella parva sublobata Bauh. herb  
3. p. 106.

Habitat in Alfatia, Palatinatus Dumetis humidisculis

Caulis 1-3 cubitalis ramosissimus paniculatus rami alterni  
fove ex infima parte caulis. folia inferiora multiplicata  
pennata superiora <sup>tri</sup>bipennata suprema pennata ~~foliata~~  
~~pennata~~ pinnis pinnis folioli pinnis decurrentibus subin  
cipi lanceolatis obtusi latiora quam in reliquis speciebus  
umbella parva radiis 5. ceterum plures involucrium  
pentaphyllum. semina compressa nigra foris tribus-jalidis

Folioli

cauli ramosissimo paniculato

nodosum Pseudodanum foliolis alternatim multifidis Lin. h. V. p. 280

Pilaum (quod Ligusticum creticum, folio feniculi caule nodoso Tournef. Con 23)

Boem. Lugd. b. 1. p. 51.

Habitat in Creta

Caulis nodosus

michi ignota



Sibinium Peucedanum foliis linearibus acutis umbellis primordiales.  
sessilibus. Willden. spec. pl. pag 1406.  
Habitat in Sibiria v

non vidi

geniculatum P. foliis simplicibus obovato-subrotundis crenatis  
Pseudanum geniculatum foliis subrotundo reniformibus  
crenatis Tost. prod. pag. 22. n. 136

Habitat in nova Zelandia

Caules herbacei decumbentes ramiferi fruticuli gla  
ber flexuosi elongati teretes. Sola petiolata ~~remo~~  
tissima, ad genicula, sicut geniculata petiolus seorsum  
mi longitudine folii. Umbella oppositifolia sespites  
radice sive sequi pollicari umbellula parva



aureum Peucedanum foliis tripinnatis: Loliolis caulinis lineari-lanceolatis; radice  
tibus oblongis multifidis Hort. Kew. p. 341.  
Habitat in Canariis ♂

non vidi

redivivum P. foliis radicalibus bipinnatis plumosis, caule serotino apy-  
to ramoso, umbelli pauciflori albi Pall. act. Petrop. 1777. 2.  
ney. 252. tab. 8. fig. 13.

non di



*P. galleum*) Banks  
*aureum*