

Phalaris

X X X

cananensis<sup>P</sup> panicula mitia subovata spiciformi, glumis calycinis quadrato  
nerviulantis integris corolla quadriclavi, valvulis exteriorebus  
lanceolatis glabris; interiorebus villosis Hort. kew. 1. p. 85

Phalari majori, femine albo Bauh. Pin 20. Monf. her. 3. p. 106. fig  
D. 4. 3. fig. 1.

Phalari cananensis panicula subovata spiciformi: glumis can  
natis her. 1. V

Habitat in Cananis et Barbana inter segetes ☉

Culmus pedalis vel ultra erectus simplex glaber geniculis fuscis  
vaginis ore ligula membranacea, suprema subspathulata apice  
folio lanceolato unguiculari. Panicula pollicari ovata valde  
acuta utraque linea vixi glabris integerrimo, linea Anthera  
elevata versus marginem

minor Ph: panicula spiciformi cylindrica, calycibus canaliculatis nudis  
neolanis solitariis Petz. opf. 3. p. 8.

Habitat

Similis Ph. canariensis spica longior arisistior valvula oblonga  
acuminata glabra linea utraque infidi versus desinens

Phalaris semine nigro Baubeni? herb. Tournet. spica longior  
et arisistior quam in Canariensis

Ph. tuberosa forte

paradoxa P. panicula mutica oblonga spiciformi, glumis calycinis navicula-  
ribus unidentatis, corolla bivalvi glabra, flosculis infemis promorpsi  
Hort New. 1. p. 107.

Gramen phalaroides, spica brevi setulata ex utriculo prodeunte  
Plukn. alm. 1778. 33. fig. 5. Monf. bot. 3. p. 107. p. 108. 3 fig.

<sup>6.</sup>  
Phalaris paradoxa spica cylindrica: flosculis mucronatis: neutri  
plurimi; infemis promorpsi see spec. pl. pag. 1665 &  
Habitat in oriente et Barbaria ad marginem agrorum  
culmi plures ascendentes vel articulis infemis infractis  
glabri pedales et ultra folia angusta glabra. ligula membra-  
nacea. Saginae duo ultimi spatheae margine membrana  
tes. Spica bipollicari. Valvula angusta in aulam brevem  
terminata, <sup>ramis dilatato</sup> cari glabra, carina superne orculo armata simulata  
gramen speciatim foveae nucleaceae perennis radice repente  
herb. Taur. nep

bulbosa P panicula Cydonia, glumis carinatis Lin. am. acad. 4. p. 264.

Phalari bulbosa femina albo Raj. hist. 1249. Schenck. gram. 53.

Habitat in Oriente.

Ulmus - ramis folia convoluta argutissima spica sesquipedali  
Caud. glumis lanceolatis latere uniuerso

condescens Ph. culmo superne nudo spica verti laxa infusa, glumis  
caninatis acutis Desfont. fl. atl. pag. 56  
gramen phalaroides hirsutum, spica congesta Buxb.  
cent. 4. p. 30. Tab 50.

Habitat Algeria

affinis bulbosa

aquatia Phalaris panicula spiciformi ovato-oblonga, glumis carinatis lanceo-  
latis Am. Acad. 4. p. 264 L. V. pag. 104  
Gramen Typhenum phalaroides majus bulbosum aquaticum Martel. 4. 200

Fig. 1.  
Gramen phalaroides hirsutum, spica longissima Barb. Cent. 4. p. 32. t. 53.

Habitat in Aegypto et ad Tyberim

Culmus arundinaceus, foliis solidiusculis. Eragria folii supremi subren-  
ticulosa spica ovato-oblonga, glabra, vel potius panicula arcta.  
Glumis lanceolatis, glabris, carinatis, utrinque nervo excavato Lin.

A. L. C.

aquatia P. panicula multica cylindracea spiciformi; glumis calycinis  
nerviulatis subdentulatis, corolla trivalvi: valvulis internon-  
tis villosis; extenore minuta subulata. Hort kew. 1. p. 86

Caroliniana *P. panicula* spicata ovata, petalis angustis, calycibus striatis  
Walt. fl. Carol. p. 74  
Habitat in Carolina

non vidi



Caroliniana P. panicula spicata ovata petalis angustatis calycibus  
~~ovatis striatis~~ Walt. fl. Car. pag 74  
Habitat in Carolina

non vid.

nodosa Phalaris panicula oblonga, foliis rigidibus Mant 557. \* L. V. p. 102

Phalaris perennis major, radice nodosa Monf. h. 3. p. 107.

Habitat in Europa australi

Folia rigida Arundinis, margine scabra, summum Coviter ventricosum

Spica compacta, ovato-oblonga, matricea. Calyces ovato-oblongi hinc

m. l. c.

utriculata P. panicula ovata spiciformi, glumis calycinis naviculatis  
dorso dilatato, antra receptaculi glumis longior Hort. kew. 1. p. 86  
Gramen proterpe, spica purpurea ex utriculo prodeunte s. gramen  
foliis spicam amplectante Bauh. pin. 3. Theatr. 44  
Phalans utriculata panicula spicata, petalis antra articulata  
vagina supremi folii spatheiformi Lea l. v. pag.  
Copot. inf. pa. 1. p. 2 et Tab. 12.

Habitat in 4 talia 0

Culmi pedalis gemulis saepe infractis fuscis folia angusta  
glabra. vagina suprema spatheacea spica pollicaris  
valvula medio dilatata carina subulata

Cyperus Phal. panicula spicata ovata, glumis integris Culmo genicula  
to decumbente Thurb. prod. fl. cap. pag. 19.  
Habitat in Cap. b. frei

non vidi

Dentata P. spica cylindrica, glumis multieis refatis carinatis: canna dentata  
dentibus apice globosis. Lin. Suppl. pag. 1064. L. V. pag. 104

Habitat in Africa

Culmi palmari vel ultra inferna <sup>sternu</sup> geniculis refractis simplicibus  
geniculis fuscis, glabri folia angusta 2-3 in culmo. Spica prope pollin  
cani. gluma lanceolata glabra

confata P. panicula spiciformi oblonga valva calycina utroque confata  
calyce duplo longiore Forst. d. a. p. r. pag. 17

confata

alpina P. paniculata ~~fricata~~ cylindrica herpeta glumis calycinis canicola  
si anfractis canna ciliato-herpeta Barret. ii. 21. no 2.

michi ignota

paniculata Ph. panicula multica cylindrica spiciformi, glumis calycinis carinatis su-  
perne gibbis, corolla bivalvi glabra. Hort. kew. 1. p. 87.

~~Phleum paniculatum Hudf.~~

Gramen typhoides appenim <sup>normen</sup> minus. Bauh. pin. 4. Th. 51.

Phleum culmorecto, spicis cylindricis glabris, calycinibus brevibus  
sime mucronatis. Hall. bot. 1536.

Phleum paniculatum panicula cylindrica spiciformi, glumis  
nudis, culmo subramoso. Hudf. fl. Angl. p. 264  
Habitat in pratis Europae

non vid. a Phleoidi sat. Defuncta  
synonyma omnia dubia ex Hudf. Defuncto



graili e

phleoides? panicula mutica cylindrica spiciformi, glumis calycinis  
caninatis integerrimis scabrispulis, corolla bivalvi glabrispicula  
Hort. kew. 1 p 86

Gramen typhoides apertum primum Bauh. pin. 4. Scheuchz. gram.

Bl.  
gramen typhenum junceum perenne Raf. Bartr. 21. fig. 2.

Phalaris phleoides panicula cylindrica spiciformi lin. l. V.  
Culmi bipedalis foliis subadspicendis glabris teneris. Solus an  
gusta. Spica 3-4 pollicari attenuata valvula glabra lanice  
Coda acuminata

Phleum arenarium. varietas hujus sci. hort kew

arenarium <sup>oblongi</sup> spica ~~erecta~~ ciliata culmo ramoso Lin. S. V. f. Dan.

Gramen hypnium maritimum minus B. Plukh. alm. 177. t. 33. fig. 8.

Scheuchz. gram. 63.

Habitat in Europa locis arenosis

Radices fibrosae. Culmi plures digitales erecti. folia glabra, supremum  
subprothacaicum, ovulo armato hemilato ciliato. valvula lanuginosa  
laevigata glabra marginibus hyalinis. Panis nage ciliata.

culmo erecto vagina suprema prothacaica

variet. Phalar phleoides alii a Phlebo certe Divers.

Michelii

*P. spica cylindrica glumis ciliatis, culmis ascendentibus*

Gramen spicatum lanatile glabrum perenne, spica cylindrica flava  
fente longa, locustis acutis ciliis infra pilosis. Hort. perf.

Gramen typhinum junceum perenne Barr. v. 21. n. 2.

*Phleum spica paniculatis hispitis, calycibus lanicolatis* Hall.  
herb. no 1532.

*Phleum michelii* All. fl. pedem. no 2130.

Habitat in Italia Velletri 4

Culmi plures ascendente infere folioli. Folia glauco  
virentia margine scabra angusta glabra vagina suprema  
culmi aequalis. Spica sesquipedalis. valvula lanico  
lata margine cannaque ciliatis in cuspidem attenuata  
affinitas summo cum *Ph. arvense*

pubescens Phalangi

<sup>4</sup>  
Habitat

herb. Thauri

Radix bulbosa. Culmi inferne infracti, glauci, adpendentes, pyramidei. Folia sub-  
lata - Spica cylindrica, pollicaris. Valvula cornuta, dorso ciliata

- Ca. Mart. Phlegm.

pubescens Phalaris <sup>offlonga</sup> panicula ovato-cylindrica spiciformi, glumis foliisque  
vellofis.

Phalaris panicula ovato-cylindrica, spiciformi, glumis ciliatis  
Ger: Fl. Gallor. pag. 77.

Legi prope Tuneti

Culmi saepe interdum digitali, saepe nempe pedalis, geniculatis  
pubescentibus folia et panicula

Culmi plures digitales simpliciter ascendentes vaginis foliorum  
et ot. f. ciliatis. Folia et calyces molliter vellosi. Folia lanceolata  
renjuncularia et ultra vaginam supremam ventricosa spatulata  
Spica pollicaris gluma vellosa ciliata

a Phleo arenario forte non diversa

hipida P. hirsuta digitatis, glumis scabris, foliis ovatis Humb. fl. jap. pag.

L. v. pag. 104

Habitat in Japonia

Culmi ramosi scaberrimi, vagis glabris vaginis unguicularibus  
seriatis, tuberculatis, <sup>seriatis</sup> ~~seriatis~~ in singulis tuberculis. Folia vaginis dimidiatis  
congesta glabra striata attenuata, dentibus remote denticulata filis  
in singulis dentibus <sup>seriatis</sup> ~~seriatis~~ 3-4 ad in apice unguicularis glumis linea  
ni lanceolato ~~seriatis~~ <sup>seriatis</sup> armata lineis elevatis pilos scabris

*Lizanioides* P. Panicula simplicissima, flortus mucronati, altero sespli Lin.  
Mant. 103. L. V. p. 104  
Habitata India orientali



Zizaniodes P. panicula. effusa glumarum. ciliis

Zizanioides Phalaris panicula simplicis summa, floribus mucatis: altero sepli  
Len. L. V. pag. 104.

Andropogon mucatam panicula contracta, spicis verticillatis, calyci-  
bus muticis mucatis Retz. Off. 3. pag. 43.

(<sup>At est vari</sup>  
~~hic e illud~~ den. hedrae non diverso sunt)

3. *diversifolia* G. foliis ovatis villosi serratis <sup>ve</sup> ~~ancisa~~ serratisque.

Habitat in Insula Bobone & Thour

Habitus reliquorum <sup>ramis</sup> caule pilosissimo foliis utrinque villosis apice attenuatis serratis mucronatis, vel foliis sublaciniatis a reliquis differt. <sup>stipula</sup> ~~bracte~~ ovata ferruginea folia tenella utrinque sericea ramuli verba terminata alia varietas foliis ~~enisi~~ alter crenato serratis serratis mucronatis

Wreden. in Bot. Soc. hist. nat. ann. Berol.  
aristata Ph. panicula oblongo-cylindrica glumis dorso pilosis, ovollis  
basi aristatis.

herbit. Effremadura. Schomburgk.

Culmus bipedalis et ultra erectus, folia linearia et graminea  
radicalia semipedalia longiora margine serrata; culmea tenerrima  
minora glabra, vaginis superioribus humidiusculis. Ligula  
membranacea oblonga truncata. Panicula spicula oblongo-  
cylindrica uncialis. Gluma calycina oblonga membranacea  
compressa carinata, carina viridi pilosa. Glumae  
ovollatae glabrae calyce breviores; exteriori basi aristula fili-  
formi recta, calyce longiore instructa.  
affinis: Phalar. bulb. Cavan.

Bellard. Phalaris. panicula multica cylindrica spiciformi, glumis  
calycinis carinatis glumis margine membranaceis. Willden. l.c.

Phalaris (bulbosa) panicula cylindrica glumis antheris. Sp. pl.  
79. Amoen. acad. 4. p. 264. Bellard. append. Fl. pedem. p. 7.

Germeu hijphion. longissima spica phalaridis: molli albicun-  
te. Davr. ii. 14. v. 1.

hab. Ital. et Asia min.

ciliatis Ph. panicula multica cylindrica frutiformi; glumis calycinis  
ovatis integris ciliatis pilosis, culmis simpliciter nudis Spreng. Cat.

hort. Hall. pag. 69

Habitat in Canariis

Diversa a Phalaride crenata Willd.

antennaria Phalans

Habitat ad fretum magellanicum Comarson herb. Thouni  
glabra. Culmi vaginati. Folia lanceolata. Panicula pinnata, cylindrica, qua  
in pollicari. Valvula lineares, concavae, acuta, glabra

villosa Phaloni

Habitat in Carolina herb. Rich.

herb.



Setaceum P

Phalangetacea

Fork