

Phlomis

1. fruticosa P. foliis ovato-oblongis subrotundisve tomentosis crenatis, involucri
lanceolatis caule fruticoso
2. purpurea P. foliis cordatis oblongis tomentosis crenatis, involucri lineari
bus obtusi calycis brevioribus, caule fruticoso
3. nesolii P. foliis cordato-fimbriatis tomentosis crenatis, involucri
caule
4. Lychnitis P. foliis lineari lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, flora
lobis ovatis involucri setaceis lanatis
5. laciniata P. foliis alternatim pinnatis, foliolis laciniatis, calycibus lana
o-lanceolatis ^{anter pubescentibus}
6. lamia P. foliis ovatis subtus tomentosis, involucri subulatis fructu tri
lobato ^{sub}partitis tomentosis
7. ~~foliis ovatis~~ foliis ovato-lanceolatis, involucri setaceis hispidi
corollae villosi
8. humilis P. foliis cordatis, involucri subulatis hispidi, floribus verticilla
to fimbriatis, corollae nuda galea dentata hispida

9. zeylanica P. foliis linearifloris colatis sub serratis, verticillis subterminalibus
calycibus ^{truncatis} ^{rosari} ^{dentatis} ^{apiculatis} ^{aequalibus}

10. biflora P. foliis ovatis serratis, calycibus solitariis oppositis decemdentatis
his caule repente

11. ^{Gotha} chinensis P. foliis ovatis serratis glabris ^{calycibus} ^{aequalibus} ^{paucifloris}, involucris
petalaceis ^{calycibus} ^{transversis}, calycibus decemdentatis caule herba

12. ^{Ceo} chinensis P. foliis ovatis serratis sub pilosis, verticillis paucifloris calyci
bus ^{aequalibus} ^{paucifloris} ^{dentatis}, caule ^{puberulo}

13. alba P. foliis ovatis serratis villosis, calycibus oblique truncatis quinque
dentatis pilosis ^{molli} ^{involucris} ^{linearibus}

14. indica P. foliis ovatis subtus rugosis ⁱⁿ ^{aequalibus} ^{dentatis} ^{membranaceis} ^{sub} ^{oppositis} ^{novem} ^{dentatis}

15. ^{utric folia} ^{longiflora} P. foliis ovatis utraque villosis involucris linearibus, calyci
bus oblique truncatis membranaceis ^{decem} ^{novem} ^{dentatis}

16. canbua P. foliis ovato ^{oblongis} ^{linearibus} ^{colatis} ^{villosis} ^{sub} ^{terminalibus} ^{sub} ^{tridactylis} ^{sessilibus}
involucris petalaceis ^{caulis} ^{puberulis} ^{sub} ^{longissimis} ^{sub} ^{pubulatis}

17. glabrata P. foliis ovatis ⁱⁿ ^{aequalibus} ^{dentatis} ^{membranaceis} ^{sub} ^{oppositis} ^{novem} ^{dentatis}

18. molueoides P. foliis ovatis involucri setacei Calycis lobis inferiore
 trilobo lobis intermediis magnis maximo membranaceo
 caule fruticoso
19. Leonurus P. foliis lanceolatis serratis, calycibus decagonis, decemdentatis
 his muticis, caule fruticoso
20. Leonotis P. foliis ovatis obtusis subtomentosis, calycibus septemdentatis
 anfractis, caule fruticoso
21. nepetifolia P. foliis cordatis acutis serratis subtomentosis, calycibus 6.
 f. dentatis: dente supremo infimoque majori, caule herba
 ceo.

Phlomis orientalis angusto longiore folio flore luteo Tournef. Cor. herb
 Vahl red. & susp.

Salmifolia Phlomis

Phlomis orientalis angustis et longiore folio, flore lutea Tournef. Cor.

Habitat in Oriente herb. Guss. 5

Fruticosa. Ramis tomentosis, incanis, foliis petiolata, sesquipollicaria, lanceolata, utrinque obtusa, reticulato-venosa, rugosa, integerrima. Petiolis folio duplo brevior. Verticilli 2-3, remoti, 6 flori. Flores sespiter, folio florali brevioribus; Bracteis subulato, calyce brevioribus. Calycis inermis, incanis; laciniis subulato. Corolla villosa, *Phlomis fruticosa* ramis minor

humilis Plonus

Habitat in Antillis Richard

Caules herbacei, erecti, subsemipedalis, ramosi, puberuli. Folia subsessili, patula, ovali-lanceolata, obtusa, supra, leviter et raris dentata, infra vespis integerrima semipollicaria subpuberula. Verticillus terminalis, sessili, globosus, circiter 12-15 floris. Bractea linearis, pilosa, incurva, latiuscula, calyce subaequalis. Cal. subtrecursus, obovatus, inaequaliter 10 dentatus, extus pilosus, leviter striatus. Corolla tubo calyce brevior, rectiusculus, bilabatus: labium inferius superius multoties longius patens, planiusculum, subsessile: lacina intermedia ^{maxima} ~~maxima~~, uncinata, obtusifida, primum concavula demum plana, crenulata apice: superius brevissimum convexum, fornicatum obovatum, extus densissimi villosa anthera sub biploca. Stigmatis lacinis subaequalis. Saccus zeylanicus

crinita Phlomis

Cavan.

Habitat

herb La Riv. Le Paur

Tota tomentosa, incana. Caulis ramosus. Folia integerrima, inferora petiolata, cordato ovata, subtus nervosa; floralia ovata, subtus venosa. Verticilli sessiles, remoti, 6 flori. Bractea filiformis, longitudine calycis. Lacinae filiformes. Habitus superius tomentosum incanum.

capensis Phlomis

Habitat in Cap. b. pra. herb. Guss. 4

Caules fruticosus, ramosus, glaber, apice villosus - canescent, cortice cinereo. Folia in ramulis, pet. subpetiolata, seminequecularia, cuneata, integerrima vel crenulata, ext. rosam, oculo armato villosula. Flores in ramulis, 3-4 sessiles. Calycis lam. parulati, quinque dentati. Involucrum nullum. Corolla suspensa.

ovalifolia Phlomis

Phlomis cretica fruticosa, folio subrotundo, flore lutea Tournef. Cor.

Verbasculum salvifolium Prosp. alp.

Habitat in Creta herb. tusf.

Stem ramosus: rami lanato-incani. Folia petiolata, semipollucaria, oblongo-subrotunda, venoso-vegia, subtus incana. Verticilli superne 2-3. remoti, valde tomentosi, 10 flori. Flores papilei. Calycis longitudine foliorum floralium, angulati, mucosi. Bractea ovata, calyce brevior. Corolla flava, tomentosa, parum minor quam in Phlomis fruticosa.

221 fuscus

Latifolia Phlomis

Phlomis latifolia capitata lutea grandiflora Dill.

Habitat herb. Turc.

Caulis herbaceus, villosus, ramosus. Folia petiolata, cordata, ^{oblonga} quadripollicaria, obtusa, serrata, venosa, villosa, supra rugosa, subtus reticulata. Setae illi superne 2-3. remoti, decemflori, folio floralia breviores. Bractea lineari-lanceolata, longitudine calycis, in aristas defluentes. Calyx Turbicus, villosus, angulatus, quinqueanatus. Corolla flavo-tomentosa, magnitudine *Phl. fruticosa*. flores breviter pedunculati.

a fruticosa videtur quod tota villosa, nec tomentosa intus, vili bractearum et calycis suscipi.

~~aculeata Oenothera~~

~~Habitat herb. Guss.~~

~~Caulis, uti folia adpressis pennis calloso patentibus cernosis~~

Celoba Phlomis

Habitat

Herb. Desfont.

Caulis herbaceus, ramosus. Folia superiora sessilia, sesqui-pollicaria, ovata rugosa, obtusa, utraque villosa, subtus lanuginosa, crenata. Verticilli axillares, remoti, hirsutissimi. Bractea subulata, longitudine calycis. Calycis laciniis subulata. Corolla extus villosa-tomentosa: Labio superiore uncinato, interdum bifido, magnitudine Phl. herb. vent.

Phlomis

Habitat in Syria Herb. Desfont

Caulis herbaceus, erectus, inaequalis, subramosus, inferne pilosus, pedalis.
Folia petiolata, basi tripollicaria, lanceolata, utraque acuta, supra
si obtrifida, subtus inaequalis, venosa, serrata. Verticilli 4 flori. Bractea
tripartita, subulata, longitudine calycis: dentes villosi, uti bractea subulata
de setacea. Corolla Phl. herba venti purpurea, extus villosa concava

Phlomis

Habitat in Oriente herb. Desfont.

Caulis suffruticosus, obtuse tetragonus, ramosus, superne villoso scellatis pilis
serulatis tomentosi. folia petiolata, bis. tripollicaria, obtusa, rugosa, et
inque scellatis villosa, pubescentia crenulata. Verticille sexflori. In
volucra setacea, brevifolia. Calyx angulatus dentibus brevibus obtusis
Corolla flava, extus villosa. Insuper foliis oblongis, lanelli tomento densis
fimo lanatis
prope Nisipoliam.

herba Phlomis

Habitat in Syria herb. Desfont.

Caulis herbaceus, erectus, crassitie pennis anserinis, obtuse angulatus, clava-
to punctatus, pilis longis hirsutis cum mucronibus fasciculatis. Folia caulina
petiolata, 3-4 polliciana, lanceolata, obtusa, rugosa, tomentosa, incana, ere-
cata. Verticilli distantes, axillares, multiflori. Bractea subulata, tripar-
tita, uti petioli hirsuti, longitudinali calycis. Calyx 5 angulatus, hirsutus. Corol-
la purpurea: labium superius inferius brevius, hirsutum: inferius lobis
intermedio emarginato, subtus. vel losum in medio. laterales undique

Phlomis

Phlomis cretica fruticosa, foliis subrotundo, flore luteo Tournef. Cor

Phlomis fruticosa β

Habitat in Creta herb. Desfont. $\frac{1}{2}$

Caulis ramosus, lanatus. Folii breviter petiolata, semipolluciana, oblonga, obtusa,
basi acuta, rugosa, villosa, subtus incana, obsolete crenata, verticillis termi-
nalis solitariis, multifloris. Bractea lanceolata, cuspidata. Calyx angulatus
dentibus squae minutis subperpetuis

Phlomis

Phlomis orientalis angustis longiore folio flore luteo Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Desfont. 5

Suffruticosa. Caulis radialis, erectus, simplex, acuta tetragonus, inanis-
tomentosus. Folia petiolata, tri-pollicana, lanceolata, obtusa, basi acuta
v. recurva, obsolete crenata, subtus inanis. Verticilli axillares, 6 flori
Involucrum staceo, brevissimum. Calyx tomentosus: laciniis subulata. Corolla
extus villosa

Erneta Phlois foliis radicalibus cordatis caulibus ovatis dense
tomentosis per An volucris fetarum pilosis-tomentosis Parva
G. vol. 3. pag. 25 tab. 242.
Habitat in Hispania &

non vid.

fruticosa l. foliis subrotundis tomentosis crenatis, involucri canaliculati,
caule fruticoso ten. l. v.

Verbascum sylvestre altemum Dod. pempt 146

Verbascum latifolium foliis Bauh. pin. 240

β. Phlomis cretica fruticosa, folio subrotundo, flore luteo Tournef. 10

Phlomis latifolia capitata lutea grandiflora Dill. Elth. 316.

f. 237. fig. 306.

Habitat in Hispania, Sicilia

Rami tomentosi incani. Solia petiolata ovato-oblonga

obtusa, crenata rugosa subtus albida. floralia sessilia

Calycis ^{verruculati} ^{angulati} ^{dentibus} subulatis patentibus. Involucra

oblonga acuminate calyce parum breviora. ~~flore~~ Corolla

flavo extus villosa tubo glabro

antheris foliis cordatis breviter calycibusque hirsutis herb. Turf.

purpurea Phl. bracteis lanceolatis acutis pungentibus; calycibus pentagonis acuminatis; foliis subtus deorsum lanatis Smith. Spec. Bot. pag. 6. tab. 7.

Phlomis fruticosa, Lusitania, flore purpurascens, foliis acutis
Tournef. conf. 170. Barrel. ii: 405.

Phlomis fruticosa purpurea Lin. Spec. pl. Ed. 1. pag. 585.
Habit in Lusitania

non huc Phlomis hispanica candidissima flore ferruginea Tournef.
Aust. v. herb.

Caulis lanatus incanus. Folia cordata, oblonga, bipollicaria vel
parum ultra, crenata, supra nigra, villosa. Involucra longitudine
calycis herb. Aust.

purpurea P. involucri lineanbus obtusis calycis brevioribus, foliis corda
tis oblongis tomentosis, caule suffruticoso Lin. Spec. pl. pag. 1104 2^{do}
Mull. Dict. t. 202.

Verbascum subrotundo folio salvia folio Bauh pin. 240

Salvia fruticosa, c. f. folio haud incano floribus purpureis Plukm
alm. 329. 7. 57. 49. 6

Habitat in Italia

nam ^{purpurea} tomentoso lanati uti reliqua planta a pilis stellatis
folia senesce nigra obtusissima crenulata inferius foliis petiolo
breviora. Verticilli sex flori involucri calycis dimidio brevio
ra Calyx dentibus obtusis corolla villosa subtomentosa intus purpu
rascens Involucris linearia

Italia Lin. Phloxis Italia Bailei lancolatis obtusis inermibus calycibus truncatis
muticis, foliis utrinque lanatis Smith. Pringley. bot. pag. 6. tab.

~~Purpurea Spec. pl. ed. 1. Divisa a Persp. ed. 3. ut quae fign. Plutaceae et
Tournef. amandatus involucri lancolati gaudet~~

nefolii P

Folii radicalibus cordato-lanceolatis utraque tomentosis villosis Lin
Spec: pl. pag. 819. + Mill. Sut. t. 204

Habitat in oriente

Rami superne uti reliqua praeterea pilis fl. & staminibus micano-tomen-
tosa. Folia petiolata profunde cordata crenata bipol-

liciarum floralia ovata petiolata minoribus. Verticilli
multiflori Calycis praeterea pilis longis tomentosis ^{hirsutis} pilosus & dentibus
lineariibus rectis. Corolla magna villosa lutea

involucrum lineare

Folia inferna et radicalia cordata, auriculis apiceque rotunda-
tis, palmata et ultra lanata. Petiolus longitudine folii. Folia super-
na oblonga in pedicelum attenuata, floralia lanceolata, sessilia. Verticilli
offlori. Calycis lacinae ovatae, inaequales. Involucrum lineare brevissimum
hirsutum.

laciniata P. foliis alternatim pennatis, foliolis laciniatis calycibus lanatis

Lin. V. pag.

Phlomis orientalis, foliis laciniatis Tournef. Corol. 10.

Habitat in oriente.

Lamiae P foliis ovatis subtus tomentosis, involucri subulatis fructu tripartito
Lin. S. V

Phlomis Lamiae herbacea, folio lanano Tournes. vol. 10

Phlomis involucri radiis subulatis, fructu Hort. Cliff. 3157

Habitat in Samo

ovato

Rami superne canes. Folia petiolata superiora lanceolata

attenuata extus remota serrata supra scabra, subtus

Syn. Tournes. i pili ad lentem stellati tomentosa. Flori utrinque 4-5.
in Samois excludi calycis

involucri uti pili minutissimi stellati calycibus nullis. Fructu

partinet enim
fr. Desfont
ad misobiam
dentibus subulatis corollae extus denticulatis subulatis pili stellati
canes

Specimen Herb. Guss. minime cum meo quadrat, meo autem certe est

Phlomis orientalis herminifolia flore minime calyce glabro Tournes.
Folia radicalia cordata oblonga tripollicaria

Oh samois herb Guss.

Caules villosi, crispitie penna anserina, super ne fibris copio. Folia petiolata, tripollicaria
cordata, attenuata, acuta obtuse serrata, villosa supra vixida, subtus incana venosa
subrugosa: floralia rhombos ovata, acuta, submarginata. Petiolus semi-pollicaris. Vorticilli oppositi
metu, 6 flori: Calyces campanulati, sulcati: Chamae lanceolata, in cuspidate recta demum

— tomentoso

incana. Involucra trifida, linearibus subulatis longitudine calycis subsurgentibus.
Corolla magnitudine phlomis fruticosae

Varitas samia mea est

Phlomis orientalis angustifolia flore parvo Tournef. Cor.

Caulis semipedalis, ramifera, incanus, tomentosus. Folia lanceolata, angustiora et
flores minores quam in alba. Verticilli 6 flori reliqua similia herb. Mus. f.
secund. herb. Theroni Syn. Tournef. ad herbam verticillatam verborum ne
plures diversae inter se confundantur

Herbarenti P. involucris setaceis, hispida subulatis; foliis ^{ovato-oblongis} cordatis serratis, caule
herbaceo Hort. ups. 171. 7

Marrubium nigrum Corymbosum Bauh. pin. 230

Habitat in perfris, Tataria, Norbora, Hispania ad aggeres &
caulis ramosus hirsutus. Cilia petiolata serrata venosa supra glabra
subtus & pilis stellatis villosa, utrinque venosa bipollicaria
supra lobis fagoribus in una supra lobis, floralibus sessilibus
nucrone terminata verticilli multiflori corollae purpureae
extus & pilis stellatis villosa subnervi uncinatis. Calycis dentes
setacea erecti

villosa

ovato lanceolatis acutis

tuberosa involucri hispidis subulatis, foliis cordatis lobatis, caule her-
baceo Lin. Spec. pl. pag. 8194

Phlomis urticae foliis, glabra Aimm. ruth. 40.39.

Galeopsis maxima, foliis hormuni Buxb. cent. 1. p. 4. t. 6.

Phlomis foliis cordiformibus, galea lacera Hall. in Act. got. 211. t. 12.

Habitat in Sibiriâ campis tribus 2

Radix ^{subrot} Caulis purpurascens. folia inferiora petiolata ^{prof} cordato oblonga
palmaria et ultra, ^{prof} prof. prostrata, supra glabra in mea
ne coria: floralia lanceolata subintegerrima inferose ver-
ticillo longiora. verticilli multi flori involucri longitudine
calycis. Calyx glaber dentibus hispidis patentibus. Corolla extus
vellosa ~~marginis~~ galea marginis dentata barbata.

glomeris verticillato
pinnatis, corolla nunc galea dentata barbata

10. 11. biflora Phlomis foliis ovatis serratis, calycibus solitariis oppositis decemdentatis

Ghotta Lumbu Heron zeyl. 65.

[Lit. II. Lamium indicum, foliis oblongis, flore albo, griseolens, Heron Zeyl.

pag. 77. 65. Leucas foliis rotundis serratis, flore albo Burm. zeyl. pag. 140. tab. 63.

fig. 1.

Habitat in India Orientali

Caulis herbaceus, ramosis, tenuis, debilis, leviter villosus ^{permutis quatuor vel quinque}

Folia petiolata, unguicularia, obtuse serrata, obtusa, lobata
circulo armata raris pilosa, profertim ad latera

Pedunculi brevissimi, solitarii, oppositi, uniflori. Bractea duae, minima
ad basin singuli calycis.

Calyx striatus, decemdentatus.

Corolla galea, infundibuliformis pilosa, margine hirsutissima.

~~## Syn. Burm. zeyl. ad Nepetum indianum refert Burman. Lilius
in fl. indica differt vera totum coelo et in supra indianum partem
net habitu hucusque non ad reputat malum est quod habet
hucusque habet net.~~

216
202

copied from the

~~Canefera. P. foliis ovatis serratis villosis, involucri lineamibus calycibus oblique
truncatis membranaceis deinde novidentatis~~

~~Habitat in India orientali et Ambrâ felici Forskål~~

~~Caulis erectus, ramis eâdem villosis, canescens: foliis
petiolata basi acuta pollicaria profunde obtuseque serrata
tenuia ad lentem villosa. Verticilli multiflori involucri~~

~~Conspicua calycis ^{vestigia} ^{peripetala} ^{membr.} albida ^{et} ^{marginati}
tubus superioribus subsqualibus acuti parvis. Flores parvi~~

~~galea hispida primo
familii Ph. L. indicis ad caulis pilis minutissimis uti folia nec pilis
folia ut naque concolora nisi plana nec pubes nigra~~

~~tormentosa~~

~~Leucis Burm. Zeyl. C. L. ad Nepetam indicam refert Burmann. filius
in flora Indica, differet vero toto coelo, panter quoque haud recte
ad Nep: indicam Vatu-Christham Hort. Neap. tab. 90 retulit
cum Linneo patre, in ^{retulit} supplementi vero a Linneo filio ad Nepetam
amboicam, pertinere enim ad Carandulam carnosam~~

Phloca

folia juniora
tenuia
canefera

Chinensis Ph. foliis ovatis serratis pilosiss. subpelosa, verticillis paucifloris calyce
subequalibus descendenti caule fructu ^{ulato}
Phlomis chinensis foliis ovatis serratis tomentosis, calycibus verticilla
tis descendenti Petr. obs. 2. pag. 14.

Habitat in China

Caules tenues ramosi vellosi. Folia petiolata unguiculata
juniora pilosa tomentosa canescentia etate glabrata. Calyx
vel bracteae duae ^{caes 2-3}. breves pericallati absque involucrio. Galea hispida
setis adpressis
calycem
ita similis l. descendenti et facile eandem esse credendum

est India orientali Kunig

et Hattusa descendenti Foss. vix diversa

Decemdentata S. - verticillis multifloris, foliis lobatis petiolatis calycibus
decemdentatis

Habitat in Tahiti

Rami retrosum villosi. folia unguiculata acuta serrata
venosa. Calyces ^{sem} demum ^{sem} fructu. Corollae tubum valde hirsutum
plac verticilli uniter 16 flori

Habitus nonnulli a *Phlomis* Chinesis non differere videtur
sua retali an igitur illud amandanda? fide Solandri

Cera P. foliis ovatis serratis glaberrimis verticillis paucifloris, involucri
petalaeis brevissimis calycibus decidentatis
Habitat in India orientali
an modo varietas biflora differt ~~et videtur~~ foliis triplo
majoribus verticillis 12-14 floribus interdum tamen 4-6 flori-
bus vix foliis

10-11 alba Phlomis foliis ovatis serratis villosis, calycibus quinque dentatis obliquis
Phlomis alba, involucri palmato-glliformibus; foliis ovatis serratis Boiss. Desf.

Habitat ^{pro. 107} in arbu

Caulis herbaceus, ramosus, glaber, obtuse quadrangulatus; rami superne pilosi.

Folia petiolata, ovata, obtusa, medio ~~obtus~~ serrata; serraturis utrinque 3-4. pilosa,
pollicaria.

Petiolus foliis brevior.

Flores verticillati: verticilli remoti 10-12. floris. Involucri quadrifida; laciniis
staccis, longitudine calycis.

Calyx campanulatus, pubescens, fauce obliqua, quinque dentatus; Dentibus sub
latioribus, binis superioribus majoribus

Corolla calyce duplo ^{longior} ~~longior~~. Galea margine hispidissima. Labi un. inferius
inlobum: lobus intermedio producto, oblongo

indica P involucri lineariibus, calycibus unilabiatu obliquis, foliis ovatis
petiolis. Lin Spei: pl. pag 220*

Habitat in India

Caulis ^{villis} & petis densis canescenti. Folia petiolata sesquipollicina acuta
supra utroque molliter villosa supra videntia subtus cana sabru
gosa, serrata, basi attenuata sup florulea suprema sessilia
verticillo longiora. verticilli multiflori. in volucria calycis
longiora attenuata villosa in fructum sabru mem deprentia,
cannata. Calyx ^{membranaceus} decagonus villos pubescens oblique tripartitus labio
superiore tridentato in dentibus parvis acutis inferiore subquadridentato
et Corollo galea hispida pma

ovatis subtus incanis

9-10 utilifolia
Canisescens Phlomis caniscentibus pubulatis
foliis ovatis serratis utrinque villosis, involucri lanceolatis, caly-
culis oblique truncatis membranaceis nervis dentatis

Habitat in India Orientali Honej, in Arabia legit Dr. Forsk. Herb.

Caulis herbaceus, erectus, ramosus ad lentem villosus, caniscentis.

Folia petiolata, pollicaria, basi acuta, profunde obtuseque serrata
tenuia lobulo armato villosa, subtus pallidiora, serratura terminali
attenuata

Verticilli multiflori. Involucra longitudine calycis, carinata, pube
caerata
sa, flexilia, spinella inermi albida terminata. Flores parvi

Calycer angulati, dentibus tribus superioribus parvis, acutis, sub
aequalibus

Galea herpeticissima
calycis superne scariosus

caniscentis, nec tomentosus obtusus, folia

(Similis Pendica, ad caulis utilifolia, pube minutissima utrinque
tenax profundis
concolora, speciosa nec caniscentis pubulatis marginibus negosa, calycibus
minoribus et subtus tomentosa, calycibus minoribus

215

201

Canbaa P. foliis ovato-lanceolatis villosis, verticillis subrotundis densissimis,
involucris setaceis hispatis, caule herbaceo Hort. kew. 2. p. 309. Jacqu
coll. 1. p. 164.

Plinopodium martinicense Jacqu. hort. 1773. Tab. 177. Coll. 1. p. 164 +
^{martinicense}

Calyx tubulosus Phloem ^{Canbaa} involucris setaceis, verticillis subglobosis, calycibus
inferne incurvis recurvis, laciniis superioribus subulata longissima, foliis ovato-oblon
gatis villosis Sw. prodr. pag. 80.

superne reflexis
infra summitatem
depresso convexa
+ vix sic patulis

Habitat in Martinica O

rami canescentis
caulis erectus ramifera retrosum villosus. Folia petiolata
obtusiuscula venosa villosa obtusa. verticilli
globosi magnitudine nuclei conyli involucri longitudine
longior multo

dentibus inaequalibus supremo majore. Corolla parva calyce
longior multo
gine clivor

Antiphanem longior galea hispata
martinicensi Swat. prodr.
Leonum species secund. Puhard

descript. vide inter obj. no 143

7011 molueoides Phlomis ^{foliis ovatis, Phlomis} (in volucribus petalis, calycibus) Labio inferiore rotundato magno
membranacea, foliis

Clinochodium fruticosum; caule arborescente, foliis ovalibus crenatis
calycis Labio inferiore subrotundo Corfil. Desf. pag. 107.

Frutex ramosus; tamis tatis villosis.

Solia petiolata, ovata, obtuse serrata, basi integerrima, supra pubescentia,
vix, subtus villosa, mollissima, viridica.

Petiolus mollissime villosus, longitudine folii.

Verticilli remoti 14 flori. Involucra quadripartita, petalis, longitudine
tubi calycis, villosa.

Calyx tubulosus, 10 sulcatus, villosus, bilabiatus: Labium superius
breve, oblongum, acutum. Infertus subrotundum, ~~magnum~~ ^{rebusis quas in petalis}
trilobum; lobi laterales breves ~~et~~, ^{intermedia}, ~~magna~~ ^{rotunda}
et membranacea, venos reticulata.

Corolla sub lacina superiore calycis eique latius duplo longior: Tubus
amplitudine tubi calycis, villosus. Galea margine hirsutissima.
Labium inferius trilobum, longitudine Galeae.

Stamenta longitudine corollae

(Habitus et omnia Phlomis cum Clinochodis vero nihil commune
habet

Leonurus P foliis lanceolatis serratis, calycibus decagonis decidentibus muti-
cis, caule furticoso S. V. Lin. Musc. 412. L. V. p. 5404

identis africana, floe aureo oblongo Mart. act. 2. p. 57. fig.

Stachys africana frute scens angustifolia, floe longisimo phoe-
ceo, Leonurus dicta Mon. hist. O. p. 303. J. 11. t. 14. fig. 17.

Leonurus Cap. b. frei B. Reyn cent. 171. t. 86.

Habitat ad Cap. b. frei

Planta florens ^{fruticosa}
Caulis obtuse tetragonus villosus tenuis fimo canescens. Folia
petiolata subtus villosa mollii cordi canescentia nervosa
ex t. rosam serrata utraque attenuata in pollicaria vesti-
culo longiora. Involucra linearia unguiculata mucron-
nermi terminata villosa longitudine calycis. Calyx tubulosus
pubescens tubulosus ore subaequali dentibus tubus panem
mayoribus. Corolla fulva holoserica ^{galea} pollicaria ^{galea} villosa proposita
in argine.

Leonotis P. foliis ovatis obtusis subtomentosis crenatis, calycibus septemden-
tatis anfractis, caule fruticoso Len. Mant. 03. & L.V. p. 540.

Barthi africana frutescens, melissa foliis, floribus brevioribus phoeni-
cisi Monf. hist. 5. p. 383

~~Habitat ad Cap. b. Spei~~

Leonurus minor P. b. Spei Boeck. Leg. b. 1. p. 100. Mill. Dict. 7. 162. fig. 2

~~Habitat ad Cap. b. Spei~~

Similis Ph. Leonuri caulis leviter pubescenti canescens. Folia petiolata
parva ovata lineata serratis rugosa obtusa. Verticilli superne
remoti multiflori. involucria subulata flexilia et subpungentia
cum longitudine calycum calyx pubescens dente superiore reliquis
magiore corolla magnitudine per Leonuri collo ~~testo~~
calyx superne pilosus in nepetifolia

alguna Ph. foliis cordatis serratis, floralibus lanceolatis trinerviis, bracteis
ferrugineis siliquis Pall. nov. Com. petrop. 1774. 2. p. 265. tab. 13.
Habitat in Siberia

non vidi

Dylanica P. foliis lanceolatis subserratis, capitulis terminalibus, calycibus
octodentatis Lin. S. V. pag. 5394

Plenopodium hyssopi latioribus foliis maderassatanum Pluk.

164. fig. 2. aut. 163. fig. 6. aut. N. 10. fig. 7.

Herba admirabilis Rumph. amb. 6. p. 398. 16. fig. 1

♂ *Leonurus* indicus, foliis lanceolatis subserratis, calycibus septemden
tatis, Lin. Spec. pl. p. 1174

~~*Carduus*~~ f. *Leonurus*, hyssopi hespiti foliis maderassatana, flori
bus dilute rubris, unico tantum verticillo in ramulorum
cymis Plukin. alm. Pl. 110. fig. 4

Leonurus foliis lanceolatis subserratis obtusifoliis, calycibus octo
dentatis Lin. fl. reyl. 2274

Habitat in India

Raulis bipedalis erectus herbaceus obtuse tetragonus ramis
sub villosus. folia lineari lanceolata utraque attenua
ta nervosa, obtusifolia serratis utraque 2-3 remotissi
mis villosis velis non stellatis internodiis breviora in
ramis internodiis longiora. Verticilli ^{ad apices} super ne multi
flori contigui sunt in culta panum remotiores. involucri

linearia longitudine calycis pilosa interdum glabra mucroni ⁱⁿ albidis
depressis subpergentia interdum glabra. Calycis oblique truncat
dentibus utraque 3-4 mutatis terminali lanceolato elongato subpergen
tibus superiore uti fauce villosi. Corolla galea hispida

folius lineari lanceolatis subserratis ^{verticillis subterminalibus} calycibus obli
que truncatis novemdentatis

Phl. media
obliqua
canicolata) Banks