

Phlox

1. paniculata P. foliis lato-lanceolatis planis margine scabris, caule lori
corymbis paniculatis, laciniis corollae rotundatis
2. undulata P. foliis oblongo-lanceolatis subundulatis margine scabris
caule lori, corymbis paniculatis, laciniis corollae subrotatis.
4. maculata P. foliis cordato-lanceolatis acuminatis, ^{glabris} caule scabriusculo,
racemo corymboso.
3. juaveolens P. foliis ovato-lanceolatis undique lobatis, caule glaberrimo
racemo paniculato.
5. carolina P. foliis ^{ovato} lanceolatis lobatis, caule scabro, corymbis subpa-
niculatis
6. glaberrima P. foliis linear-lanceolatis margine scabris, corymbo
terminali ^{glabris}
7. divaricata P. foliis ovato-lanceolatis, supremis alternis, caule
bifido, pedunculis geminis

8. pilosa P. foliis lanceo-linearibus lanceolatis vellofis. supremis alternis
caule erecto corymbo terminati
9. rigida P. foliis linearibus lanceolatis sublonguetis ciliatis, caule erecto
tenui vilo sulcato ramosis, floribus paniculatis
10. subulata P. foliis subulatis hirtis, floribus oppositis, laciniis corollae
^{subcorymbosis}
emarginata
11. fibrosa P. foliis linearibus vellofis, pedunculis ternis termina-
libus, laciniis corollae integris
12. setacea P. foliis setaceis glabris, floribus solitariis, laciniis corollae
emarginata
13. ovata P. foliis ovatis, floribus solitariis

repens Phlox

Habitat in Carolina herb. Desfont.

Stolonibus procumbentibus, longitudine caulis, ad folia subpilosi. Folia obovata, basi
pilosa subciliata, in geminis, glabra, venosa, subavenia, semipolluciana. Caulis
erectus, subvillosus, simplex. Folia sessilia, lanceolata, semipolluciana integer
rima, margine villosula. Corymbus terminalis, subcompositus. Pedunculis villosis
utriusque calycis. Calycis lacinae subulatae.

Subniflora Phlox

Habitat in Carolina Richard

Caulis herbaceus, teres, erectus, superne ramosus, glaberrimus, est cepto ^{enervi} vel
fus folio. Folia sesqui pollicaria, lanceolata, glaberrima, ^{enervi} acuta,
Pedunculi ramorum 2-3, breves. Calyx glaber, quinque nervis: lacini
is lanceolata, attenuata. Corolla glabra: laciniis obovatis, integerrimis

aristata Phlox

Habitat in Carolina Richard

Varietas caule, uti costa foliorum subtus villosa, folia parum latiora.

Kubes

biflora Phlox

Phlox biflora foliis lineari-lanceolatis; inferioribus oppositis, superioribus alternis, pedunculis axillaribus geminis Fl. Peruv. 2. pag. 17.

Habitat Chili in arenosis et aridis

Pubescens. Caulis pedalis erectus, tercis, superne divisisus. Folia lineari-lanceolata, sessilia integerrima marginibus retrorsum scabra, arena, inferiora opposita, 4-9 oppositiones, superiora alterna. Flores ex divisisionibus caulis et ex axillis superiorum foliorum, bini, pedunculati. Calyx 10 angulatus. Corolla purpureo-violacea. Tubus calyce quadruplo longior. Capsula 3 loculari, 3 sperma. Fl. Per.

2 undulata Phlox foliis oblongo-lanceolatis subundulatis margine scabris, caule teri,
corymbis paniculatis, corolla laciniis subrotatis Hort. Kew. 1. p. 205 -
Habitat in America septentrionali

non vidi

1 paniculata P. foliis lanceolatis margine scabris, corymbis paniculatis Lin
Spec. pl. pag. 216. & Mill. Dict. 4. 205. fig. 2.

Lychnidea folio foliis Dill. Elth. 205. t. 166. fig. 203.

Habitata America &

paniculata foliis lanceolatis planis margine scabris, caule teri, corymbis pani-
culatis, corolla laciniis rotundatis Hort. kew. 1. p. 205

et la glabra. Caulis teris immatulatus. folia utrinque attenuata tri-
pollinaria, suprema suboppe subalterna pedunculati florum
conspicuous quam in reliquis.

Tubus vespe basi vili clausus

figura Dill. potius ad Carolinam pertinere videtur

altissima. Facit an ab hac diversa nisi magnitudine, margines
tra sunt folia, proterea figura Dill. haud bene cum mea congruit

3. *Fraxinella Phlox* foliis ovato-lanceolatis undique levibus; caule glaberrimo, racemo paniculato Hort. Kew. 1. p. 206

Habitat in America septentrionali &

Flores albi, leviter fraxeolentes H. K.

Caules erecti vix glaberrimi excepto superne inter flore pubescenti uti pedunculi et pedicelli. Folia venosa tripollicina ^{hibens arena glauca} na albivenata. Pedunculi triflori. Limbus tubus corollae calycis duplo longior Calyx glaber laciniis lanceolatis acuminatis limbi lacines integrae

maculata P foliis lanceolatis lobatis, racemo opposito corymboso Lin Sp. pl. 2164
Jacq. hort. 2. 1. 127

Habitat in Virginia 4

maculata Ph. foliis oblongo lanceolatis glabris, caule scabriusculo, racemo
corymboso Flor. ^{Wend. 1. p. 206} ^{vidi in sub...} ^{genus pme maculatus} ^{Amnopleurica}

Caulis erectus ^{purpureo} punctatus ^{superne pubescens} folia ^{perpetua}
suprema alterna, bipollicaria ^{Corvi}. Pedunculi axillares
superne, alterni elongati inferiores pubescentes inferores
pedicelli alterni uni ² vel triflori ad apicem alterni
superiores apice trifidi

maculata — cordato lanceolatis ^{attenuatis} acuminatis, caule scabriusculo

4 Carolina Phlox foliis lanceolatis caribus, caule scabro, corymbis subsistigatis den.
Spei. p. 216 * L.V. p. 199

Lychnidea caroliniana, floribus quasi umbellatim dispositis, foliis lucidis
suis acutis Mart. cent. 10 t. 10.

Phlox foliis lanceolatis sessilibus glabris crispis, caule erecto, floribus vertice
ciliatis terminalibus Mill. Dict.

Habitat in Carolina 4

Similis Ph. glaberrima, sed caulis triplo altior non nihil scaber. Folia latiora
et ovato-lanceolata. Corymbus floribus numerosis, plerumque pedunculis
ex alis supremis, erectis, quasi in corymbum subsistigatis. Corollarum tu-
bus longus est Len. Spei. l.c.

6 glaberrima P. foliis linear-lanceolatis glabris, caule erecto, corymbo terminali.
Lm. f. v.

Lychnidea folio melampyri Dill. Elth. 203. t. 166. fig. 202.

Habitat in Virginia 4

Caule erecto teres uti tota planta glaberrima. Folia sessilia op-
posita sessilia trivel quadripollicana, remota longa, avenia
marginis fiabra, suprema obovato ^{sub corymbo} lanceolata acuminata.
Pedunculi ex supremis axillis oppositi fasciati triflori. folia
duo opposita sub pedicelli lanceolati pedicelli brevis limbi
lacinus obovato integro

→ *Durancata* P. foliis lato-lanceolatis: superioribus alternis, caule bifido, peduncu-
lis geminis. Lin. Spec. pl. pag 2174 t. 4. Mill. dict. tab. 205 fig 1.

Habitat in Virginia

Caules erecti, scapi simplices, dein divisi in ramos duos pubescentes
Folia sessilia, ^{in opposita} inferiora opposita superiora ^{ovato-lanceolata} per quinque opposita
nes remota, ^{in opposita} foliola subtus in supremi costa subretusa. Flores
ex divaricatione caulis et foliorum alternorum alii. ^{in opposita}
bini propriis pedunculis. Tubo curvato. Calyx 5-partitus laciniis
subulatis

Opulosa P. foliis lanceolatis villosis, caule erecto, composito Verminali Lin. f. V

Lycnidea umbellifera, Bluttaria alcedens virginiana, major repens, p. gen
Dorielanthii foliis pilosis, flore pentapetaloida fistulosa Planch. alm. 133.

V. 90. fig. 1.

Habitat in Virginia 4

Caulis, pubescens, pedalis teres. Folia angusta angustiora opposita
superiora albescens. Inflorescentia ut in P. glaberrima. Calyces
villosi tubo corollae breviores: lacini subulata. Limbi laciniis inte
gro

lineari lanceolatis supremis alternis, caule erecto villosis

9 ^{rigida}
fluita.

*P. foliis linearibus lanceolatis subtriquetris ciliatis, caule erecto inflo
subhirsuto ramosis, floribus paniculatis.*

Habitat in Carolina. Herb. Bancroftii

Sub hoc nomine plantam a Do. Eer ex Anglia habui nam eadem
cum Solandri dubito cum flores non paniculati sed alterni
ex axillis supremis et tres terminales optime convenit mea
planta cum Lychmidea etc. Plukh. tab 90. fig. 3. nisi
igitur potius subulata Lin: sed tum differentia Lin: mala
descriptio et differentia mea in *P. subulata* huc pertinet
eadem planta a Baltho habui sub nomine *Plata subula*
to

17. *Subulata* P. foliis subulatis hirsutis, floribus oppositis. Lin. Spec. pl. 217. x
Lychniidea, Blattoideae occidentalis Virginiana, minor repens, hirsuta cam-
phorata foliis Plukn. Alm. 233. T. 9. P. fig. 2.

Habitat in Virginia

affinis sibirica. Caulis ramifus palmari, rami suberecti teretes.
Folia opposita pollicaria acuta unguiculata. Calycis
pubescentes, tubo brevior duplo brevior flores interdum termina-
tes tereti.

foliis linear lanceolatis filicatis, pedunculi oppositi, Calycis
tubo corollae brevioribus; limbi lacinis emarginatis

hanc sub nomine P. ^{viridis} stricta in anglia accepi, an vere a subulata
lin. diversa. comment optime cum figura Plukn.

18 *fibinea* P. foliis linearibus villosis, pedunculis ternis Linn. Spec. pl. p. 217*

Gmel. fl. sib. 4. p. 87. & 46. fig. 2.

Habitat in Asia boreali &

Paulis inferne ramosus. rami in ferne vestiti foliis aridis erectis teretes
villosi. Sospia opposita polliciana, axillari acuta, sessilia
viliis ramosis adpressa. pedunculi terminales villosi pollicia
res uni flori. Calycis villosi laciniis subulatis longitudine
sub corolla. Lobis corollae rotundatis integris.

laciniis limbis integris

Metastaca P. foliis petalis glabris, floribus solitariis Linn. I. V
Lychnidea, blatta no accedens virginiana, camphorata congeneris, glabris
foliis Pluch. alm 233. T. 90. fig. 3.
Habitat in Virginia

limbi lacinis emarginatis

non vidi

ovata Phlox foliis ovatis floribus solitariis Lin. l. V. p. 199.

Lychnidea festulosa maritandica, Clinopodii vulgaris folio, flore amplo
fragulari Plukh. mant. 122. tab. 34 p. fig. 4.

Habitat in Virginia 4

non vidi

altissima P foliis lanceolatis planis margine serratis, floribus
paniculato corymbosis

Habitat in D. Dr. Allioni

an a paniculata diversa