

Phryma

1. *Ceptostachya* P. foliis ovatis serratis petiolatis, calyce monophylla quinque fido
2. *dehiscens* P. calycibus tandem longitudinaliter dehiscientibus

Leptostachya P. foliis ovatis serratis petiolatis, calyce monophyllo quinquefido
Lin. Suppl. pag. 277. S. V. p. 540.

Cestenaia mariana, rosea Chinae sp. foliis, feminibus deorsum
tendentibus Pet. mus. 694.

Amaranthi siculi bolloni pucca, floribus parvis purpureis
prope ad extibus, herba floridana Pluth. Amalth. 59. V. 300.
pag. 5.

Phyma leptostachya Lin. Sp. pl. pag. 830.

Habitat in America septentrionali.

Racemi verbena utriusfolia. Cauli pedalis erectus pubescens
simplicis fœmâ superiore. Tota petiolata venosa nerv
vosa rare pilosa pilis parvis beryllicaria. Racemi
terminali tres. folia duo supra medium peduncul
pedunculâ elongati. flore sessili dracteo ^{inferiori} duo petaleo ^{superiori}
ad basia singuli calycis eisdem longitudinis

Achitoda herbacea circa folios, parva fructu Tournesot.
F. r. herb. pag. 175

Carolinense P. foliis obovato-oblongis serratis sessilibus Walt. flo. Carol. pag
166.

Habitat in Carolina.

non vidi.

dehiscenti P. calycibus tandem longitudinaliter dehiscentibus Lin. Suppl. p. 227. 4

S. V. pag. 540

Habitat ad Cap. b. frei

Caulis basi suffruticosus. Rami oppositi pauci erecti. Folia opposita, subpe-
tiolata, latitudine et longitudine aequalia cuneata superne rotun-
data, novem dentata crispifolia. Racemi terminales, solitarii
simplicissimi, erecti, brevissime pedicellati. Bractea minuta, sub-
lata solitaria. Calyx, phyllis tres, spulicatus, truncatus & dentatus.
maturis peris calice longitudinaliter dehiscentis. Corolla Verberna
semen, cum calyce replens, rumpens, compressifolium, teretifolium
cum, basi compresso-cuneiforme, bilobularem Lin

genus forte proprium habitum in Phryma diversa