

Phyllis

1. encoides P. foliis linearibus verticillatis glabris
2. enoptheros P. foliis linearibus pelosifoliis subtus tomentosis margine revolutis
strogosa capituli terminalibus, floribus torrentosis
3. bicolor P. foliis linearibus pubescentibus, calycibus communibus corolla brevioribus
4. plumosa P. foliis linearibus subulatis summis hirsutissimis, floribus capitatis
5. imberbis P. foliis linearibus obtusis scabris, floribus terminalibus
supra punctatis scabris
6. stipularis P. foliis linearibus simplicibus, floribus quinquecostatis
longioribus
7. longata P. foliis linearibus glaberrimis subtus tomentosis ex parte
terminali capituli terminalibus
8. lanceolata P. foliis lanceolatis mucronatis subtus tomentosis supra nitidis
pinnis axillaribus
9. dioica P. foliis cordatis
10. callosa P. foliis oblongis cordatis acuminatis pelosifoliis subtus tomentosis
floribus subcapitatis
11. spicata P. foliis oblongis cordatis subtus tomentosis, pinnis cylindricis
floribus longitudine bractearum
12. pubescens P. foliis linearibus acutis pelosifoliis subtus tomentosis, floribus
spicatis, bracteis villosis foliis formibus

- 7-8. *Sida folia* P. foliis filiformibus subter tomentosis, floribus spicato-capitatis
13. *buxifolia* P. foliis ovato-oblongis subter tomentosis, floribus subglomeratis
14. *racemosa* P. foliis ovatis glabris floribus simplicibus, paniculato ramis
15. *penifolia* P. foliis acropis utraque planis glaberrimis, floribus paniculato racemosis
16. *naniflora* P. foliis subulatis acutis scabris subpulvis, ramis paniculato multifloris

Phylia foliis linearibus glabris subtus tomentosis incanis, floribus axillaribus
panicatis

Habitat in Cap. b. p. herb. 4. usq.

Annali pubescenti illati, incanis, tomentosi. Solia frequentissima, alterna, petio-
lata, semi-pollidaria, linear-lanceolata, extropium semper angustata, supra
nitida, margine revoluta. Stipula nulla. Flores pedunculati, axillares,
solitarii, folio breviores.

Physica nitida La Mart
Habitat ex herb. la Martini
Facies Physica stipularis

pubescens Phytica

Habitat in cap. 6 spec. herb. La Martini
Specio superne, hispida - Flores solitarii

Inucata Phyllica

Habitat in cap. b. spec. herb. La Martini
Rami glabri, superne villosi. Folia cordato-ovata, semipollicaria, acuta, basi
hinc petiolata. Spica bi- f. tripollicares.

Secunda Phylia foliis linearibus glabris, capitulis terminalibus tomentosis

Habitat in cap. b. pra. herb. Guss. 5

Rami ^{et} lineis decurventibus, angulati, glabri. Solia subpetiolata, ad unum
latus ~~curvata~~ ^{erecta}, semipollicaria, apice mucrone flavescente terminata, mar-
gine revoluta, subtus folio longitudinali, supra leviter, pallida viridia. Flores
in capitulis sessilibus, globosis, terminalibus, hirsutis. Stipula nulla

Aliud specimen vidi foliis pollianibus, ramis superne canescentibus.

Phyllia

Habitat in insula Bourbonica herb. Commens. herb. Guss.

Rami teretes, inferne glabri, tuberculati, superne villosi in canis, ternatis. verticillati. Folia brevissime petiolata, unguiculata, lineari-lanceolata, supra nitida, subtus tomentosa, incanas, margine revoluta, acuta. Stipula nullo. Ploer in capitulo terminali, sessili, magnitudine pisi, incani. Fructus globosus glaber magnitudine pisi.

Offens. Ph. Divica

paniculata *Phytol* foliis ovatis mucronatis supra glabris nitidis subtus
tomentosis, racemis foliosis paniculatis Wild. spec. pag 1112.
Habitat. Cap. b. spec 5

non vidi

purifolia ~~Phyllea~~
foliis acerosi utraque planis glaberrimis, floribus panicula
to racemosi den. h. V. 235
Beechea africana foliis lineantibus conalculatis Burm. prodr

cap. pag. 12.

Pl. 1

o. Burmannio habeo ^{cum} ~~et~~ ^{et} ~~procedente~~ ^{Terminales}

Rami ~~teretes, glabri, elongati, purpura fentes, fraxi, interdum gemi~~
^{vel terni} ~~superne bifidi, teretes, elongati glabri, purpura fentes, apice ramulis florife~~
~~ni racemoso-paniculati.~~

Folia ^{sepiacea} lineana, pollicana et ultra, frequentia, fere Pini abietis,
obtusis, glaberrima, laeva, integerrima, avenia, flexilia,
basi pallida.

Spica ex axillis supremis et ramulis summis, interdum sequipollicia
res, teneres. Flores ^{longiores} sepales, alterni, approximati. Bractee minime
longitudinae, longioribus, proter squama ^{ad basin squamulae floris} ovatae, ferrugineae, conica
ae, obtusae, flore breviores. ad basin singuli floris.

Germen urbinatum, ferrugineum ^{quidam nectarium nullum}

Corolla fundus rotundus Petalae quinque, albae, lineanae, obtusae. Squamae non video

Raminae quinque.

Germen urbinatum, ferrugineum. Stylus unicus

100116

Phyllea conf. spec. herb.

Secunda P. foliis linearibus mucronatis glabris, capitulis terminalibus
resupinatis Thunb. prodr. fl. Cap. pag. 44
Habitat in Cap. b. spec. 5

non ved-

atillani l

pubescens Ph. foliis linearibus acutis pelopis subtus tomentosis, floribus racematis,
bracteis villosis foliis formibus Hort. kew. 1. p. 268.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Rami teretes villosi. Folia brevissime petiolata, margine revoluta
nervata scabripetala superiora pelopora rami in pinnam
hirsutissimam bipollicarem a foliis linearibus flavido her
pulisimis. flores axillares solitarii

Rami sparsi virgati villosi canescentes in primis superioribus
superius villosi, inferius glabra

foliis subcordato
superioribus

Folia linearia revoluta unguiculata ^{superius villosa} inferiora glabra
superiora subhirsuta. Flores ex axillis foliorum superiorum
sed longitudine foliorum tomentosi pedicellati. pedicelli tomen
tosi incani uti corolla extus. lacini ovato

Villosa P. foliis linearibus, superioribus villosis floribus racemosis
Thes. prod. fl. cap. pag. 44

violæca Cepk.

Feliifolia P. foliis feliiformibus subtus tomentosis alternis floribus specato
capitata

Habitat in Q. b. pritz

Rami subverticillati tenues superne cinereo purpureo scate.

Folia pollinaria P. encoides, supra glabra, frequentior erecti
apicula, revoluta. Flores in apicibus ramorum conferti; calice
cinerei integerrimi bracteis villosis longitudine florum.

~~antheris~~ pubescentis horti kew.

Canadensis P. foliis oppositis lanceolatis subtus tomentosis, capitulis termi-
nalibus hirsutis Thunb. prodr. fl. Cap. pag. 44
Habitat in C. b. prae

non vidi

ericoides P. foliis lineariibus verticillatis. Linn. S. V

Alaternoides africana, ericifolia, floribus albis
et muscosi Com hort. 2. p. 1. t. 1.

Habitat ad Cap. b. p. t. y

Stem verticillati e ca. foliorum dentuulati scabri. Folia
petiolata terna glabra tercia, subtus folio e marginibus
foliorum revolutis. ~~Stem~~ ^{magnitudine} ~~Stem~~ ^{interius} ~~Stem~~ ^{nigra} unguiculata. Flores in capitula
terminali cernuis foliis longitudine capituli. Flores su peti-
la extra pelosissima utia parviflora cui affinis

glabris verticillatis, ramis subumbellatis
capitulis terminalibus tomentosis

parviflora P. foliis subulatis acutis pabris subvilosis, ramis paniculato-
multifloris her. Mant 209 +. N. Bery. Cap. 40
Habitat ad C. b. p. 5

Rami pubescentes ramuli purpurascens ^{ramuli villosos} subreticulato ^{et rugati}
castris foliorum denticulato-pilati. Folia parva revoluta brevissime
reticulata, sparsa approxinata supra convexa ^{reticulata} punctato
pianifolia, subvilosa, patentia. Ramuli ultimi simplicissimi alter
ni vaguiculari, florigeri. Flores ^{capitula} terminales sessiles, magnitudine
vix feminis cannabini. Perianthium commune pentaphyllum, specu-
mis oratis acutis flore brevioribus. Calyx extus hirsutissimus

varietas, p. ni fallor, foliis glabrioribus Ramulis e castris foliorum
denticulato-pilati

Foliis linearibus lanceolatis acutis pabris ramis ruga-
tis, capitulis terminalibus tomentosis

omnes de la Mantii volder huiusmodi, capitula parva herb. la Mantii

Phylecia cordata dyeri. omisa in C. post. cur?

Stipularis P. foliis linearibus stipulatis, floribus quinque corneis her-
mant. 20 D. * S. V. p. 235.

Chamaelea foliis angustis subtus incanis, floribus masculis Burm
apr. 177. t. 43. fig. 2.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Caulis prolixis. Rami teretes super e capis foliorum scabi superne pubescenti
subternere. Folia sparsa subulata, teretia, supra e punctis
minutis scabripala glabra, subtus e latensibus tomentosis e latensibus
ve orlatis sulcis longitudinalibus transversis percolata. Stipula ~~dua~~
minuta utrinque ad basin petioli ^{espresso} aciculari patens. Capitula
in apice ramulorum solitaria. ~~Involucrum~~ Calyx communis
polyphyllus, folioli ovati carinati acuminatis ferruginei, gla-
bri flore brevioribus, flori valde lanati. Tubis brevi limbi
lacinis setacei longi extus albedo lanati intus glabri

glabri, capitulis terminalibus

lanceolata P. foliis lineantibus glaberrimis nitidis subtus tomentosis costis punctatis
capitulis terminalibus tomentosis

Habitat in Insula Bourbonis Thoma ~~placitum capensis enesi~~
~~est videtur~~
et ramuli

4-6 pedalis Ramis verticillatis ternis, quaternis vero purpurascens ramu-
li. ~~non~~ villis densis griseis tomentosis. Folia semiunquiuclana
revoluta pinnatis ut nullis patentia, acuta. Flores in
capitulo terminali collecti, in maturis ramulis ultenius
et cespitatis foliis tomentosis subpinnatis ~~et~~ glabri
Corolla tomentosa. Laciniis ovatis, tubo oblongo
fructus margine pappi pubescens

an enophoros

Stipulon proxima

imberbis Phylia foliis linearibus obtusis scabris floribus terminalibus Lin. Ment. 209. S. V. 235
Sanamunda Textia Clusii affinis, foliis polii Cap. b. spec. Brey. Cent. 10. Tab.
Erica⁷ africana flore albo, folio Rosmarini Seb. Thef. 2. p. 50. t. 49. fig. 5.
Phylia imberbis foliis linearibus subulatis obtusis subhispidis scabris, ramulis simplicibus
unifloris, capitulis pubescentibus & Sery. Cap. pag. 57.

Habitat in C. b. spec. 7

Folia linearia compressiuscula, scabra punctis minutis, subhispidata, patula, subpetiolaria
ter, subtus sulco tomentosa. Flores terminalis, solitarii, sessiles, magnitudine pisi.
Calyx foliolis ciliatis l. m.

foliis lanceolatis villosis capitulis terminalibus
Thunb. prod. fl. Cap. pag. 44

capitata P. foliis linearis lanceolatis villosis, ~~ex sup~~ bracteis
hispidissimis, capitulis terminalibus Thunb. prodr. fl. cap. pag

45.
Africanus arborescens tomentosus capitulis Seb. thes.

1. p. 3 d. t. 23. fig. 45.

Chamaeloa pilosa angustissimo folio, capite lanuginoso
Murm. afr. pag. 121. tab. 44. fig. 3

Habebat in Cap. b. p. 5

Rami hispiti proferunt superne e foliis copiosissimis
confectis fere secti Ramuli flomiferi ad apicem
approximati folia s. s. qui pollucana attenuata mar
gine revoluta subtus incano tomentosa folia pater
nae fere curva mucrone terminata. bractea
pilis flavescentibus hispida folus parum arge
ntior. Petala s. b. a. c.

elliptica

lanicollata

P. foliis lanceolatis mucronatis subtus tomentosis supra nitidis
sub floribus axillaribus sessilibus subfoliosis

Habitat in C. b. Spei

utroque alba

Ramulis parvis villosis tomentosis. Folia petiolata ungui sulcata
aeterna. Spica ex aliiis supremis ramulorum folio longior
flos alterni distantes minuti tomentosi niani. Calicis
ovata flava ante bracteas sub pediculis linearis mucronata
longitudine floris

buxifolia P. foliis ovatis parvis Ternis que subtus tomentosis Lin. l. v.

Chamaelea africana, foliis subtus glandis Herm. afr. 6.

Chamaelea folio subtus glandis subtus incano, floribus in capitulum collectis Burm. afr. 119. t. 44. fig. 1.

Habitat in Ethiopia

buxifolia Ph. foliis ovato-oblongis subtus tomentosis, floribus subglomeratis

Hort. kew. l. p. 264

Rami subvesti illati, teretes superne villosi. Folio petiolata subtus incana, prope marginem parum revoluta, supra punctis albidis scabriuscula, ^{epinervis} ^{longioribus} ^{venis} nervis majora quam in congeneribus. peduncululi ~~et~~ ex axillis supremis approximati. Flores plures seiples

— obtusi capituli terminalibus

an Ph. cordifolia hinc pectinat. gort.

callosa?

foliis cordatis lanceolatis subtus tomentosis supra papilloso
apice pungentibus, floribus capitatis villosis *Len. Suppl. p. 153.*

~~P. p. 235~~ P. V

Habitat ad Cap. b. p. 5

callosa P. foliis oblongis cordatis acuminatis pilosis subtus tomentosis, floribus
subcapitatis *Art. New. 1. p. 269* ^{per intervalla jove nodos}

modus crescendi reliquatum. Nami teretes superne villosi. Folia
petiolata frequentia ~~approximate~~ ^{conferta}, reflexa vix unguia
lana supra ~~et~~ ^{periculis elevatis} scaberrima, subtus tomentosa

descriptio
ad bursifoliam
restat mea
non est callosa
Thunb.
om mea duo co her

incana, crassa, ^{piperisosa pilosa} cinerea, ^{marginibus revolutis} state supra
glabra, ~~suprema angustiori~~ ^{bracteis armata} fl. ~~pilis~~ ^{bracteis} flavescantibus. ~~herpeto~~
petioli plani

— ovatis pilosis subtus tomentosis

Capituli terminalibus

~~an eadem can. d. d. c. b.~~

Spicata P. foliis cordato-sagittatis laniccolatis subtus tomentosis supra gla-
berrimis acuminatis pungentibus, fructu lanatis Lin. suppl. p. 153. *

S. V.

Habitat ad Q. b. p. et

Spicata Ph. foliis oblongis cordatis acuminatis subtus tomentosis, fructu cylindrico
floribus longitudine bractearum Hort. kew. pp. 269

~~Rami teretes vellosi proferunt superne. Folia parva in
pubulata vel lineari-laniccolata (an igitur Lin.) petiolata
pollicaria, supra punctis minutis praevia, basi superiora pelosa.
Spica terminalis bi-pollicaria, hirsutissima e foliis lineari-
bus hirsutis flavicantibus. floris axillaribus foliis quadri-
plo brevioribus, hirsutis, calicibus ovatis parvis tubo oblongo
recedentem hinc differentia Hort. kew.
ab omnibus differit hinc elongata in spicam vellosam
— cordatis acuminatis subtus tomentosis, fructu
cylindrico Thunb. prodr. fl. cap. pag 45~~

non vid.

umbriata P foliis cordato-ovatis, floribus racemosis Thunb. prodr. fl. Cap.
pag. 45.
Habitat in Cap. b. p. 5

non vidi

Dioscorea Phyllaea foliis cordatis Lin. Mant. 342 et S. V. p. 235.

Habitat in Ophiopnea 4

Calycis squama hirta pilis glaucis crispis; Corolla pilis albis. Variat foliis revolutis linearibus Lin.

mibi haud rite cognita
nec vidi

forte eadem ac *callosa*

racemosa P. foliis ovatis glabris, floribus simplicibus paniculato-racemo
fr. Lin. Mant. 209 + L.V. p. 235
Psychotria cordata Burm. ^{cap} prodr. pag 12.
Habitat in Cap. p. p.

Truncus quinquipedalis, ramis proxi interdum approximatis subter
ramulosis ramulis ~~vicillatis~~, rufescentibus, subpubescentibus - folia sessilibus
alternis ~~per~~ ^{per} ~~seque~~ alternis, copiosa, acuta glaberrime avenia, subtus
pallidiuscula ~~super~~ ^{super} ~~obsoleta~~ trinerviâ integerima vix seminaquidularia fere
Rasura ~~minor~~ ^{minor} Penna mucronata. panicula ~~terminalis~~ ^{terminalis} ~~et~~ ^{et} ~~specie~~ ^{specie} ~~composita~~
et ramulis alternis superne ~~floriferis~~. ^{foliis minoribus} ~~floris~~ ^{compositis} ~~axillaris~~
sessilibus ~~specie~~ ^{specie} ~~axillis~~ ^{axillis} ~~superis~~ ^{superis} ~~primis~~ ^{primis} ~~compositis~~ ^{compositis} ~~quasi~~ ^{quasi} ~~in~~
specie ~~parvis~~ ^{parvis} ~~oblongis~~ ^{oblongis} ~~demum~~ ^{demum} ~~magis~~ ^{magis} ~~distanti~~ ^{distanti}, bractea cordata, flori
non aggregati glabri petalis ovatis planis minutis albis

racemosa

Specimen unius aggregatae subverticillatae D. D. B. Bryoniae
serpyllifoliae D. D. B. Bryoniae.