

Phyllanthus

Urmasia dicea Commers. Deit Foss. S. S. Folia lanceolata obtusa.
Rami temporarij

Monoria monodelpha Jacq. Richon.
hypericifolia

myrtilloides Burmanni est
nervum sparsa spatiosa niger fructu Amygdali Petrus 38. herb. Mus.
Bos de Parva
myrtifolia similis) de J. Jussieu
— nam noster?
an Perin nunc Hort. Mal. p. V. 43

tetragonus Phyllanthus foliis oblongis lanceolatisque, ramis filiformibus tetra-
gonis.

Habitat in Guinea Thonning 3

Stemulus pedalis vel ultra, tenuis, & latera a basi ramosus. Rami et ca-
sti, glabri, simpliciter; altitudine fere caulis. Folia brevissime

petiolata, semipollicaria, subtus glauca, glabra, acuta. Stipula
utraq; ad basin petiolorum, minuta. Peduncululi axillares, brevissimi.

Flores pedunculati, carnei, masculi post foricand. uterque decidui. Cal. 6 par-
tibus. Nectarium in masculi glandula binifido calycis, in femi-
nis squama rotunda, minuto, truncato. Filamentorum columnare
trifidum Thonning

Madagascariensi affinis

Tomentosa ~~Almona~~

Habitat in Peru Herb. Guaf.

Trunci teretes, cortice cineres, glabri, apice fovea villosa-tomentosi. Folia
reticulata, bis 3 pollicaria, oblonga, acuta, subtus nervosa, villosa-conesca
tibi, supra glabriora, obscure nervosa, ^{uniflora} axillaria. Petioli unguicularis,
Peduncululi ex eadem gemma ac folia, flavescenti-tomentosa, uti calycis.
Cordillo vix unguicularis, Calyx 3 partibus lacinis ovatis, acuta

mutabilis Phyllanthus foliosiflorus pinnatis; foliis ovalibus

Habitat in Guinea Thonning

Caulis ang. statim a basi ramosus, 1-2 pedalis: rami adscendentes, angulati. Folia patentia bipollicaria; foliola 10-30, linearis duas longas, brevissime petiolata. Petioles capillares. Stipulae tridentatae ferrugineae ad insertionem petioli, alia utrinque, parva, setacea ad basin petiolorum partialium.

Flores masculi brevis sive pedunculati, subsolitari, in axillis foliorum.

Uterus brevis sive pedunculati, solitari in axillis foliorum versus apicem. Antherae 3. Capsula magnitudine ^{vul} Coniandri.

Foliis communi
no:

In solo arido herbae gaudet caule herbae in pinguiore fruticoso. Singularem quoque quod folia in iunioribus planta glabra in adultioribus pubescentia Thonning

Melastoma

Habitat in Puerto Rico h. b. Desfont.

Rami dichotomi, subtetragoni, glabri, laxes. Folia petiolata, pithamoa, oblonga,
acuminata, inaequaliter denticulata, ciliata, utraque glabra, subtus late virdia,
trinerviâ, præter nervos marginales, supra lanâ, subarenia, subtus more generis
senosa. Petioli semipollicares. Pedunculi e dichotomia et apice, cum ramulo ulte-
rius ex crescente ^{ca} apice, longitudine fere folii. Flores in spicis geminatis
secundis scemofi. Involucrum recti. Stamina 8. Bacca magnitudinis Coriari
800

palustris Annona Aubl.

Habitat in Guana herb. Guss.

Rami teretes, villosi-tomentosi. Folia breviter petiolata, subsessilissima et ultra,
basi ovata, elliptica, acuta, supra arena, obscure remote serrata nervosa,
villosula, subtus nervosa villosa, sordide incana. Petioli unguiculati.

linifolius: Phyllanthus foliis pinnatis floriferis, foliis linearibus lanceolatis,
caule virgato fruticoso.

Habitat in Guinea Thonning 5

Caulis erectus, pedalis, uti tota planta glaber, ramosus. Rami 8 parvi, filiformes, teretes, laeves, divergentes. Folia patentissima: foliola brevius vix subpedicelata, distantia, polliciana, et horum sensim minorum, basi subovata, acuta, avenia, nervia, subtus glaucescentia. Petiolus communis capellari, stipula parva, triidentata, marcescens, ampliatens ad basin petiolorum; duo ad basin petiolorum parviora, parva acuta. 8 loci torii in singula axilla, breviter pedunculati, ^{breviter pedunculati,} annui, duo mascula, ^{junctus} foemineus longius pedunculatis. P.

♂ Calyx 5que partibus. Corolla nulla. Nectarium squama 5que, minuto intra fissuras calycis. Filamenta quinque. ♀ Calyx 5fidens. Corolla nulla. Nectarium margo basin germinis cingens. Stigmata 3a sessilia, patula, bifida. Capsula minuta, trilocularis: loculis bivalvibus, dispermis. Thonning.

caeruleus Convolvulus.

Habitat herb. Lus.

Rami teretes, villosi. Folia breviter petiolata, semi pollicaria, ovata, acuta; juniora
pubes villosa, adulescentia utriusque glabra, subtus nervoso-venosa. Pedunculi polli-
cari, villosi, triflori. Pedicelli breves. Bracteae duae subulatae ad basin pedicellorum
duae in pedicellis. Calycis foliola ovata, attenuata, pubes.

Ardinghelia Phyllanthus

Habitat in insula Bourbonica Commerçon herb. Mus.

Frutex. Rami alterni, teretes, glabri. Folia solitaria vel geminata,
3-4 pollicaria, pennata: foliola oblonga, obtusa, unguiculata, basi sin-
gla, petiolata. Peduncululi axillares, plures, folios duplo minores.

frutescens Phyllanthus, foliis obovatis, ramulis frutescentibus.

Habitat in India herb. Lus. 4

Rami griseo fufescentes, tunica cinereo membranaceo tecti, teretes, glabri, uti
reliqua partes plantae. Ramuli patentissimi in frunam desinentes. Folia soli
tana, interdum gemina, semipollicaria, subtus glauca, petiolata. Floer axil
lares plures.

orbiculatus Phyllanthus foliis orbiculatis, floribus axillaribus.

Habitat in Guiana Richard herb. Guss.

Caulis herbaceus, erectus, simplex, glaber, teres, superne angulatus. Rami alterni, simplicissimi, filiformes. Folia ^{bracteata} petiolata, unguicularia, glabra, integerrima, subter glauca, avenia subrotunda. Pedunculi axillares; foliarii, an 2-3? Stipula subulata, minuto. Capsula sem. Coronandi duplo minor, 6sulcata.

Leucopryus Phyllanthus

Cibus zeylanica fructibus nunciis dulcibus ovis formicarum similibus Herm. zeylan.

64. Lex fl. Zeyl. no 576.

Kattuk pella Cingalen sum

Habitat in Zeylona hinc et

Indice humine raro altior. Flores minimi, fragiles, pendentes

michi speciosus

pubescens Phyllanthus foliis oblongis subtus ramisque pubescentibus
an Rhamnus Burm. zeyl. tab. 80.

Habitat in Philippinis Comnes. Led. Guss.

Rami ramuleque teretes, villosi, cinerascens. Stipula petiolata, semi pollia-
ria, subsessile, supra glabra, subtus subvillosa. Pedunculi axillares, plures,
breves, capillares. Fructus glaber, pericarpio nigro minor. Capsula 7-8 sulcata.
Semen 12-13. Stipula minuta, subulata.

obovatus Phyllanthus foliis obovatis, floribus pedunculatis

Habitat in insula Francia? herb. Guss.

Caules fruticosis, erectis, teres, glabres, ramosos; superne angulatus. Rami alter
ni interdum geminati, filiformes. Folia petiolata, alterna, thymicidior
parum majora, subtus glauca, mucronata. Pedunculi axillares, 2-3. foeni
reus parum longior fere pollicaris, capillares. stipula setacea. Fructus mag
nitudine Coriandri
an Hamisour Torph. ?

Myrtocedrus Phyllanthus folioli ovato-lanceolatis acutis, petioli compressi.

Habitat in insula Bourbonis Comneson herb. Mus. t.

Totus glaber. Rami teretes, purpurascens. Solca petiolata, pedalia, par
sa polyphulla: foliola breviter petiolata, ^{altera} pollucaria, externa et interna
minora, obtusiuscula cum mucrone, Petioli purpurei; inferne teretes, su
perne compressi & margine decurrente. Stipula subulata. Pedunculi cyg
gati, capillares, breves.

macrophylla Phyllanthi: foliis oblongis, petiolis (romis) terdubiusculis.

Habitat in insula Franca Comerspon herb. Guss.

Totus glaber. Rami fusco-purpurascens. Stipula pennata. foliola 2-3 polli-
ciana, lato oblonga, utraque obtusa, obscure venosa. Petioli partiales un-
guiculares. Pedunculi axillares, plures, breves. Omnis magnitudine Pipe-
ni nigri

Dioscorea Phyllanthi foliis lanceolatis oblongis, ramis compressis, caule arbores.

Habitat in insula Francis Commeson herb. Mus. 5

Rami (an potius petioli) sparsi, glabri, inferne teretes, superne compressi, purpurascetes, spithamidi. Folium subsessile, alterna, sesquipollicaria, venosa, obtusa, basi acuta, costa subtus purpurea. Stipula subulata. Flores axillares, copiosi, tuberculo subjecto insidentes, subjecto bractea, ovata, attenuata, rigida in sicula. Pedunculi breves, capillares. Capsula magnitudine Coriandri, sexalveolata. Flores foeminei parum longius pedunculati.

13 foliis oblongis duplo laticoribus, foeta femina.

14 foliis brevioribus pollicaribus.

Cotini folius Phyllanthus foliis ovatis obtusis subtus villosis

Croton venosum La Mart

Habitat in Madagascari Comersoni herb. fusc.

Index. Rami alterni, cortice fusco, cinereo punctato, glabri: ramuli sparsi,
foliosi & floriferi, potentes, tuberculati & capsae foliorum, villosi. Folio pe-
tiolata, sparsa, unguiculata vel semipollicaria, mucronata, subtus venosa,
villosa, fere de canescentia. Petioli villosi. Stipulae minutae, setosae. Pedun-
culi axillares, fructiferi foliis longiores, villosi, capillares; multiflori,
foemineus unicus. Foliola calycis quinque, setosae. Fructus Coriandro
duplo major, depressus, 10 lobatus. Styli 3. bifidi.

Decurrens Phyllanthus foliis pennatis floriferis, ramis inferne et lasea decur-
vante angulatis, superne compressis.

Habitat in India herb. Mus.

Rami subdichotome divisi, purpurascens

habes

myrsinifolius Phyllanthus foliis pinnatis ovatis - lanceolatis glabris, floribus pedunculatis.

Habitat in insula Bobonia herb. Mus.

Rami glabri, teretes, superne purpurascens. Folia pithamosa, frequentia, frequentia: foliola breviter petiolata, alterna, pollicaria, acuta, ovata, obscure nervosa, supra lucida. Flores plures, aggregati, minuti. Petiolus communis e basi decurrentibus e petiolis parvis angulatus.

habes

telephicoides *Phyllanthus folus pennatis floriferi, folioli oblongi obtusissimi;*
floribus pedunculatis, caule fruticoso.

Habitat in Domingo herb La Revellere le Paux.

Caules teretes, ramosus, uti tota planta glaber. Rami herbacei, superne
compressi. Folia tripollicaria, pennata, multijuga. foliola alterna, semi-
unquiculata. Flores solitarii, axillares. Sepala minuta, petala
Capsula glabra duo ad singulum foliolum
an eadem ac hypericifolui

hypericifolius Phyllanthus foliis pinnatis floriferis, foliis oblongis, floribus
pedunculatis

Telephordes frutescens hypericifolia Plum. Mss. p. 171.

Habitat in America herb. Mus.

Herbaceus, glaber. Rami inferne teretes. ~~Folia oblonga, unguiculata,~~
~~obtusiuscula, florifera axillaria, semiunguiculata, alternis, distantes;~~
~~Folia oblonga, unguiculata, obtusa, acuta,~~
~~superne simplicia. Stipulae mucronatae, attenuatae. Flores axillares~~
plures, minuti

acutifolius Phyllanthus foliis pinnatis floriferis, floribus sessilibus, foliolis linea
ribus acutis

Habitat in Tava Commeson herb. Mus.

Tournefort? Rami lignosi, juncei, glabri, inferne teretes, superne angula
ti. Folia petiolata bipollicaria: foliola alterna, seminaugueulana
glabra, subvenosa. Stipula subulata. Flores minuti axillares.

Linifolius Phyllanthus foliis lineari-lanceolatis, pedunculis axillaribus subternis,
caule superne angulato.

Fruticulus cappellani hexapetalos, caspa poetarum foliis, maderaspatensis Plukin
phyt. tab. 103. fig. 4.

Habitat in insula Francia Commerf. herb. Guss.

Caules herbarici, basi ~~non~~ ramosi. Rami alterni, spithamei, erecti, simplices
vel ramo uno alterave, glabri, filiformes, inferne teretes, superne angulati.
Folia sespelia, pollicaria, superne acutiuscula, a venis, subtus glauca
crescentia, integerrima. Hipula membranacea, parva, sulcata, superne
ovata, attenuata. Pedunculi brevissimi: fructiferi solitarii, nutantes; flori-
feri terni
a Phyll. uscipit: differt caule non compresso ancipiti.

grand. Solia? Phyllanthus.

Habitat in insula Francie Commes: herb. Gusf.

Rami teretes, glabri. Solia petiolata, alterna, polliciana, extusum minus,
ovata, obtusa, utrinque glabra. Pedicelli axillares, plures, brevissimi.
Flores glabri.

Phyllanthus

Habitat in Guiana hest. Guss.

Rami teretes, fusci, griseo-punctati. Ramuli furco-purpurascens, alterni
foliosi et floriferi. Folia alterna, petiolata, sesquipollicaria, ovata, attenua-
ta in acumine, acuta, venosa, supra nitida, integerrima. Pedunculi axilla-
res, aggregati, tuberculo infidentas, capillares, copiosi. Flores parvi.
Conam. spec. es.

Phyllanthus

Habitat in Carolina herb. Desfont.

Caules lignosi, ascendentes, pedales, inferne teretes, subramosi: rami simpliciter,
globosi, superne angulati. Folia petiolata, oblonga, utrinque obtusa, semipolli-
ciana. Stipula ovata. Flores axillares, sessiles, parvi. Capsula parva

grandifolia P. foliis ovatis obtusis integerrimis, caule arboreo Lin. Hort. Cliff.
440. S. V. pag. 1392. Tron. Etn. 84
Habitat in America 7

Plantam sub hoc nomine fusi. ^{in Insula Franco lecta} infusi vero num. lex: grandifolia
cum hoc mihi ignota
Rami teretes glabri subflexuosi folia pollicaria exacte
ovata, mucrone brevi terminata supra nervosa subtus
venosa floris minuti aggregati axillares brevissime pedicella
to vix tamen leno

nutans Pl. fruticosa foliis alternis ovalibus, subtus glaucis; racemis
terminalibus, foliis nutantibus Sw. prodr. p. 27.

Tilia forte arbor racemosa, foliis longiore subtus albicante Sloan
herb. 2. 19. v. 150. fig. 3.

Habitat in Jamaica &

Rami teretes glabri folia petio lata utrinque glabra subtus
venosa, glauca, obtusa polliciana & ultra. Pedunculi axilla
res pluri

Conami Th. caule fruticoso ramosissimo, ramis diffusis, foliis petiolatis sub
rotundis apice attenuatis obtusiusculis, pedunculis fasciculatis
axillaribus Sw. prodr. pag. 20.

Conami brasiliensis Aubl. fl. Gu. 926. t. 354.

Habitat in India occidentali

non vidi

acuminatus Phyllanthus foliis pinnatis floriferis, foliolis ovatis acuminatis, floribus axi-
laribus aggregatis, ramis superne petiolicisque compressis

5-6

Habitat Cayenne Ror. angulati

Suffruticosus glaber: ramis superne angulatis. x

~~Solid.~~ 12-14, in pagulo petiolo: foliolis petiolatis, pollicatis, remotis, acuminatis,
mucronatis. Petioli angulato subtriquetri ^{perpetui in} ~~scaberrimi~~ ^{scaberrimi} ~~flexuosi~~

Pedunculi plures, capillares, inaequales. Flores foeminei longiores

~~obovatus~~

302

ad Bonam sub. Tab. 354

occidit ad Phyllanthum bonam

Iniqueter Phyllanthus foliis pennatis floriferis foliis ovatis acuminatis
floribus solitariis, ~~in~~ rachis foliorum triquetris
Habitat in Insula Trinitatis Amer.
tota glabra suffruticosa?
Folia <sup>pe-
tala</sup> petiolo integerrima majora quam in acuminato
subtus glauco vireo
Capsula trilobulata magnitudine seminis coriandri

Specimen imperfectum

in herbano de Lund asservatum

Amorpha
multifolia

Phyllanthus caule arborescente, foliis oblongis pennatis glomeratis, foliolis oblongis
floribus aggregatis

Habitat in India orientali

Rami teretes superne compressi angulati purpurascens glaberrimi
Folia alterne foliolis quindecim ^{vel} petiolulatis ^{sub} oblongis ^{et} acutiusculis
utraque glabris concoloribusque integerrimis

Petiolus dodranti vel ultra parum flexuosus compressus

Stipula sub foliolis ovatis et petiolis ovatis

Peduncululi plures capellari ex axillis foliolorum

Calyx quinquepartitus seppem ^{indivisi} laciniis ovato fructu minoribus

Capsula globosa depresso lani sexcapulari

rigidus
obov

Phyllanthus caule arborescente foliis obov. pinnatis glanpens, foliolis
obovatis, pedunculis aggregatis

Habitat in India orientali Hongk.

Rami teretes ^{rigidi} superne angulati, glabri, cortice purpureo sicca ferruginea
punctati, ^{ramulosi} ^{rotundi} ^{superne} ~~juncea~~ cinerascens, apice angulati e linea a basi
foliorum decurrente.

Folia petiolata alterna pollicaria basi acuta, apice rotundata
integerrima subtus glauca. ^{ad basin foliorum}

Petiolus semiunguiculari. Ripula minutissima aciculari patente.

Pedunculi axillares capillares plurimi inaequales petiolo brevior.

Flores minuti.

Catifolia Scutellaria

Caroliniana P. foliis ovatis integris, floribus axillaribus pendulis Walt
fl. Carol. pag. 220
Habitat in Carolina

non vidi

Liquidambar P. folus pennatis flonferis foliolis lanceolatis obtusis
caule fruticoso

Abitat in Tripula Francie

Petiolus purpurascens globus compressus. Folia profusa

petiolis alternis distantia pollicaria rigida basi acuta

arsua ut nervosa utraque glabra costa dorso pua

subanginea - Pedunculi axillares ut unguiculares 2

3 uniflori. bractea utraque ovata attenuata

obtusis
apice
emarginate
firmior quam
in reliquis basi
acuta

vergata Phyllant. foliis simplicibus alternis lineari-bus mucronatis, pedun-
culis axillaribus solitariis unifloris, caule fruticoso Forst: Prodr:

pag 65.

Habitat in Societatis Gm file 7

non vid.

maderapatenfis P. foliolis alternis cuneiformibus mucronatis Lin. S. V.

Nirouri maderapatenfis feno folio longiore Pet. gar.

Habitat in India

Caulis inferne laxis ~~superioribus~~ ^{rami} angulati, alterni elongati
ramulofi ramuli ^{de} remoti. Folia brevissime petiolata
basi acuta, apice ^{glauco, undia} ~~acum~~ mucronata arena ~~enervia~~ - pedun-
culi axillares tres - 4. brevissimi uniflori. Capsula magnitudina-
ris seminis caulis glabra ^{ramorum} laxe
cum flores tam in axillis foliorum ^{quam} in ramulorum pennata
folia ~~visi~~ neque vid

folia cuneiformibus

Emblia P. foliis pennatis floriferis, caule aereo fructu baccato Lin Fl. Zeyl.

333.

Myrobalanus Emblica Bauh. pin. 445. Rumph. amb. 7. p. 1. t. 1.

Nelli-camarum Rheed. Malab. 1. p. 69. t. 30.

Nellika Zan. hist. 159. t. 6.

Habitat in India t.

Rami teretes glabri cortice aere, glabri alterni. Folia alterna
cincta 21 supra folia alterna brevissime petiolata linearia obtusa
mucronata aerea serrata supra obtusa nervosa subtus enervi
glaucescentia. Flores minuti in axillis foliorum plures
pedicellati. Capsula magnitudine vix pereni nigra. Semina femina a
punctata

Lineatis

folioli utraque aequalibus ramis glabri

mimosoides Phyllanthus caule fruticoso, ramis ^{superne tonantibus} ~~virgatis~~, foliis pennatis floriferis
foliolis ^{subpalmatis} albis latera angustioribus.

Phyllanthus mimosoides caule fruticoso, ramis ~~virgatis~~ foliis pinnatis
floriferis Schw. probronn. pag.

Habitat in Cambis Sorseth.

Rami teretes, superne vellese femurgenis.

Folia paucis alterna: stipula numerosa, sessilia, alterna, aequali
femurgenis plana, aequali, oblonga, altera latere exteriore
angustiora ocata, exterior convexa; obtusa, mucronata, basi
acuta, integerima, subtus pallida, glab utraque glabra.

Stipulae compressae planatae, dentatae. Stipulae trino, laterales, ovatae aeuminatae, tertia sub
reticula eque adpresso, duo longiori stipulae ad basi anguli
floris.

Flores ~~axillares~~ ex axillis foliolorum, plures; pedunculati capillares, in qua
es, foliis quadriplo breviores oli basi rotundatis

(Phyl: embleia differt ramis glabris, foliis angustioribus, latere utraque
aequalibus, netioliis p villosis, teretibus subpetiolulatis, basi rotundatis)

rotundifolia Capriana

11

Virganelia foliis geminatis pennatis flomferis, ^{floribus aggregatis} petiolis pubescentibus
caule fruticoso. fructibus baccatis.

Virganelia Huf. gen.

Præmi vereta cortex cinereo, glabri. Folia gemina ex
singula gemma quadripollicari foliola frequentia
alterna breviter petiolata externa acuta interna obtusa
ovicoronata linearilobata p. v. vaguiculata p. pedicelli
plures foliolo dimidio breviores

~~mimosoides Ch caule fruticoso, ramis virgatis, foliis pennatis floriferis.~~

~~Sw. prodr. pag. 27.~~

~~Habitat in Antigua 4.~~

ni xuri P. foliolis pennatis floriferis, floribus pedunculatis caule herbaceo
erecto h. C. Reyh. 331

Vurganeli Rheed. Mal. 10. p. 29. Tab. 14.

Indivulus capsulari hexapetalos; casio poetarum foliis brevioribus. Pluk.
alm. 15. g. v. 183. fig. 5.

Nunni barbodense, folio ovali subtus glauco, petiolis florum brevissimis
Nunni Salavacensis Mart. Cent. g. t. g.

si minor Herba morosa alba Rumph. amb. 6. p. 41. v. 17. fig. 1.
abund folio

Pet. in. Act. Unnana indica erecta vulgaris Burm. Reyh. 230 t. 93. fig. 2.

arg. no 276 Habitat in India

1 Aug 1809. h. C. Caulis simplicis primus erectus fructus; glaber superne angula
tus parvis pappis. folia sparsa versus apicem confertiora
mutantur. petiolis alternis ovatis apice pendula 5-6 pollucina
foliola alterna petiolata oblonga exteriora et interiora
minor, glauco v. indico obscure nervosa venis. Flores axillares
v. 1-2-3.

unnana barbodense a de West mesa videtur differre caule
humiliore ramato.

—
Suffruticoso

myrsinoides Phyl. foliis pennatis floriferis foliolis lineari-oblongis acutis laevibus

fructibus

Habitat in India orientali

folia Ramis teretibus apice pubescentibus folia solitaria 5-7
foliola breviter petiolata. flori 2-3

racemosus P. foliis pinnatis apice racemoso-floriferis, fructu baccato exsucco
caule suffruticoso den. Suppl. pag 415. & P. V. pag 847

Habitat in Zeylona

Similema reliquis foliis simpliciter pinnatis foliolis alternis
lineari acutis apice minoribus ubi terminatur petiolus in racemulum
tantum

non vid.

unnana P. foliolis pennatis floriferis, floribus sessilibus. caule herbaceo pro
cumbente Lin. & L. Zeyl. 332.

Siam - Burjaneli Rheed. mal. 10. p. 8. t. 16.

Triticulus capsularis hexapetalos, brevioribus foliis et angustis Pluk.
alm. 159. t. 103. fig. 6.

Herba moroni rubra Rumph. amb. 6. p. 41. t. 17. fig. 2.

Habitat in India O

Radix capillans. Caulis palmarum vel feminealis pallide fere
nervis fere subplexis. foliola oblonga minus quam in
nervi pedunculis solitariis ped. uniflori

Unnana Comnes. fait Poivre en Lin. ? dit t. Thonin

in herbano despendens

25 Anciens Phyllanthus ^{Phyllanthus} floribus axillaribus pedunculatis, foliis linearibus
oblongis, caule suffruticoso compresso simplici.

Habitat in India Orientali

Caules plures, erecti vel ascendentes, spithamei, corae praefati
basi teretes, glabri, linea utrinque decurrente, post
^{post caput foliorum denticulata}
Folia vix petiolata, alterna, unguiculata, basi ovata
que minora, oblonga, interdum lanceolata,
integerrima, obtusa, mucronata, aseniâ,
fuit usque glauca.

Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, capella
res, foliis brevioribus, patentissimi

Pappi glabri, globosi, semina Corandri minorâ
bus, trivalvis

Phyllanthus simplex foliis lanceolatis decurrentibus,
sumis que simplicibus Retzi obs. 5. p. 29.

Zeylanica ~~Uvana~~ ^{redunculor} foliis oblongis undulatis, pet. floribus infra foliaceis
unifloris ^{ovatis} pedalis ^{cauculatis}, ramis villosis glabris

~~Uvana~~

Nanum panel Rheed. ~~bot~~ Malac. 2. p. 11. Tab. 10

Uvana zeylanica foliis integerrimis Lu. V. pag

~~abrupte differt ramis purpurascensibus superne villis griseis~~

~~foliis longioribus venis ^{acuta} acutiusculis minime vero~~

~~atque in acumine depresso basi apice. pedunculo capillari~~

~~tus unifloris infra foliis postis ^{maiores} flores minores petala angustioribus~~

~~ramis tomentosis ovatis tomentosa. Emictus oblongi~~

barbiformis P. foliis pinnatis foliolis tenuis, flore foemineo Var menali Lin
mant. 294. & Suppl. pag. 847. ¹⁴¹⁸ L. V. pag 847

Habitat in India Orientali O

Caulis ramosus inferne tetragonus superne angulatus e leneis
aculis decurrentibus. Folia laevia ~~remota~~ oblonga subsessile
fere ut unguiculata utraque glabra, arenae enervi
vnde glauca mucronata

Nomen affinis madagascariensis portulacae minoris folio Pet. 42
herb mus

— subfinais oblongis

Hammar P. foliis pinnatis: foliolis obovato-oblongis, stipulis lanceolatis
di Korth. De fr. pag. 159
Habitat in Arabia 5

Specimen ignotum

variegata
mucronatis, foliis simplicibus linearibus mucronatis, flombus axillaribus
solitariis caule fruticoso

Phyllanthus variegatus

Forst. Desf. & Gray

scorvus

Ph. 1117 } foliis folia pennata sempedalia
 2 lini foliis herbaeus subramosus
 Thon } 9/10e Rodonque
 Caulis fruticosus ramosus, 1 1/2 pedunculatus, sergaten