

Picris

Calyx imbricatus. Semina attenuata, mucronata, pappi
tam punctatum.

Sicni Danubialis Allione est | herb. L. H.
Leontodon crepidiformis La Marche

Pappus sessilis

hispida

~~et hispidula~~

Pennis hispida, scaber rima, foliis lanceolatis integerrimis subden-
tatis integerrimisque

Hieracium altissimum, asperum, unicaulis, longifolium, sinuatum
polycephalon Rup. hort. cath. 95. Raji hist. 3. p. 145.

Helminthotheca hispida, altissima, ceteris foliis, leviter dentata.

Vahl. in Act. par. 1721. n. 7.

Habitat in Sicilia? Ex herbario Vaillantii

Caulis bipedalis et ultra, sulcatus. Folia sessilia, quinque pollicaria
integerrima vel inferne remote dentata. Pedunculi superne, axillares
et terminales, hispidi, breves, rigidi, uniflori ad quadriflori. Anthera
nullum. Calycis foliola lanceolata. Pappus sessilis sessilis,
plumosus. Semina fusca, transversim rugosa.

Centaurea

Carduus orientalis centauroides flore purpureo odoratissimo Tournef. Cor. pag

Habitat in Oriente herb. Mus.

Caulis erectus, angulatus, herbaceus, crassitie penna ^{opposita} Cynea, ramosus, superne villosus.
Folia spithamea, pennatifida: penna ^{opposita} lanceolata, integerrima, utrinque scabra. Flores
terminales, pedunculati, solitarii. Calyx bent. scabro: squama ovata, subtomen-
tosa, apice fusca ciliata, termina spina fusca brevi. Lobi intense purpurei.

Pura

Habitat herb. Desfont.

Caulis herbaceus, erectus, fistulosus, subhirsutus, striatus apice subtrifidus, ramosus.
Folia caulinea amplexicaulium oblonga, superiora lanceolata, integerrima,
obtusis, utrinque profertim subtus pilis albidis adpersa. Pedunculatae superne
unius vel alterius, in rami ad apicem subramosi, uni flori, vel ut apicem folio
infinitis. Flores minores quam in Hieracioides. Calyx hirsutus, calyculatus.
Semina extensa ⁱⁿ cavitate ⁱⁿ recedente ⁱⁿ lappi folio ⁱⁿ calycis ⁱⁿ extensa
Pappus sessilis plumosus. Semina striata

est forte diversa ab Har. molli Jacq.

japonica P. penantibus hispidis, foliis dentatis, pedunculis subaphyllis hispidis Thunb.

fl-jap. p. 299 & Lin. S. V. p. 711

Habitat in Japonia

Caulis striatus hispidus paniculatus, bipedalis. Eolia infima subpetiolata, atse-
nata, digitalis; superiora sessilia, pollicaria; omnia lanicolata, den-
tata, utrinque pilosa. Panicula fastigata. Pedicelli ^{antherali} aphylli hispidi
longi. Pedicelli subsessili, aphylli hispidi cernui. Penanthium du-
plex, erectum hispidum. Pappus plumosus. feminibus oblongis rugosis

aplenoides P. foliis pennatifidis: lobis alternis rotundatis Lin. t. V. p. 711.

Helminthotheca hippidosa aplenioides, fucis sulphureo Vaill. bot. 1727.

n. 206.

Habitat in Aegypto Barbaris arceosis maritimis

Crepusculata L. Mart. herb. h. M.

nudicaulis Pini foliis lanceolatis dentatis - subpinnatis, ^{glabris} basi pinnatifloro
Habitat Tuncet

Radix annua byzolluciana

Folia radicalia glaberrima, coria, remote dentata, basi
in petiolum attenuata

Scapi ^{plures} apicantes glabri striati pithamo basi purpureo
superne in pedunculos 2-5 divisi rarius uniflori
Pedunculi basi squama lanceolata acuminata, superne
unicostata ad apicem squamis membranulis subulatis remotis.

Calyx: folia subint polyphyllus folioli exterioribus interioribus
triplo brevioribus lanceolatis attenuatis induratis
tomentoso cinereis antheris

Class. fl. Corolla staminibus fusis

Semina subulata transversim rugosa in acumine longitudine
calycis deflexa. Pappus nanosus. Pteroptaculum nudum

^{caule nudo}
Lacis Hypochoeris ad Pappum diversa seminibusque diversa
Lem. Hypoch. glabra
Hypochoeris glabra est

