

# Pimpinella

1. Saxifraga P. folius pennatis: folioli radicalibus subrotundis, summis linearibus, caule tereti simpliciter <sup>radicalibus</sup>
2. major P. folius pennatis: folioli ovato lanceolatis aequaliter serratis, caule angulato <sup>folioli</sup>
3. rubens P. folius pennatis: radicalibus cordato-lanceolatis duplicato-serratis, pubescentibus, caule angulato
4. magna P. folius pennatis: folioli radicalibus subcordato-ovatis petiolo & impari trilobis: caulibus supini quibus, caule tereti
5. orientalis P. folius pennatis: folioli radicalibus cordato-ovatis incisive caulibus palmato-pennatis fidi, caule angulato
6. germanica P. folius pennatis folioli radicalibus palmato-multifidis
7. glauca P. foliis suprae compressis, pinnis capillaribus, caule angulato ramosissimo.
8. peregrina P. folius pennatis, folioli radicalibus creatis: summis cuneiformibus incisive, umbellis nubilibus nudantibus
9. anisum P. foliis radicalibus obovatis profunde dentatis incisive caule villosa canescente

10. Dichotoma P. caule dichotomo angulato, umbellis lateralibus terminalibusque.

11. Doria P. umbellis numerosis simplicibusque, floribus  
Doria.

*Viminea*

Habitat in Syria herb. Desfont.  
Rami subdivanati

Caulis angulatus, glaber. Folia tripinnata: foliola alterna, linearia, angustis  
ferruginea, glabra, acuta, semipollicaria; suprema trifida, opposita vel alterna.  
Rami floriferi saepe terni, fastigiosi, patentis. Umbella radii 4-6. parvales 6-11.  
flori. Semina oblonga, striata  
antheria at illi folia parum latiora et breviora minusque composita

*Lutea Pimpinella*

*Trogopelenium africanum altissimum* Tournef. Inst. r. h. p. 309.

*Pimpinella fastigiata maxima africana* Magnol. Bot. membr. app.

*Pimpinella lutea*

Desfont. fl. atlant. 1. pag. 265. tab 76.

Habitat in Africa septentrionali herb. Desfont.

Caulis teres, 9 latus, teris: folia pennata, quadripartita: foliola sesqui-pollicaria,  
ovata, incise-pinnata, uti petioli villosa, supra nudiora, obtusa; suprema flori-  
fera lanceolata

*foetidissima* Pimpinella

*Tragoplonum minus saxatile foetidissimum apicifolium* Tournef. Cor.

Habitat herb. Insul.

Caulis erectus, flexuosus, teres, lani, e tomento tenuissimo incanus, ramosus. Folia radicalia petiolata, pinnata: foliola 4-juga, infima petiolata, reliqua sessilia, ultimo basi attenuata, oblonga, vix semi-pollicaria, subrenosa, venis sine villosa canescentia uti reliqua parte, infrequentia petiolata, trifida: lacina linearilanceolata, integra, integerrima, intermedia saepe trifida: suprema linearilanceolata, integerrima, indivisa. Involucrum 5-7-phyllum: foliola linearia, Umbella brevior: pedicella nulla.

*Pimpinella*

Dote *Pimpinella crispata* Tragi *Horione*

*Habitat*

herb. *Horionis* apud *Desfontaine*

Caulis glaber, teres, striatus, ramosus: Rami patentis. Folia radicalia 2-3  
pinnata: pinnae parvae sessiles; obtusa, serrata incisae, vel oblongae, integerrime,  
acutiuscula in foliis minoribus, terminalis 3-fida, uti petioli <sup>est sola</sup>  
reticulata. Folia ~~radicalia~~ <sup>et</sup> propria opposita, unicuique proprium sessile  
tum ad basin petioli parvissimi: sub ramo <sup>est</sup> linearia, <sup>est</sup> acuta, integerrima  
Umbella 5-8-loba. Semina globosa, lœvia, glabra. Involucra ad involu-  
cella nulla

*Lutea Pimpinella*

Habitat herb. mus.

Folia radicalia, <sup>quinguefida</sup> pennata, pedalis: foliola pectolata, opposita, villosa, uti petiolus; supra  
glabriuscula, seriquipollacica, inaequaliter crenata, basi altero latere brevium, venis  
la, terminale subrotundum. Caulis erectus, tenuis, teres, glaber, aphyllus, ramo  
sus. Hirsuta concinata, acuminata, ad ramos. Umbella univesalis teradica  
ta, pedalis 7 radiata; flores parvi

\* *straga* P. foliis pennatis: foliolis radicalibus subrotundis, summis lineari-  
lin. l. v. *Sarq.* fl. austr. 4. t. 395. fl. Dan. t. 699.

*Pimpinella saxifraga minor* Bauh. pin. 160

β. *Pimpinella saxifraga major altissima* Bauh. pin. 159 an huc?

Habitat in Europa passim silvis & *simplex* fere  
Caule erecto <sup>pedali</sup> tereti striato. Caulis omnia fere radica  
lia, caulium tantum ex apice vagina rudimentum folii penna  
ti pennis lineari-bus. radicalia pennis undecim vel unguini  
cibus in cuspis serratis ter minimali trilobis. Umbella parva

---

caule ang. tereti simplicis



<sup>caule striato</sup>  
nigra Pimpinella foliis bipinnatis pubescentibus; radicalibus foliolis sub  
cordatis incisive obtuse dentatis, caulinis bipinnatis lineari-  
~~caule striato~~ Willd. spec. pl. pag. 1471.

Pimpinella saxifraga major altera Bauh. pin. 159.

Saxifraga hirtina minor foliis sanguifera Bauh. hist. 3. p. 111.

Habitat in Germania. 4

negra P. caule folio-pinnatis villosi foliolis radicalium orbicatis incisive ob-  
tusis dentatis, caulinis bipinnatis foliolis cuneiformibus, caule piloso Wreden  
fl. Berol. n. 340

melis ignota

major P. foliis omnibus simpliciter pennatis folioli lanceolatis ~~operculatis~~  
~~terminalibus ovato-lanceolatis apiculatis serratis caule angulato~~  
Saxifraga hircina major Bauh. hist. 3. p. 109.  
Pimpinella foliis pennatis, pinnis lanceolatis serratis ~~extremis lobatis~~ Hall  
Pimpinella saxifraga foliis omnibus simpliciter pennatis  
folioli lanceolatis auriculatis Retz. obs. 3. p. 29  
hist. n. 1706

Habitat in Europa.

Pimpinella saxifraga Lam. epit. p. 775.

Pimpinella magna foliis ~~omnibus~~ ~~pennatis~~ ~~imp~~

Pimpinella magna Jacq. austr. 4. t. 396

Habitat in nemoribus <sup>bus</sup> graeviosis.

Caulis bi- / tripudatus erectus glaber interdum pilosiusculus  
simplex. folia radicalia 4. 5 pinnis grosse serratis pollicari  
Una ultima confluentia. superiora angustiora linear  
lanceolata

ruber P. foliis omnibus pennatis radicalibus cordato lanceolatis duplici  
to serratis subaequali caule angulato

*Pimpinella saxifraga major hincina*, foliis albe incis, montana Itali  
ca Banel Ic. 437.

*Pimpinella magna* foliis pennatis, folioli petiolatis ovato-acuminatis  
duplicato dentatis extremis duobus imparique tri lobis, coeteris idem  
sunt annulatis.

Habitat in Europa

inferiora subtus pubescentia  
similis P. majori folia 5 puga basi saepe in lobis bene partiti  
petioli vagina petiolorum superiorum lato

magna P. foliolis omnibus lobatis: impari trilobo Mant. 219 L.V. p. 291.  
4aequ. fl. austr. 4. 1. 396.

Pimpinella saxifraga major, umbella candida Bauh. pin. 159.

Pimpinella foliis cordatis: impari trilobo Hudf. fl. ang. 110  
Habitat in Europa

~~β. Pimpinella orientalis Gussone foliis radice calibus quintatis, foliis cæteris  
caulis basi denticulato, caulibus pennatis, foliis paratis pennatis Gussone  
allert. bot. p. t. 167.  
4aequ. fl. austr. 4. 1. 397.~~

~~Habitat in Europa sylvatica in graminosis~~

~~α. Caulis tripedalis sulcatus angulatus scaber glaber. folia  
4-5 pinnis folioli ovato lanceolati profunde serratis, palliantibus  
oppositi <sup>per</sup> extremum confluentibus cum terminale confluentibus in  
pari pinnis trilobum foli radicalium sive latera. superiora an  
quætorum.~~

~~β. caulis altior rigidior, ramis foliis pinnatis serratis  
inæqualibus, pinnis inferioribus subordatis~~

caulis angulato

~~varietas hinc et nos foliis ovato-lanceolatis æqualiter serratis  
an pinnis denticulatis Gussone Cur. austr. planta differt  
orientalis forte præparanda magis d. stat quam magna a saxifraga~~

*Pimpinella major germanica*, foliis albis incisè Barr. 4c. 243 forte

*Pimpinella major* foliis pennatis foliis petiolatis, ovato-acuminatis

<sup>duplicato serris</sup>  
quatuor folia superiora bipinnata. fol. - pollicari

folia radicalia 2. 3. juncta foliola cordato ovata. caulibus  
parvis

foliis omnibus pennatis radicalibus subcordato ovatis  
petiolatis impari-lobis. caulibus subuni-  
formibus.  
caule tereti.

orientalis P. foliis <sup>nunnotis</sup> caesp. radicalibus pennatis foliolo cordato ovatis incisè cau-  
lenis <sup>palmatis</sup> pennatis <sup>pinnatis</sup> pinnatifidis caule angulato.  
Ragoplenum orientale Calicutum umbella alba Tournef.  
corol. 21.

Pimpinella orientalis foliis radicalibus quinatis foliolo interme-  
dio basi auriculato, caulibus pennatis foliolo palmato-  
pinnatifidis Joan. illustr. p. 2. tab. 5.

Habitat in oriente ♂

Caulis foliatus ramis paniculatis. Folio radicalibus pinnis  
quinque petiolatis. folio inferiori cordato, intermediis obliq.  
ovatis superne ad basin longitudinaliter retusi impari  
ovato equali trilobo radicele pinnata foliolo duoties  
nova tripartito palmata multifida cetero media minore  
basi aurata foliolo sesqui oblongo. folia anni 20. caespitosa  
pithamea, pennata pinnatis septem caespitosa ternatis  
reliqui tripartito multifida, alba pinnatifida Caulibus  
nuda minore superne ternata

forte nil nisi varietas Pimp. magno

*Hymenaea*

Cal. Perianthium Tetraphyllum foliolis oblongis, coraceis <sup>inter</sup> basi medio  
villis tenuissimis subsessis duabus minoribus  
Petala 5 oblonga longitudine Perianthii quatuor subaequalia 5 tum angustiora  
in altero margine convexiora  
Stamina filamenta 10 corolla longiora  
germen pedicellatum oblongo subrhomboidum. Stylus longitudinem  
filamentorum.



germanica P. foliis pinnatis radicebus foliolis palmatis multifidis

Habitat in germania

Caulis striatus teres glaber. folia tripartita trifida

laciniis <sup>concoloratis</sup> dentato-pinnatifidis lobi inferiores potius  
bipartiti bifidi

forte Pimp. dispersa Retzi vel potius varietas

P. magno

Trocyum P. folus pennatis: foliolis cuneatis incisè summis simplicibus, sementar  
hispidis Vill. fl. dalph. 2. pag. 608

Colum. phytol. 7. 17.

michi ignota

peregrina P foliis radicalibus pennatis crenatis: summis cuneiformibus incisio,  
umbellis nubilibus nutantibus Len. l. v. Jacq. bot. 2. t. 131.

apuum peregrinum, foliis subrotundis Bauh. pin. 153.

Daucus Tertius Dioscorid. Colum. Ephr. p. 100.

Habitat in Italia passim ferilibus &

caulis bipedales pauci foliis. Collea radicalia prima simpli  
cia deca ternata subsequa <sup>snato</sup> pennata subrotunda sic  
Jacq. mea diversa est haec paucis diversa videtur ~~caulis~~  
basi

Folia bipennata s. pingu foliolis utrinque folio bipartito in laci  
nia <sup>intra</sup> inferior demidato obovato lacini altera  
petiolo puberuloa interdum extus lacinia cuneata  
pinnis utraque ternis obovatis basi altero latere angust.  
ribus obliquis crenatis venosis glabris. Semina villosa  
unicana

conf. Colum. Ephr.

anifum P. foliis radicalibus trifidis incisus Lin L. V

Anifum vulgare Clus. hist. 2. p. 202.

Anifum herbarius Bauh. pin. 159.

13. Cuminum semine rotundioris et minoris Bauh. pin. 146.

Habitat in Ogypto &

Caulis pedalis et ultra ramis vellos conispermis folia inferiora  
pennata, pinnis obovatis dentato <sup>profundis</sup> incisus superiora multijuga  
summa trifida linearia. In involucriis foliis laesore unico  
germina vellosa iniana semine glabra

glauca P. foliis supraeae compositis, caule angulato ramosissimo Lin. l. V  
Trugofelenum caule crasso, sulcato, divaricato, foliis multifido capil  
lombis Hall. hist. n. 788

Habitat in Helvetia, Gallia Italia  
Caulei foratus Dodrantali et ultra, glaber. Folio bipinnato, <sup>in finis subtinua</sup> <sub>natis</sub>  
filiformibus trifido. Vaginae fructu longa umbello capite primo

\_\_\_\_\_ pennis capillaceis

adde Syn. ex Hall.

capensis Pimp. foliis supradecompositis: laciniis acutis, caule striato  
Thunb. prod. fl. Cap. pag. 51.  
Habitat in Cap. b. spec.

*Lechotoma Pimpinella* pedunculis oppositi foliis, foliis floriferis bitrifidis, pediculis alba  
do membranaceis Lin. Mant. 50. \*S.V. pag. 291.

Habitat in Hispania

Planta semipedalis, ramifera, dichotoma. Folia inferiora biternata, superiora  
biternata, fere linearia, breviora, acuta. Pediculis utrinque auctis mem-  
brana latiore quam in reliquis, plane membranacea, alba. Pedunculis  
oppositi foliis, foliis multo longioribus, ex omnibus alis singulis, unde con-  
spici. Umbella universalis radii 5-6. Petala alba, incurvo-emarginata  
Tubus subglobosi striati. Lin. M. l. c.

Rami apice in pedunculis tribus divisi, caulis angula-  
tus striatus

caule dichotomo angulato umbellis lateralibus  
terminalibusque

*Dioica P. pumila* umbellis numerosissimis compositis simplicibusque Lin. L. V.

*Seseli pumilum montanum* Clus. hist. 2. p. 266

*Pimpinella pumila* Jacq. fl. austr. 4. 20. Mant. ha. 357. \*

*Daucus montanus multifido folio, feleni semine* Bauh. pin. 180

*Seseli pumilum*: petioli ramiferi membranacei oblongi integri: foliis ternatis lineantibus subcarinosis petioli longitudine Lin. Spec. pl.

pag. 375

Habitat in Austria, Gallo-provincia

*Dioica Pimpinella* umbellis numerosissimis compositis simplicibusque, floribus.

*Dioica* Hort. kew. 1. p. 364

Radix superne setosa caules plures fruticulosi ramosi paucis, foliis  
superioribus angulatis glabris parum foliatis. Folia ternata, bitermata  
pinnata et bipinnata pinnis oppositis trifidis lineantibus brevibus  
umbellae terminales et laterales saepe opposita terminales  
terno

Planta sub hoc nomine a Quercis data diversa videtur forte quod junior vel  
ex loco alieno. folia trifida <sup>la. obtusata</sup> lateralia intermedia utrum trifida

*Seseli pumilum* petioli ramiferi membranacei oblongi integri: foliis  
ternatis lineantibus subcarinosis petioli longitudine Lin. Spec. pl. pag.



202 { *Pimpinella hngitana* semine rugosa Pluken. alt. 296  
4ui { *Pimpinella sanguisorba* minor semine majore et casside  
Caulis ramosus, angulatus, glaber

*Pimp. enocarper* Martk  
*austriaca* Mill. a magna pama diversa