Piſcidia

1. Erythrina P. foliolis oblongis
2. carthaginenſis P. foliolis obovatis

punicea Piscidia foliis pinnatis: foliolis oblongis ovatis leguminibus pendulis caule fruticoso Cavan. Ic. vol. 4. pag. 8. tab. 316.
Habitat in America calidiore ♄

+ Erythrina P. foliolis ~~ovato~~ oblongis Lin. S. V. Sw. obs: pag. 276 +

Pseudoacacia siliquis alatis Plum. spec: 19. ic: 233. fig. 2.

Coral arbor polyphylla, non spinosa fraxini folio, siliqua alis foliaceis extantibus rotæ molendinariæ fluviatilis æmula

Sloan. hist 2. p. 39. t. 176. fig. 4. 5:

Habitat in america calidiore

Rami teretes cortice fusco albido punctato, glabro. folia pinna ta cum impari 4 juga. foliola opposita, petiolata, oblon go-extrorsum majora ~~?~~ sipollicaria vel paruum ultra supra ~~?~~ folii tenues glabra subtus: tenuiter pubescentia. Racemi ex axillis ulti mis et terminales solitarii thyrsoidei ramulis decussatis flores pedunculati, numerosi majusculi Calyx cyathifor mis 5 fidus. cucullatus Vexillum subrotundum. alæ ovatæ. Legu men pedicellatum, membranaceum compressum ~~?~~, qua drifariè alatum, uniloculare isthmis ~~interceptum~~ distinctum

Plum. non huic pertinere videtur cum racemus simplex et flores habeat diversos faciè Erythrinæ ad insequentem vel ~~?~~ pertinet

Specimen aliud a Dn West missum parum aliter se habet diversum tamen non credo

Foliolola ovata vel lanceolato elliptica supra glabra subtus sericea mucrone villoso terminata. Racemus erectus pedalis compositus pedunculis partialibus sparsis. Vexillum extus a pilis tenuissimis sericeum

2 Carthaginensis foliolis obovatis

Phaseolis accedens coral arbor polyphyllos; foliis duriorbus non spinosa Plukn. alm. 293. t. 214. fig. 4.

Habitat in America calidiore ♄

habitus priori at omnia duplo majora. foliola obverse ovata cuspide cum acumine.

non vidi