

Pistacia

1. trifolia P. foliis subternatis impari maximo simplicibus
2. narbonensis P. foliis ternatis pinnatisque suborbiculatis impari ma
3. vera P. <sup>foliis</sup> impari pinnatis: foliolis subovatis recurvis
4. terebinthus P. foliis impari pinnatis: foliolis ovato lanceolatis
5. lentiscus P. foliis abrupte pinnatis: foliolis lanceolatis

Cappadocica Pistacia

Habitat in Cappadocia herb. Turc.

Folia pinnata cum impari quaterna vel sena, vel cum impari quanta  
foliola opposita, sessile bipollicaria, acuta, supra nitida, mucronata  
obsoletè venosa.



*microphylla* Pistacia folus impari pinnatis, petioli alati

Habitat in monte vides Commes. herb. Guss. <sup>1 puga</sup>

Caulis fruticifex, glaber. Folio pinnata, 3-<sup>puga</sup>, 8 puga in ramis sterilibus. Folio  
la opposita, unguiculata, biplica, lanceolata, utrinque acuta, integerrima  
glabra, subtus magne villosa. Petiolus articulatus. Racemi axillares, solitarii  
folio breviores.

1. *Trifolia* P. foliis subter oratis simplicibusque Lin. Spec. pl. pag. 1452 t. V

pag  
*Pistacia* mas siculum, foliis nigricante Boed. mus. 2. p. 139. t. 93.

*Terebinthus* f. *Pistacia* trifolia Tournef. G. R. 4. 500

Habitat in Sicilia &

Rami & caetera punctati. Folia petiolata sessilia alterna. Folia  
plerumque terna lateraliter obovato-subrotunda acuminata  
ta mucronata subsessilia basi acuta sesqui pollicaria. Termina  
le triplo vel quadruplo majus, per petiolum parum decurrens  
ovatum: omnia glabra, integerrima nervosa venosa.

terminali maximo

Folia simplicia terna vel quaterna, subrotunda vel oblonga bi vel  
tri pollicaria, venosa herb. Tur.

foemina simili modo in omnibus



2 *carbonensis* P. foliis pinnatis ternatisque suborbiculatis Lin. S.V. p.  
*Terebrathus peregrina*, fructu fragore pistacii simili eduli Bauh.  
pin. 400

*Terebrathus indica major*, fructu rotundo Bauh. hist. 1. p. 277  
B. *Terebrathus major*, Pistacia folio Lobel. adv. 412.  
Habitat Mospelii, in Persia, Mesopotamia, Armenia &  
Rami teretes glabri. Folia petiolata alterna, pinnata, uni f. bi  
parya: foliola opposita, sub vel alterna subsoplia interdum  
oblonga, mucronata nervosa glabra subtus pallidiora sesqui  
pollicaria Integerrima, Verminali Duplo major.

Verminali major

Folia ternata quatuorve pinnata: suprema interdum simpli  
cia, ovata vel ovalis, saepe emarginata venoso reticulata, tri pollicia  
rara ut in trifoliata herb. Juss.

Differentia specifica in ad veram pertinere, uti P. vero huc  
spectat ex observat. Bauh.

flores in specimen de pin

7 vera P. foliis impari pennatis: foliolis subovatis recurvis Lin. l. v. pag

Terebinthus india Theophrasti, Pistacia Scopiondi Lob. adv. p. 413.

Pistacia pergrana, fructu racemoso f. Terebinthina india Bauh.

pin. 401.

Pistacia Bauh. hist. 1. p. 275.

Habitat in Persia, Arabia, Syria, India &

similis marbonensi figura magnitudine venisque foliorum. Folium  
interdum ternis. Petiolus super planus Guss. herb. an spec. Guss. marbon.



9. Terebinthus P. foliis imparipinnatis: foliolis ovato-lanceolatis Lin.  
A.V.

Terebinthus Clus. hort. p. 15. Dod. pempt. 871.

Terebinthus vulgani Bauh. pin. 400

Habitat in Europa Australi et Barbaria 5

Rami verides glabri: folia 3-4 juga: foliola opposita vel altera  
na subpetiolata, <sup>interdum</sup> lanceolata ovata mucronata venosa subtus  
pallidiora bipolliciana, parvum et terminale parum minor  
Amenta masculina <sup>ut et feminae</sup> ramosa latera a gemma diversa a foliis  
femineum laterale. fructus paniculatus magnitudine vel pesi.

5 *Lentifolius* P. foliis abrupte pennatis: foliolis lanceolatis Lin. 1. V. pag

*Lentifolius* Clus. hist. 1. p. 14. Dod. pempt. 171.

*Lentifolius vulgaris* Bauh. pin. 399.

Habitat in Hispania, Lusitania, Italia, <sup>foliolum</sup> Palaestina,

Tota glabra. Rami teretes. folia quadrangula <sup>foliolum</sup> saepe unicum impar  
a latere apicis, sessilia, alterna obfusca mucronata arena  
pollucaria vel ultra petiolum <sup>compresso</sup> subulata alterna in dente  
Sed pro insertione folii amento axilla non simplicia?



oleosa *Pistacia folii pennati* cum <sup>in</sup> pinnis abrupteque pennatis, foliolo ovato-lanceolatis

Cusjambum Roxb. Amb. Lib. 1. 1. 47. Tab. 37.

*Pistacia* *Aspinoki* Hemph. Am. Ex. pag. 812?

Habitat in Cochinchina

Arbor foliis 2-3 pinnis. foliola integerrima, opposita, interdum  
parva, glabra. amenta lateralia masculina filiformia. Intra  
semi pollicari, subrotunda scabra, lutea. nucleo cori uniloculari

Differens *Pistacia* *manica*  
non vidi

peregrina P.

*Teribinthus peregrina* fructu minore et coenobes eduli F. Bank. 400

Habitat • Herb. Guss. 5

Folia simplicia, ternis quinatisque pennata: foliola oblonga, vili-  
cana utrinque glabra



Unpolana

Cappadocia Pest.

Habitat in Cappadocia Leb. Huf.  
Foliola lanceolata, subbipollicana



Präsidenten