

ca
1. Plant. mantina minima ^{gramineae foliis rigido}
Linnæus mant. min. Pantago
caespit. op.

2. Plant. hispan. foliis crispis et rigido
Folii aggregati etiam plures basi laciniati

90/ 3. Plant. angustifolia patricula Linnæus, species ex parte
+ scapo nudo

1. major. P. foliis ovatis subdenticulatis glabrisve septem nerviis, spica cylindrica
imbricata, scapo.

2. maxima P. foliis ovatis subdenticulatis pubescentibus, spica novem nerviis spica
cylindrica imbricata, scapo tereti?

3. asatica P. foliis ovatis glabris, spica flosculis distinctis, scapo angulato
imbricata

4. media P. foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica scapo
tereti

5. virginica P. foliis lanceolato-ovatis pubescentibus, spica cylindrica floribus
remotis, scapo tereti

6. altissima P. foliis lanceolatis quinque nerviis dentatis glabris, spica oblonga
cylindrica, scapo angulato

7. lanceolata P. foliis lanceolatis, spica subrotunda nuda, scapo angulato

8. *Lupatanea* P. foliis lato-lanceolatis in nervis subdentatis subpilis, spica oblonga hirsuta, scape angulato.
9. *Lagopus* P. foliis lanceolatis subventiculatis, spica ovata hirsuta scape tereti.
10. *alpina* P. foliis linearibus planis, spica oblonga, scape tereti hirsuto
11. *albicans* P. foliis linearibus lanceolatis obliquis villosis nigris, spica cylindrica erecta, scape tereti lana tomentosa
12. *Cretica* P. foliis linearibus sublanatis, scape tereti brevissimo lanatis, spica subrotunda.
13. *Bellardi* P. foliis linearibus lanceolatis, spica ovata, scape tereti hirsuto brevissimo.
14. *mantina* P. foliis semicylindricis erecta basi lanatis, spica imbricata erecta scape tereti.
15. *nutans* P. foliis subulatis, scape tereti altilibus, spica imbricata cylindrica pendula nutante
16. *interupta* P. foliis subulatis hirsutis, scape tereti brevibus, spica cylindrica, floribus remotis

18. incurvata P. foliis linearibus subulatis canaliculatis recurvatis punctatis
denticulatis scapo tereti

17. subulata P. foliis subulatis triquetris scabri, scapo tereti

19. Loefflingii P. foliis linearibus subdentatis, spica ovata, bracteis carnatis
membranaceis, scapo tereti

20. ferraria P. foliis lanceolatis quinque nervis dentato- serratis, scapo tereti

21. coronopifolia P. foliis linearibus dentatis, scapo tereti

22. cornuti P. foliis pennatis; pinnis inaequalibus distantibus subdentatis, scapo
tereti

23. macrochera P. foliis spatulatis inciso dentatis: dentibus imbricatis margine
cristatis mucronatis, scapo tereti piloso

44 caule ramoso

24. psyllium P. caule herbaceo, foliis subdentatis recurvatis, capitulis aphyllis

25. asra P. caule fruticoso, foliis lanceolatis dentatis, capitulis aphyllis

26. cynops P. caule suffruticoso, foliis feliiformibus integerrimis & nitidis
capitulis foliosis

27. indicia P. caule herbaceo, foliis linearibus reflexis inferne ciliatis, capita-
lis foliosis

20. pumila P. caule herbaceo foliis filiformibus carnosis glabris,
 29. squarrosa P. caule herbaceo decumbentibus pubescentibus, foliis lineari-
 Capitulis bracteis attenuatis elongatis squarrosi

Dedit
 Desfont
 herb
 Desfont

- 1 microrhyncha a deserto. Scapi plures. Folia pollicaria aggregata
- 2 mayellana a Rada crassitie digiti minimi. Folia lanceolata compollicaria
 sub extata. Flores pauci in capitulo parvo No 1
3. e fet. mayell. folia pollicaria, linearia, integerrima. Scapi plures folio brevioribus No 2.
4. mayell. Rad. superne dursy, crassitie digiti min.: Sol. linear. 2 pollic. integ. acuta, glabra
 Scapi fol. parva long. subultra: Spica cylindrica No 3.
5. Cucul lata parva Pl. maxima. Scapi striati villosi spica
 cylindrica fere spithamea. Folia ovato-oblonga, spithamea 9 ner
 via, integerrima vel deute uno altero.
- 6 sp heriophala: Folia lanceolata, acuta, integerrima villosa, 5 ner
 via, pollicaria. Scapi plures palmari, bracteis villosi, superne incani
 Capitulum ovato oblongum. Bracteis ovatis acuta
- 7 Helostemum utriusque altatum Bracteis par. Scapi hospitiis sum ex
 herb. may.

Characteri omnium specierum adhuc emendandi a

26 Eynops l. caule ramoso suffruticoso, foliis integerrimis filiformibus striatis, capitulis
foliosis. Lin. Spec. pl. pag. 1674

Phyllium majus superum Bauh. pin. 191. Bauh. hist. 3. p. 513.

Phyllium sempervirens Monf. hist. 3. p. 262. f. p. t. 17. fig. 1.

Habitat in galloprovincia, Italia ~~et~~ 5

Caulis palmans, durus, basi lignosus pilosus, purpurea fere superne nudus.

Folia opposita subulata linear lanceolata ut in precedente ad longiora
et ^{maximè} ^{mate} ^{mate} vel filiformia canaliculata ⁱⁿ ^{quæ} ^{tra} ^{erecta} subulosa. Pedunculi
ei axillares longitudine foliorum. Capituli squama infima ovata
basi ciliata in acumine longo productis longitudine fere capituli
patula. Bractea inter flores ovata, concava

1516
23

Plantago foliis spatulatis ²dentatis in ¹se, dentibus imbricatis mucronatis
scapo tereti piloso, bracteis ovatis acuminatis
Coronopus scissus, fruticosus, platyphyllos Bot. plant. rarior. pag. 30.
tab. 15. fig. 2. Monf. hist. 3. p. 261. f. 8. tab. 17. fig. 36.

Plantago macrocheira foliis spatulatis serratis subnudis, spica
cylindrica Poir. d. 2. pag. 154.

Legi ad vias Tureti

Folia radicalia, in rosetam expansa, pollicaria, inferne sesquivalva
angustata, crassa, utrinque hirsuta, mucronata, densim serrata
dentata; dentibus ovatis utrinque 3-5 imbricatis, mucronatis,
margine inaequalis.

Scapus ascendens, palmatis vel ultro, pilis densis adpressis hirsutus
Spica cylindrica, hirsuta, bipollicaris et ultra.

Bracteis ovatis, acuminatis, apice patentibus, dorso purpureo
purae, margine membranaceo, setis hirsutis.

Calycis ^{caerulei} ~~foliata~~ ^{caerulei} ~~duae~~ ^{caerulei} ~~exterior~~ ^{caerulei} ~~hirsuta~~ : interiores converso
ciliato, concavo

A Coronopo maritimo Raimondet: Bank. hist. pl. 3. pag. 511. non
diversam esse putat Raimondet

in thymis Desfont
herb. Tur.

menuta P.

Pallas X.

gracilis P

Port. d.

Dantata P.

Roth. fl. Germ.

argentea P. foliis linearis lanceolatis villosissimis integerrimis, specie oblonga
^{peloponnesi pubescentibus villosis}
Plantago angustifolia, argentea, e rupe victoria Tournef. 127.

Plantago foliis linearis lanceolatis pubescentibus, specie subrotunda
nuda, scapo subangulato foliis longiore. Ger. fl. gal. Prop. pag
333. fig. 12. Vill. fl. Delph. 2. pag 301.

Plantago argentea

Vill.

Habitat in rupe victoria 4

Habitus P. lanceolata. folia ^{nitida} spithamea basi ^{nitida} apprimis ^{nitida} albemulax
pelli ^{albis} copioso ^{utrinque} tacta ^{utrinque} pinnis nervis. Scapi erecti folio alto
si ^{si} superiore terete inferiore obsolete angulati: specie subrotun
da tandem oblonga bracteae ovato. Dorsum et marginem pelis non
nulli albi utrumque glabro

Plantago

1010. Bellardi Plantago foliis linearibus, lanceolatis, pubescentibus, scapo tereti hirsuto altioribus, spica ovata erecta, bracteis lanceolatis

Holosteum salmanticum pepallum anouum Griseb viend in Ray Syllog
fl. exst. Brit. pag. 302. Sede Herbarii Pet. veniani

Plantago Bellardi: pubescens foliis sublinearibus planis petiolo tereti, scapo tereti foliorum longitudine spica cylindrica All.
fl. Pedem. p. n. 300. tab. 85. fig. 3.

Plantago angusti
folia minora Shradde
herb. Vahl.
hinc valde familis

Legi passim in aridis Turceti, passim et Roma
Planta parva, saepe vix pollicaris, interdum sesqui pollicaris
folia radicalia, plura, linear-lanceolata, acuta, inferne at
tenuata, obscure trinervia. interdum acutior
scapus erectus, foliis majoribus brevior, valde hirsutus: hirsutie
sordida.

P. pilosa Porr.
holostea La Monte

Spica ovata, vel ovato-oblonga, hirsuta longitudine dimidia superi
bracteis lanceolatis, attenuatis, longitudine calycis
corolla laciniis lanceolatis.

11 albicans P. foliis lanceolatis obliquis villosis, spica cylindrica erecta, scapitate Lea J. ✓
Baron. v. 2. p. pag 21. Tab. 124 fig. haud optima

Holosteum palmaticorne majus Claf. hist. 2. p. 110
Holosteum hirsutum albicans majus Bauh. pin. 190

Plantago cylindrica; foliis linearibus utraque hirsutis, spicis cylindricis
subcylindricis, corollis lanceolatis & c. Desf. p. 31.

13 Holosteum hirsutum albicans minus Bauh. pin. 190

Habitat in Hispania et Nordonia andis ?

Folia linear-lanceolata lana tomento incana molli utraque incana,
fove longitudine scapi inferne angustata, interdum undulata. Scapus
digitalis palmari et ultra tomentosus sericeus. Spica cylindrica lon-
gitudine scapi recta vel ^{subrotunda} ~~patens~~ ^{patens} ~~patens~~ ^{patens} incurvata. Bractea oblongo
margine ^{lato} membranaceo pilisque longis uti canno lacrimarum calycis ciliat.
state evascentes, ceterum glabra

lanato tomentosa
bractei obtusissimi

arborescens.

173. Cretica P. foliis linearibus, scapo verti brevissimo lanato, spica subrotunda nutante Lin.

L.V.

Leontopodium creticum Clus. hist. 2. p. 11.

Holosticum s. Leontopodium creticum Bauh. pin. 140

Plantago cretica minima tomentosa, caule diviso Tournef. corol. 5.

Plantago decumbens; foliis linearibus, superne hispitis; scapi decumbentibus, vellosi; spica ovata, pectatis Boiss. Desf. p. 30

Habitat in Creta

folia sublanata profertur subtus, scapo longiora utrinque attenuata. Scapus digitalis
spica brevi ^{ovata} late ovata, membranaceo excepto dorso linea lanceolata vis
acutiusculis
non ciliatis
lacinae corollae oblongae.
variat foliis latioribus hispitis et angustioribus glabrioribus, integerrimis vel
subdentatis saepe in eadem planta

foliis que linearibus sublanatis

bracteis mucronatis acutiusculis

scapus basi hirsutissimus herb. 4.

verte

Plantago cretica altera. Folia lanceolata, uninerviata, exilis, ^{panem} inferius ^{minora} la-
tiora, sive obtusa. Spica obtusa. Bractea ovata — Pediculus

8 Lusitanica. P. foliis lato-lanceolatis trinerviis subdentatis subulosis, spica oblonga hirsuta, scapo angulato. Len. spec. pl. 1667. t. 26. pag. 155.

Plantago trinervis latifolia minor incana hispanica Barr. var. Leon. 745
Habitat in Hispania &

~~Tolia erecta palmata latior quam in P. media. Scapi foliis longioribus, subhirsuti quinquifolciati. Spica oblonga, bracteis brevibus hirsutis. Corolla alba, stria flavescente. Stamina alba. Stylus elongatus pubescens, albus~~

~~in mea folia lanceolata, bracteis lanceolatis et non figura Bauh. folia in figura Barr: facis Pl. medio minori~~

Tolia erecta palmata latior quam Pl. medio scapi foliis longioribus subhirsutis quinquifolciati. Spica longioribus oblonga. bracteis brevibus hirsutis. Corolla alba stria flavescente. Stylus pubescens albus hirsutus

foliis ovatis lanceolatis ovatis

Lagopus *P. folis lanceolatis subdenticulatis, spica ovata hirsuta, seapio tereti* Lin. Sp. pl. p. 165. * ^{subcylindrica}

Plantago Catananica Raw. An. 4. t. 6

Plantago angustifolia, paniculis lagopi Bauh. pin. 109, prodr. 98. Monf. her. 3. f. 8. 7.
16. fey. 13.

Habitat in Gallia Narbonensi, Hispania Lusitania

Folia ternaria subtus pubescentia, apice denticulusque obsolete fusca.

Si capus teres, spica ^{sub}globosa. Calycibus hirsutis. Corollis limbo caribus
in mea folia ternaria spica ^{parvum} in junioribus ovata in adultiori

demum uti et in cultis et spontaneis sub cylindrica pollicia
no. Bauhini Descript. cum mea planta optime consentit

6 altissima P. foliis lanceolatis quinque nervis dentatis glabris, spica oblonga cylindrica
scapo subangulato Lin. Spec. pl. pag. 164

Plantago montana, crasso glabro canaliculato tenuiorque folio, profundissime
radicata Tull. pag. 146.

Habitat in Italia

Folia sesquipedalia, utrinque attenuata, obtuse remote ^{spine} dentata, crassa
scapus ~~subangulatus~~ striatus tripedalis. Spica cylindrica longa, crassitie
fere digiti minoris. Bractea ovata membranacea. Calycis lacinae oblongae
obtusae glabrae. Lacinae corollae ovatae acuminatae styliis. Corolla triplo longior
villosa

5 virginica P. foliis lanceolatis ovatis pubescentibus, spica cylindrica, spicis floribus
remotis, scapo tereti

Plantago myosotis f. trinerviâ hirsuta carolina Raj. hist. 2. p. 100.

Plantago manana, spica protenui pet. gar. 1. 1. 1. fig. 10

Plantago media incana virginiana, semotis foliis, annua Monf. hist. 3. p. 259.
f. v. tab. 15. fig. v.

Habitat in Virginia. C

Dolcia lanceolata basi attenuata angustiora quam in media, remote subdenti-
culata. Scapus pilosus foliis dimidio longior. Spica cylindrica tenuis
flores distincti. Vincta lanceolata longitudine calycis. Lacinae calycis
oblongae obtusae. Lacinae corollae lanceolatae calyce duplo longiores

Canata P.

Por. 2 -

ovata P.

Forsk.

11 alpina P. foliis linearibus planis, scapo tereti hispido, spica oblonga erecta Lin. spec. pl. p. 165.

L.V.

Hort. 2. 4. 125

Holostemum hirsutum nigricans Bauh. pin. 196

Plantago

Hall.

Habitat in Helvetia et Austria alpebus ?
Scapus hirsutus, spica ante florentiam cernua. Folia subtus convexa
lin.

foliis linearibus attenuatis remote subdentatis spica
oblonga erecta bracteis ovatis acutis margine membranacea
cei

folia in meo scapo breviora subtus hispida. bracteo lato
e margine lato membranaceo ovata glabulis basi
nilius ongo hispida.

Dullis f.

cespitosa P. foliis linearibus subdentatis, scapo teretibus pilosolongioribus
spica oblonga, bracteis ovatis obtusifoliis

Habitat in Gronlandia 7

Planta cespitosa folia digitalia linearia glabra remote subdentata basi
lanata scapo primum longiora scapulis erectis. Teretes pilis
adpressis adpressis. Spicae cernitae 10-12 flora bracteis ovatis
obtusifoliis ~~lae~~ margine minuto membranaceae lacinae
corollae lanicolatae filamenta corollae longiora
- facies P. alpina an varietas mantima diversa spica

~~Cucurbita O. foliis obovatis pedunculis verticillatis in trifloris capulis pedunculatis hirsutis~~
~~foliis obovatis caule repente piloso~~

~~Habitat in India orientali~~

~~Radix peploidis et caulis pubescens foliis non exaristatis folia trineuria
flora verticillati~~

varietas peploidis

14 *mentha* P. foliis semicylindraceis integerrimis basi lanatis scapitenti Lin. Sp. pl. p. 166.
L.V. Fl. Dan. t. 243

Coronopus maritimus major Bauh. pin. 190

Plantago scapo spicata, foliis linearibus subtus convexis fl. cap. 63. tab. off.

163.
Habitat in littoribus maritimis Europa, America borealis &

Folia supra plana subtus convexa, glabra, scapo ^{dimidio} breviora. Scapus digitalis vel palmari
mani saepe ascendens, pilis minutis adpressis rarioribus opperui. Specimen
cylindricum pollicari et ultra. Flores umbicati, bractea ovata glabra. Lacinia
calycis oblonga margine membranacea

glabris

17 *subulata* P. foliis subulatis Inquetis striatis scabris, Scapodictis lin. spec. pl. p. 166 + 1. V

Jaqu. collect. 1. p. 204. Tab. 10

Serpentina omnium minima Lob. ii. 439.

Holosteum, striatissimo folio, minus Bauh. pin. 191.

18. Holosteum maspleense Bauh. pin. 190.

Habitat in maritimis mediterranei arenosis & in montosis Navarra

Radix crassa magna radione planta superne divisa squamis ovatis perigenis.

Folia ^{filiformi subulata} pl. copiosa basi pilosissima margine ciliis remotis minutis Scapodictis

dic breviora curvata. Scapi plures ex singulo ramo radice ^{digitatis} pilis minutis

adpressis. Spica cylindrica Scapodictis brevior. Bractea ovata acumini

nato cavo, ciliata. Corolla Cassiniana calycis ciliata

~~spontanea~~ ^{ornat} ~~quod~~ foliis pilosioribus et glabrioribus

Plantago recurvata, foliis linearibus canaliculatis recurvatis nudis
lin. mant. 190

15 rubans P. foliis subulatis sicpotenti altioribus, spica cylindrica pendula
bracteis canicollatis attenuatis
Habitat.
Tace plant. manthmo. capo pelops. Spica sesqui pollicari. Bractea
ovato sive canicollata fusca glabra.

sub nomine recurvato in herb. si revera len. recurv. est distincta est
a subulata

recurvata P. foliis linearifutulatis canaliculatis recurvatis punctatis denticulatis sicapo Veret.
Murr. in Com. Gött. 1780 p. 197 b.
Habitat.

a subulata forte non diversa

michi ignota

16 interrupta. ^{inferioribus} foliis subulatis crispatis, scapo tereti brevioribus. Floribus remo-

40

Habitat

^{villoso conciscentia}
Culta pedalis folia angusta. Flores inferiores remotiores superiores
magis approximati bracteis lanceolatis cavo pilosiusculis

crispifolia P

Loth.

14 Loefflingii P foliis linearibus subdentatis, scapo tereti surca ovata, bracteis carinatis
membranaceis Loeffl. d. 1247 Spec. pl. p. 167 ^{f. v. p.} Jacq. herb. 2. p. 126

Plantago maritima Pet. herb. 3. fig. 9. Raj. angl. 3. p. 315.

Habitat in Hispania collibus, agrorumque marginibus ☉

Folia linearia parte dentata. Capus pilosus. Flores rari umbellati, bracteis
glabri navicularibus. Stamina breviora quam in coronis calycis circum-
ferentia corollaeque magis fusca

24 Squarrosa P. herbacea, caulebus ramulosis diffusis delumbentibus, foliis linearibus integerrimis, Capitulis squarosis Murr. in Com. Gott. 1701. p. 30. I. V. p. 156

Plantago aegyptiaca, caule ramofo herbaceo, foliis integerrimis villosis, spica soliofissima laxa, calycinis foliis aequalibus Jacq. Coll. 1. p. 45

Habitat in aegypto

Caulis pubescenti subnigricans. Bractea lanceolata valde attenuata
inprimis inferior longitudine fere capituli patentissima villosa
subnigricans. Capitula oblonga

20 pumila P. caule ramoso herbaceo, foliis integerrimis carnosis, ramis laevibus Lin. Suppl
p. 125

Plantago exigua caule ramoso herbaceo, foliis subulatis integerrimis, capitulis folio
si Murr. in Com. Gott. 1770 p. 94. 45

Habitat in Europa australi O

affinis india. Caulis digitalis opposite ramosus totus glaber. ^{superne pilosus} rami filii
formes ^{prosp} li cuspida. Folia filiformia remota interstitiis longiora
aque saepe quatuor. Pedunculi ad apicem filiformes folio breviores. Capi
tula magnitudine pupi. Bractea omnes canaliculata acuminata
pilosus ciliato floretis longioris. Pistilla longa

purpurascens
villosi

filiformibus.

27 indica P caule ramoso herbaceo, foliis integerrimis reflexis ciliatis, capitulis
foliis Lin. T. V. p. 156 + Spec. pl. p. 167 +

+ Plantago indica caule ramoso herbaceo, foliis linearibus subintegris, capitulis
foliis Murr. in Conn. got. 1770. p. 96

+ Halim. Alp. Aegypt. 120:

Habitat in Aegypto O

Caulis palmatis ramosus rami oppositi simplicis semi ascendentes. Folia
linearia remota internodiis longiora carnosiuscula basi inferne
ciliata suprema saepe terrena. Pedunculi est axillis ultimis appropi-
matis oppositi foliis longioris. Squamae quatuor inferos capituli
lanceolatae, basi dilatatae, glabra margine non ciliata capitulo longio-
ra capitula parva minora quam in antecedente. Bractea inter floren-
los cuneiformes retusa, concava latenter dilatata

Synon. Alpini potius ad squarrosam pertinet

25 agra P caule ramoso fruticoso, foliis lanceolatis dentatis, capitulis aphyllis Lin. Spe
pl. pag. 168+

Phylleum foliis laciniatis Boiss. juv. p. t. 7. fig. 13

Phylleum, foliis crenatis, indicum Bauh. pin. 99. pen. 191. Bauh. hist. 3. p. 513.
monf. hist. 3. p. 262. f. p. t. 19. fig. 4.

Habitat in Sicilia, Barbaria ^{et} ^{insularibus} ^{partibus} ^{topi} ^{lynotij}. ^{pedalis} ⁱⁿ ^{primis} ^{superne}.

Raues interdum plures inferne ^{ramosi} ^{pilosi}. Folia linear-lanceolata
remot. proliuare, cum rudimentis foliaceis ex omnibus axillis, demote
dentata basi profertim margine piloso ciliato, exserto patula

Peduncululi ^{oppositi} ex axillis supremis foliis longioribus, filiformes pilosi.

capitula subrotunda magnitudine pisi majoris. bractea lanceolata
acuminato pilosa. margine nono membranacea longitudine corollae

calycis laciniis oblonga curvo subinflata. Petal. Corolla laciniis
ovato mucrone terminata

superne villosi
v. f. d. v.

25 pphyllum P. caule ramoso herbaceo, foliis subdentatis recurvatis, capitulis aphyllis Lin. Spec.
pl: pag. 1674 S.V.

Phyllum Dod. pempt. 115.

Phyllum majus erectum Bauh. pin. 196.

Habitat in Europa australi; inter segetes ☉

Caules diffusi; villosi. Folia inferiora opposita floralia saepe quaternaria, ver-
sus apicem dentata recurva villosa-vesida. Pedunculi oppositi solita-
rii vel gemini pro ratione foliorum folio longioro. Capitula et reli-
qua ut in afro ^{terna}

20 ^{ria} ~~ferrata~~ P. foliis lanceolatis quinquenerviis dentato-serratis, scapo tereti l. Spec. pl. naz.
1664 S.V.

Plantago apula laciniata bulbosa Col. ceph. t. p. 250. t. 259. Monf. bot. 3. p.
260. f. o. t. 16. fig. 14.

Habitata in Apulia, Barbanza ^{concolorata} in petiolum planum strato
folia scapo dimidio breviora basi angustata, dentibus lanceolatis remotis
argutis. Scapus pubescens digitalis, palmari interdum pedali. Spica
cylindrica bi-vel tripollicari umbriata. Bractea ovata acuminata
margini membranacea. Calycis lacinis carina ciliata ceterum glabro
variat foliis pubescentibus et y glabrioribus

4 Coronopifolia P. foliis linearibus dentatis scapo verti. Lin. L. V. p.

Pl. Dan. t. 272

Herba fella f. Cornu cervinum Dod. pempt. 109

Coronopus sylvestris hesperior. Bauh. pin. 190.

β. Coronopus hortenjis Bauh. pin. 190

Habitat in Europa glareosis

Folia scapo breviora latis dentatis pennatifida. pinnis utrinque duabus
vel tribus superioribus longioribus, lanceatis. Caput radicis lanatum.

Capitulum digitalis pilosus. Specie cylindrica. Bractea ovata acuminata
Calyces pubescentes
Stylus corollae triplo longior pilosus uti calyces

~~dentatis~~ ^{dentatis} subpennatifidis ^{dentibus} lanceolatis
^{integerrimis} remotis bracteis lanceolatis attenuatis

22 Coronati P. foliis pennatis: pennis inaequalibus et distantibus, scapo tereti, stylis longissimis
filamentis brevissimis Gaey. Mesf. 2. p. 351. P. V. p. 156

Habitat

Anno interdum dentato. Scapus superne tomentosus bractea lanceolata
attenuata

Coronopus mantinus minimus Bauh. prod. 90. jun 191

Coronopus neapolitanus Veneti folius Column. Ephr. 150

Plantago Columno foliis bipennatis basi lanatis folioli confluen-
tibus summis denticulatis scapo tereti Gouan. ill. pag 6

an varietas coronopi

Confer. Colum. Ephr. et Gaey. Mesf

Gouani P.

gouani e El tornuti

3 *Apatia* P. foliis ovatis glabris, scapo angulato, spica flosculis distinctis den spici: pl.
nos. 169* Gmel. hb. 4. t. 365

Habitata in China, Sibiria

Folia petiolata palmaria mucronata ~~per~~ ^{basi dentatis} minuto terminata venosa
marginis subdenticulato repanda; petiolus longitudine folii scapus folius
longior striatus glaber. Spica cylindrica longitudine scapi. Flores remoti.
Pistilla ovata margine minime membranacea. Pistilla corolla longiora

major
2 maxima

Pl. foliis ovatis subdenticulatis pubescentibus nervis, spica
cylindrica imbricata, scapo tereti Hort. Kew. 1. p. 151.

Plantago Gmel. p. 4. p. 71. t. 35.

Plantago maxima Jacq. coll. 1. p. 82.

Habitat in Siberia

obscure denticulata
Palmani

Lolium late ovata mucronata. interdum ^{den} 3 cim nervis, petiolata
petioli striati. Scopus striatus foliis longior sesquipedales.
~~angulatis~~. Bractes subulatae. Caudis corolla membranacea spica
3-4 pollicans. Spica saepe 5 pollicans. filamenta longissima

1. major P. foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis in h. l. V. p. Gmel. p. 6
4. t. 35. 36

Plantago major Cam. epist. 261.

Plantago ~~ma~~ latifolia sinuata Bauh. pin. 109

B. Plantago latifolia glabra minor Bauh. pin. 109

V. Plantago latifolia rosea, floribus quasi in spica dispositis Bauh. pin. 109.

D. Plantago latifolia, spica multiplici parva Bauh. pin. 109

E. Plantago latifolia rosea, flore expansa Bauh. pin. 109. Mon. f. herb. 3. f. p. tab. 75

fig. 3.

Habitat in Europa et Japonia ad vias &

Solea s. vel r. nervia, rare pi. l. s. s. subinde interdum dente ciliis obfusi dente
ta, palmaria et ultra. Scapus foliis altior.

rosea dignoscitur bracteis obovatis magnis

describitur in herb.

Scapigera

P. foliis lanceolatis integerrimis pedunculis axillaribus
caule altioribus pilosis, capitulis oblongis aphyllis

Habitat rusticus

colui in horto

caulis ascendens cespitibus penno columbino. Folia petiolata
frequentia distantia 5-6 pollicaria basi attenuata. ^{ultima} rari
pilosa, squenervia basi valde attenuata. Pedunculi
axillares pithamoi et ultra angulati. Spica oblonga
aphylla bractea lata subrotunda lacina limbi ovata.

Plantago amplexicaulis caule brevi foliis lanceolatis amplexi-
caulis pilosis floribus speciatim, pedunculis axillaribus
elongatis Lavan. Fe. 2. pag 22. Tab. 125.

~~var~~ varietas Plant. Phyllis

australis P. foliis ovato oblongis obtuse grosse dentatis pinnis scapus
teretibus, floribus imbricatis

Habitat in Capula H. Cruis de West

~~Sicci Plant. latifolia sed fere eadem diem. folia oblonga
basi attenuata ut villosa sive nerva obtuse inaequaliter
dentata super pubescentia, apolliniana. Scapus pro
mou~~

Plantag. latifolia inter Plantag. americanae receptus a
Sloane

albicans Plantago ^{Plantago} foliis lanceolatis obliquis villosis, spica cylindrica erecta,
scapo tereti. h. V. pag. 156

Plantago cylindrica foliis linearibus utrinque hispatis; spica cylindrica
subarrecta; corollis lanceolatis Pors. h. Defor. pag. 31. n. 14

Holosteum monspeliense Rauwolfi herb. flori remoti

29

38
40 39

Capeensis Plant. foliis ellipticis, spicis a floribus distinctis Thunb. prodr fl. Cap. pag 29
Habitat in Cap. b. p. nei

non vid.

cordata Plant. foliis cordatis latissimis subdentatis glabris, spica prolonga, flosculis
imbriatis La Mart. T. E. pag 330
Habitata Canada

sinuata Plant. foliis ovatis sinuato-dentatis glabris petiolis, specie cylindrica
imbricata, capsulis retusis La Mart. T. I. pag 339.
Habitat in insula mauritiana

non vid.

90

Heterophylla Pag. folio pennatis: juniori arboris longissimis aculeosis sub 40 puzis arbo-
ri ad alta latioribus inermibus sub 4 puzis La Mark. T. E. pag 334.

Habitat in Insula Mauritiis

Capsula solitaria membranacea semini fera septum mentis.

pilosa *Plantago folus linearibus hirsutis firmis, spica conica brevi*
Cavan ii: vol. 3. pag. 25 tab. 247 fig. 1
Habitat in Hispania ③

non vidi

Plantago congesta caule suffruticoso patenti, foliis linearibus subulatis patulis villosis, specie ovato-oblonga. fl. Penns. 1. pag. 51. Tab. 89. fig. a

Habitat in collibus Penns.

Caules plures, teretiores, suffruticosi, teretissimi, simplicissimi, in demum
foliis oblongis. corolla congesta, integerrima, patula demum reflexa.
Peduncululi axillares, longissimi, filiformes, parum inflexi, nudi
Bractea ovata, concava. Calyx margine scariosus et corolla lobis
scariosus reflexus. Stamina corolla longiora. femina 2. fl. Penns.

Plantago senecio caule decumbente suffruticoso, foliis linearibus subulatis
incurvis seneciis, spica ovata DC. Peruv. 1. pag. 51. tab. 89. fig. 6.

Habitat in Peruvia collibus altis andis

Respitosa, tomentosa-farinea. Caulis suffruticosus, ramosus, dichotomus, et
in foliorum scabra circuncinctis. Sola congesta, integerrima incurva. Pe-
dunculi axillares, erecti, filiformes, teretes, tomentosi, incani, demum
glabri, ferruginei, foliis triplo longiores. Spica brevis. Semina politana fl.
Peruv.