

# Nectanthus

*inferne*

Cal. 5 pedis. Corolla tingens reflexinata basi retrofractus gibbosis.  
*nectario calcante*

1. fruticosus P. foliis ovatis <sup>ternis</sup> trifidis venoso-nervi venis scabridis; nectario  
pedicellis simplicibus; caule fruticoso.
2. galcatus P. nectario gibboso, pedicellis ramosis, foliis cordato ovatis <sup>ternis</sup> serratis  
acuminatis villosis
3. scutellarioides P. nectario gibboso, foliis ovatis dentato-serratis glabris; pedi-  
cellis ramosis geminatis
4. costeri P. nectario gibboso, foliis ovatis crenatis: crenis emarginatis pedi-  
cellis ramosis
5. dubius P. foliis ovatis serratis subtus nervis, racemis foliatis lateralibus  
pedunculis dichotomo oppositis pedicellis dichotomis
6. villosus P. nectario gibboso, foliis oblongis crenatis tomentosis; pedicellis  
simplicibus; caule fruticoso
7. crassifolius P. nectario gibboso, foliis ovatis dentato crenatis pedicellis  
simplicibus

8. Foskælei P. nectano gibboso, racemis foliis ovatis crenatis vellosissimis, ped:  
cellis simplicibus
9. inflexus P. nectano gibboso, foliis ovatis basi attenuatis dentato-serratis  
glabri
- (7-8) 10. punctatus P. nectano gibboso, floribus spicatis, caule herbaceo hirsuto.

tener *Plectranthus*

Habitat in Java herb. Ruth.

Caules herbarius, simplex, ascendens, pubescens. Folia petiolata, vix peltata  
ovata, ovata, obtusa, crenata, que centis nullis. aliquid. Racemus termi-  
natis. Pedicelli oppositi, interdum ab altero latere unum floris, unicus lon-  
gior, unicus longior 2. floris. Pedunculi pubescentes. Calycis lobum  
inferum elongatum, bifidum: lacini linearis, lacini ovato

crassifolius Plectanthis nectario gibboso, racemis bracteatis, foliis ovatis carnosis.

Ocimum DC) zatakendi. Foliis carnosis rigidis, late ovatis, acutis, crenatis, villosis basi truncatis. Boiss. Desf. pag. 109.

(Differt ab Pl. Boiss. foliis carnosis, bracteis membranaceis ovatis

caulis surgentes sempervirentes petis mollibus adpressis. Petiolus villosus. Folia late ovata subrotunda, villosa mollibus reticulata, venis superne curvis. Dentato-crenata basi truncata bractea ovata lanata verticilli sex flori racemosi labium superius calycis subrotundis: Tubus corollae compressus, basi gibbus, medio refracto supra planus. Labium inferius cymbiforme. Nectarium glandula infra germina

Habita in arabia

15 Folia ovata subhombroidea utraque punctata glabra  
an ocimum punctatum L.


*Plectranthus*

*Germania maculata* La Mark

Habitat herb. Fusf.

Caulis erectus, villosus. Folium breviter petiolata, bipollicaria vel ultra, ovata, vix  
coarctata supra pili rarisissimi, subtus punctis plurimis, obtuse serrata. Corolla  
villosa

*Galeopsis maculata* Hort. Paris



fruticosus P. foliis ovatis biserratis venoso ~~ve~~ <sup>pub</sup> sabugosis scabris, ~~nectario~~  
calicinato caule fruticoso

Plectranthus fruticosus: nectario calicinato, racemi com-  
positi, pedunculis triplicatis, caule fruticoso longato L'Herit.  
Sup. nov. p. 85. tab 41.

Habitat in cap. b. p. 5

Riffinit ex ramosis spinis habitu utriusque fragrans.

Caulis brachiatu cinereus. rami. <sup>trifl</sup> folia petiolata  
late ovata subcordata nervosa venosa bipolliciana vel mino-  
ra dentibus obtusis serratis, subtus venosa reticulata venis  
scabris ~~ven~~ villosis. Racemi terminalis sive terni. verticilli  
sex flori pedicelli filiformes simpliciter longitudine corollae bractea  
oblonga utriusque aucto uti pedicelli villosi.

Galeatus Plectanthus <sup>pediculis gibbosis</sup> Plectanthus  
pedicellis ramosis, foliis cordato-ovatis acuminatis serratis.

Habitat in Guava.

Caulis villosus, sulcatus.

Folia petiolata, late ovata, serrata villosa, prope terminem in venis subtus.

Pedunculis terminalis, pedicellis oppositis ramosis. Bracteis <sup>nullo</sup> ~~sub~~

Corolla pubescentes, labio inferiore galeato ceterum ut in reliquis

( Accedit ad Oc: scutellarioidem Lin. Differt ad cui folia ~~longe~~ <sup>galeata</sup> ova  
Volanticolata, flores minores, bracteaque cordata, ~~peda~~ pedunculi utrin  
que gemini



Scutellarioides l. corollis foliatis pedicellis ramosis Lin. Mart. P4 x L. V. pag 346  
majorana nigra Rumph. amb 5. pag. 291. Tab. 101.

Ocimum Scutellarioides foliis lanceolatis ovatis serratis, racemis verticillatis  
Lin. Spec. pl. P347

Habitat in India

Caulis pubescens. Folia ovata petiolata, obtuse serrata. Petioli  
tenelli valde tomentosi. Racemus erectus longus. Bractea  
cordata sessilis. Calyx minutus. Corolla tubus erectus. Labrum  
superius brevissimum inferius elongatum

Habitus utriusque folia lata dentata grosse serrata serraturis  
integris, venis juniora subtus venis canescentibus  
labris

Placitum

Scutellarioides P

nectans gibboso foliis ovatis dentato serratis, pedicellis ramosis  
utriusque geminis geminatis

Plectranthus

nectans gibboso  
Eosperis P. foliis ovatis crenatis, crenis emarginatis, pedicellis ramosis

Habitat in Insulis maris pacifici

Folia lata femelibus glabra palmata, Calycis fructi glabri corolla  
refracta.

sub nomine Oc: scullanodis com.

*Lutellanoides P.*

Dubius - P. foliis ovatis <sup>serratis</sup> subtus nervosis racemis foliatis lateralibus Pedicellis ducto  
fomes

Habitat in Japonia D. Dahl qui a Thunbergio habuit  
an O. nigropum Kunth.

Caulis villosus ramosus. Folia petiolata, lacinata, bipolliciana obtuse serrata. folium nigropum subpetiolatum parvum sub singulis pedunculato  
lo parviori. Pedicelli terni laterales biflori intermedius  
uniflorus fastigiati.

*Sectucillatum* O. - foliis ovatis obtusis, racemo elongato nudo, floribus verticillato  
quaternis pedunculatis in Suppl. p. 276 & l. v. pag. 545

Habitat in India

Caulis pedalis, totus teris racemo brevior adscendens.  
Folia oppositifolia 5/6 ovata petiolata obtusa, cori  
ferat unis utriusque duabus. Petoli longitudine foliorum  
nerviis exactis herba Congor, nudis feleiformis. Brai  
tea ovata minuta. Calyx campanulatus absque ullo dente  
latiore. Corolla curvata

*Plectranthus* non vid.

nectano gibboso  
villosus P. foliis oblongis crenatis subtomentosis, pedicellis simplicibus caule  
fruticoso

Habitat in Q. b. p. 5

Caulis ramis tetragonis canescentibus. Folia petiolata pollicaria villosa  
et basi subcaneſcentibus. Racemi terminales ramorum palmati  
calyces villosi.

Cosholoe Plectanthis nectaris gibboso, floribus racemis apyhyllis, caule aequali.

Ocymum Haduense; foliis ovatis obtuse crenatis villosis flexilibus; floribus retrofractis. Cossth. descr. pag. 119.

Habitat in montibus Arabis felicis et Madagascaris.

Caulis hirsutus, aequalis, impunctatus.

Folia petiolata, ovata, versus apicem monum approximatedo, <sup>villosa,</sup> obtusissima,

grossè crenata, basi trā transversa, integerrima.

Petiolus folio duplo brevior, basi parum dilatatus.

Racemi semipedales, erecti: verticillis 8-10 floris. Pedicelli filiformes.

Calycis glandiferi sulcati, basi inferne gibbosi: laciniis inferioribus patulis apertis.

Corolla calycis quadruplo longior: tubus parum supra calycem retrofractus, sursum gibbosus.

Specimen a Madagascaris differt villositate majori mollioribus.

Ob florum structuram genere posse distinguere ~~et~~ una cum Zatarhendi, sam sepe vidit Costholoe & Lora Arab. pag. 109 et sequ. quod dein firmavit Cel. G. L. Herodier in Opere proclaro Opere Stir de Stirpiibus novis fascic. quatuor pag. 85. qui sub genere Plectanthis comprehendit Ocyma calycibus non scitellatis, tubo corollae basi refracto sursum in nectarium gibbosum vel calicem productum, filamentis simplicibus. Addit proterea Cossth. in Zatarhendi. glandula in basi tubi. Plures forte species Ocymi huc pertinere

punctatum O. nectario gibbo, floribus spicatis, caule herbaceo hirsuto *Cher*  
*frug. nov. p. 88. tab. 42.*

*Olymum punctatum* foliis ovatis rugosis, caule tereti, floribus spi-  
catis *her. suppl. pag. 275. t. v. p. 545*

Habitat in Alysia O

*Lac. es. pen. minor.* Caulis pedalis, inferne divaricate-ramosus;  
subhispidus, ~~niss~~-punctatus punctis oblongis. Folia petiolata  
ovata serrata, ciliolata, pubesca. Spica pedunculata, bractea  
ovata. Calyx inferius compressus.



inflexus P. foliis ovatis basi attenuatis dentato serratis, glabris  
Habitat in Taponia Dr Dahl qui a Thunbergio habuit  
Caulis herbaceus pubescens.

Specimen imperfectum