

Plumena

1. ~~retusa~~ *P. foliis ovatis-oblongis, petiolis biglandulosis*
2. alba *P. foliis lanceolatis revolutis, pedunculis superne tuberosi*
3. obtusa *P. foliis lanceolatis petiolo subpetiolatis obtusi*
4. pendula *P. foliis oblongis, floribus clausi*
5. exalta *P. foliis lanceolato-oblongis basi angustioribus, pedun-*
culo subdichotomis articulatis

Plumena retusa La Mart. inde off. no 209

retusa herb. de Moench

glabra. Rami teretes. Folia squamulosa subsessili, obovata cuneata, supra
retusa, avenia, subtus remote nervosa. Gynaeceum sessile 3-fidum. Pappus ob-
tus. Corolla unguiculata.

obtus. P. foliis lanceolatis petiolatis obtusis Lin L-V

Plumena flore nudo, foliis brevioribus obtusis Cat. fl. Car. p 93. Plum. ii.

232.

Habitat in Yamaica, herb. 4 usq.

Solia pubescentia

Rami glabri. Solia sparsa 3-4 pollicaria, nitida nervosa obtusa cum
acumine. Pedunculi laterales, apice tripartiti, partales articulati.
Pedicelli alterni vel geminati.

~~non vidi.~~

Pl. convolutus Rumph. ex hoc pertinet

ruba *P. foliis ovato oblongis, petiolis bylanceolatis* Lin. 1-V. Jacq. am
Plumeria flore roseo odoratissimo Tournef. 4R. 41. 659. Cat. b. carol. 2. p. 92
t. 92.

*Clematis arborea americana, laurinis amplissimis foliis, flore lacteo colore
odoratissimo* Pl. hn. Mant. 50 alm. 109. t. 207. fig. 2.

Nerium arborescens, foliis maximis obtusis, flore incarnato Sloan. hist. 2. p. 61.
tab. 105. fig. 1. et tab. 106. fig. 1.

Habitat in Jamaica, Surinamo &c.

Arbor ~~pro~~ procera ramosa. Folia petiolata lanceolata
elliptica spithamea glabra transverse nervosa sub
tus venosa pallidiora. Pedunculi terminales erecti
tomentosi elongati pariter ramosi

— elliptica lanceolata utrinque glabri pedunculati
tomentosi

alba P. foliis lanceolatis revolutis, pedunculis superne tuberosis Lin. S. V
Gauch. amer. t. 174

Apocynum americanum frutescens, longissimo folio, flore albo odoratis
Juss. Comm. hort. 2. p. 47. t. 24.

Plumera flore nives, foliis longis angustis et acuminatis Plum. Jacq. 20. t. 231.

Habitat in Jamaica
Folia petiolata pedali transversim nervosa, justis
inter nervos reticulato venosa. Flores con-
positi pedicelli subramosi brevissimi

carinata Plumieri

Plumiera carinata foliis oblongo-ovatis acuminatis cinnatis, marginibus planis rubris, corollis magnis tricoloribus. Fl. Peruv. 2. pag

21.
Habitat in Peruvia hortis

Arbor quinque orgyali. Rami dichotomi, fragiles, tortuosi, ciliolati

Tricoler Plumiera

Plumiera Tricoler foliis oblongis acutis acuminatisque, marginibus
planis, corollis Tricolonibus H. Penw. 2. pag. 20. tab. 139.

Habitat in Penwio Lottis 5

Arbor Gorgyalis. Rami dichotomi, tortuosi, fragiles, medullosi, crassi, circa
triacati

Lutea Plumiera

Plumiera lutea, foliis oblongo-obovatis acuminatis, corolla luteo
alba Fl. Peruv. 2. pag. 21. Tab. 142.

Habitat in Peruvia horti &

Arbor decem ulnari. Rami teretes, in lottom, fragiles.

folia elliptico lanceolata latiora quam in reliquis

bicolor Plumaria

Plumaria bicolor foliis oblongis acuminatis, marginibus, corolla albo
lutea Habitat in Pe. Penn. 2. pag. 21. tab 141

Habitat in Penna horto 3

Arbor sive ergysle. Rami dichotomi, crassi, medullosi.

purpurea Plumiera

Plumiera purpurea foliis oblongo ovatis, marginibus revolutis, corollis rubris Fl. Peruv. 2. pag. 20. Tab. 137.

Habitat in Peruvia horti.

Arbor 40 pedalis. Rami de horti fragiles, tortuosi, teretes, cicatricati. Folia sparsa, oblongo ovata, integerrima, marginibus parum revoluta, venoso reticulata. Petioli biglandulosi, pollicares. Pedunculi striati multiflori. Flores umbellato cymosi, gemini, pedicellati. Bractea parva, ovata decidua. Calyx minimus, squamatus. Folliculi spithameis, fusco lutescentes. Incolor cui pedunculi & calycis pubescentes, carnati, bractea non nisi varietate. ut enim differunt nisi colore florum

incarnata Plumieria

Plumieria incarnata foliis ovato-oblongis acutis, corollis incarnatis,
disco fulvo. Fl. Peruv.² pag 20. tab. 138.

Habitat in Peruvico horti

Arbor quoad norgalis. Rami dichotomi, tortuosi, fragiles, e casu petri
corum creaturati.

254.
pudica Plumiera floribus limbo laevis Lin. L. V. Gaigu. amer. 37.

Plumiera flore nives, floribus brevibus obtusis Pateff. Car 2 p. 93. & 93. Plum

9c. 232.
~~Elaeagnus Plumier~~ Amb 4 p. 85. & 90?

Habitat

Corolla clausa, ut in Hibisco Malvario, flavescentis odoratissima
arborescens exalta quinquipedalis. Folia oblonga venosa
plures flavescentis.

non vidi

padica Plumeria

Plumeria articulata, foliis ellipticis glabris venosis, apicem ^{sub} ~~sub~~ fasciculatis,
pedunculis articulatis.

Habitat in Guiana non R.Br. 5

Rami glabri, teretes, crassi.

Folia petiolata, versus apicem, 3 parva, elliptica, basin versus sensim
parum angustata, utrinque obtusa, apice parum acuminata,
integerrima, utraque pagina utraque glabra, subtus pallidiora.

Pedunculi universales terminales, saepe gemini: parciales subfasciculati,
interdum tres vel quatuor, interdum octo, flexuosi, articulati: articuli
semper quinque laterales, terminati, superne margine parum dilatati, denticuli
glabri; denticuli plures ad basin singulorum ^{articuli} ~~plures~~, minuti.

Flores alterni, sessiles.

Truncus semipedalis latitudine manus R.Br.

ex celsa P. foliis lanceolato oblongis basi attenuatis, pedunculis
subdichotomis articulatis & lobis

Habita in guiana

Rami cortice cinereo. Folia petiolata sparsa lata exten-
sum dilatata 6-8 pollucina venosa, subtus nervis
costata glaberrima, supra nitida ~~basi ang.~~ P.
dunculi terminali gemini apice in pedunculis plu-
ribus simul subdichotomis articulatis articuli superne
dilatati semunquiculares altero latere parum longior
latior cum forella pro infestatione fideri margine cili-
to. Scissis super altero cornu infer bractea ovata decidua

Urtica folium P.

Lanatum O. foliis oblongiusculis obtusis serratis undulatis caule hirsuto, bracteis cordatis
Herb. Mant. 185. * S. V. pag. 546.

P. cuneata
laurifolia
articulata) Banks