

Toa

pallens Poa.

Habitat in Bonana Comerio herb. Fus.

Culmi erecti, bipedales, glabri, striati. Folia convoluta, longa, glabra.
Panícula spithamea et ultra, coarctata. Pedunculi plures, inaequales
quadri-flori. Calyci valvula lanceolata, attenuata, longitudine spiculi,
~~basi rotata~~ ^{plana, pallidescens} ~~sa~~ ^{canata}, canna oculi armata serrata. Spicula basi villosa
~~sa~~: valvula corollina apice hyalina, acuta

Poa

habitat in sylvis Helonia rariis 2

Radix perennis ^{plures} culmis basi adscendentibus ⁴⁰ vert. glabra. bi et tripeda
erectis. Folia plana glabra margine ^{si} abra, uti vagino.
retrosum ligula parva bifida. Panícula late vixis
minime colorata primum compacta dein diffusa. Spicula
lineari oblongo habitu fere dact. glomerata vel festuca 3-4-5 flora
gl. valvula calycina angustifimo acuta alte flore brevior altera
vixis fere longior altera gl. uti receptacula glabra atten
ata apice parum pallidiori.

Poa pungens species compositis distinctis, speculis ovatis subtrifloris, culmo repen-
te Märsch. in Schrad. Journ. f. d. b. t. t. pag 456.

Habitat in glareosis subsalvis planities ad Cymum fluvium ?
Similis ^{forma} *Agrost. pungenti*

Surgata Poa

Sloan herb. tab. 72. fig.

Habitata herb. ha. Mantii

Pedunculi univocalo, pedalis, erecta, striata. Pedunculi proxi, semipolli-
cari. Pedunculi adpressi, simpliciter, striato distincto, sespiter, appressi
mole, ovato, parva, convexa. Valvula ovata, idi. glumae convexa.
Valvula corolla conduplicata, obtusa, cum mucrona, ore latis carina serru-
cata

Tremula Poa

Habitat herb. La Mantini

Panicula diffusa: pedicelli capillares. Spicula lanceolata, semipolli-
caris, compressa. Valvula ovata, obtusa, latera uninervis.

festucoides Poa

Habita et herb. La Muntii

Panicula contracta, spithamea et ultra. Pediculi inferiores remotissimi
Spicula glabra, triflora. Flosculi parvi distantes, pubulato, pilante

pyramidata Poa

Habitat herb - La Mantua

affinis cristata. Panicula inferne patentiuscula, superne contracta. Spiculae
in floribus, nitida. Tollea et vagina pubescentes

Madagascariensis Poir.

Habitat in Madagascari herb La Martini

Folia linearia. Panicula magna patens. Pappi capillares, longi. Spicula
lineares, compressa, nitida, & flava

japonica P panicula pedata capillari, spiculis septem floris foliis
que glabris, Culmo ramoso Thunb. jap. p. 1. v. p. 114
Habitat in Japonia

non vidi

polumbea Poa panicula contracta elongata, spiculis 7 floris culmo ramofo

Statuta an monte video ^{Basilia}

Culmi plures, ^{cum panicula} spiculis 7, erecti ramofiliformes glaber folia bipolliciana
plana. Panicula 2 vel 3 plor longioris ipfo caule qua nota fere dignofcitur
spiculis parvis oblongo vindi fufascenti facie Poa eragrostidi

glomerata. Posa paniculi aggregati speculis ovatis 7-8 nervi striatis, culmorum
superio nodoso. In nodos prolifera.

Posa ^{principi} Forsk. Defiz. flor. Arab. pag. CIV. n. 71

Habitat in Arabia Forsk.

Facies omnino Posa prolifera Sw. diversa vero ex plurimis

Culmi longi prostrambentes glabri articulati articulis quadri-5-pollicia-
ribus teretes glabri nudi rigidi subtilissime striati geniculis
nodosis ramis ~~3~~ interdum interdum 4 et 5. Singulis geniculis
longitudine articuli floriferis basi foliosis. ~~in~~ folia involuta
rigida, unguiculata 2 vel 3 ad basin ramis prope rigentem
vaginis striatis foliis implexis longioribus et latioribus. Pedunculi ex
apice ramorum 4-5. bipollicares basi vaginati pedicelli
breves parum duris flexuosi. Flosculi teretes valvula ovata
oculis striatis.

phoenicea P. panicula laxa: spiculis teretibus compressis pediculis octifloris
lig. fl. carn.

Festuca elatior

Calycina F. panicula contracta, spiculis linearibus, calycis flosculis longis

Caranul. ii. ^{re}, foliis basi barbati Am. act. ad. 3. p. 400 & Spec. pl. per. 110 &
ed. de fr. pl. 1. p. 33 Destuea panicula contracta, spiculis linearibus muticis longis
tab. 44 fig. 2 hanc dicit calycis Loeft. t. 1164
bona Habitat in Hispania ☉

Culmi plures filiformes saepe vix digitales. interdum frithamo i
adscendentes 1-3 nodes ^{interdum vagans in minoribus vix inis folio}
num secti. Solea convoluta ^{saepius tenues} staccata, pollicaria vel ultra vagi
na villosa ^{saepius} apice ^{saepius} villosa quoque rariis in foliis remotis
panicula subspicata pollicaria. Spicula vix sciunda. gluma
& basi acuta ^{exterior} villosa tempore flendi dila sensim latior gluma
calycina loricata spicula parum longioris & flora flosculi villosi
valvula exterior apice membranacea bifida calycis glabra

villosi

involuto basi barbati

Walters
glomerata P. panicula coarctata elongata, spiculis subverticillatis glomeratis
culmis erectis Walt. fl. carol. pag 80 Poa glomerata
Habitat in Carolina

peruviana
2720 ~~peruviana~~ panicula fructu spiculis q' floris glabris, culmic foliis quo subulatis

villosis

Pon peruviana Jacq. coll. 1. pag. 107.

Habitat in Lima peruviana communis. Dederunt Allioni ex horto Paunonenfi et
Thouini ex horto Panfienfi vel semipedales

Culmi plures, filiformes geniculati palmari basi ramofi inferne test. vaginis
folia ~~subulata~~ ^{interdum pilifera} pollicata, in spontanea forte involuta, pollicaria patentia ^{vel les quae pollidantur}

Fructu. Vagina fructu villosa uti folia, lamina barbata
Panicula ^{interdum pollicaria} unguiculans oblonga glabra pedicellis brevissimis. ^{vel cylindrica ramis in majoribus remotis}

Spicula ovata vel

valvula corollina ovata cinnata cu uniuersis, margine, canna et
nervis vix villosa

subuliflora

~~racemosa~~ P. pappula cuneata, spiculis ovatis novemfloris, pediculis
Theatropi culis brevissimis Thunb. prodr. pag 21 Poa racemosa
- Habitat in cap. b. per

an Poa bilobes non satis mihi nota

glutinosa P panicula patente fructa, spiculis subnovem floris hirsutis
sculis glutinosi, culmo simpliciter, foliis subulosis Sloan bot. 114.
t. 76 fig 2.

Habitat in America.

gramen tremulo affinis paniculatum elegans minus Sloan
bot. 114. t. 71 fig 2

Culmi plures digitales, palmari vel pithamoi feliiformes. ^{4 costis} folia filiformia
ovata pilosa internodi breviora. panicula floris in racemo composito pedunculati
remoti. spicula 2-4 in pagulo pedicellati, oblongissimi valli:
de ruber. P floris valvula 4-nervia

Spinosa P. - spicis pedunculatis sparsi, ramis pinnatis; culmo ramoso
vestitus spinoso frutescens ramis ramulisque spinosis pedicellis
aculeatis des. Suppl. pag. 111

Habitat in Cap. 6. spic.

Culmi ramosi rami quasi subdichotomi vel terni altero latere
convexi altero plano glabri rami superne angu subtrangu
lato articulati articulis unguiculatis ramuli alterni
compressi in spinam deponentes patentes firmi rigidi flori
feri. vagina lata lato superne striato. spicis in ramis
latis alternis solitariis paves pedunculatis linearis. 9-10 flori
glabra.

rigida P panicula lanceolata subramosa secunda: ramulis alternis
secundis Lin. l. v. p. 114. Am. acad. 4. p. 265. 4

Gramen panicula multiplici Bauh. pin. 3. prod. 6.

Gramen loliacum murorum duriusculum, spica erecta rigida Monj
hist. 3. p. 102. f. d. 7. 2. fig. 9.

Gramen avenae, filicina durior panicula Barm. ii. 49.

Habitat in Gallis, Anglia sic et O.

Culmi plures subpithamici basi geniculato subanfractis, terete
inferne vaginis tecti. folia linearia plana bi- / tripollia
na pauca lora & labra pachi panicula trigona / striata
rigida pedunculi alterni brevissimi subcompressi inferius
spici plurimi alternis subspiculis supremis foliatis
spiculis linearibus uniter 10 floris valvula linearis lanceolata
obtusiuscula lora, spiculis

— spiculis linearibus 10 floris

Sarmentosa P. panicula p. coarctata, spiculis lanuginatis decemfloris,
culmo sarmentoso Thunb. prodr. fl. cap. pag. 21
Habitat in Cap. b. p. p.

na vid.

indempta *P. Panicula* ^{longata} ~~comata~~ ramulis inferioribus remotis, spiculis linearibus
decemfloris glabris

Habitat in India Orientali

Gramen pulchrum Culmo folisque glabris bipedale inferne genuis
laetum. Folia angusta striata convoluta. Panicula ramis inferiori-
bus remotis solitariis decempositis. Superioribus confertis subverticillatis
capillamentis erectis, spiculis capitis angustis compressis pallide flavo
faris cyperi valvula corollina cinnamata, obtusa. Gloriosa interdum
duodecim

sub nomine *Poa nitida* a Kunz.
confertus cum multifloro ~~Kunz~~

Poa indempta La Martini
ex diversis, confer. cum specimen
a La Martini data

nutans. Poa panicula contracta apice nutante, spiculis decemfloris, valvulis
reversis Petr. off. 4. p. 19

Habitat ad margines agrorum Franquetana

(Culmibus h.) 3 pedalis teres simplex erectus. Solia angusta brevia
panicula spithamea. Rami capillares subreticulati spicula linear-
rindi-albicantis sulculo calycino et involucrio aequali obtuso tri-
ne apice daffo extrosum subincurvato nervibus reversis

Eragrostis panicula patente, pedicellis flexuosis, spiculis serratis
decemfloris, glumis trinerviis Spec. pl. p. 100. Gaertn. 325.
Gramen paniculis elegantissimi majoribus, locustis purpurificati-
bus minoribus (Cheuch. gram. 143.
Gramen phalaroides, sparsa Boreo paniculas, minus Barcl. ii. 7. 44.

Fig. 2.
Habitat in Italia supra muros.

Culmi plures glabri vagina pilosula fauce barbata. Folia plana
marginata scabra. pedunculi flexuosi capillares. Spicula primum
solum demum decemflora vixi fuscescenti involucri obtusa.
varia magnitudine sicut arguta nonba, vel latioribus culmi ~~aut~~
vel adscendentibus brevioribus vel altioribus

Gramen arvensis altissimum paniculis minoribus et argutioribus magisque sparsis
Razi Syllog. 136. herb. Tournef.

truncata P. panicula diffusa spiculis 10 floris vaginis ramisque panicula basi barbata
culmo ramoso.

Habitat in insula Trancid Thoin

Culmi pedales: ramosi glabri. Folia infera longa infera convoluta
latere interiore inferne pilosa superiora breviora plana frequen-
ter fauce barbata vagina striata marginem versus puncti-
m elevatis sparsi piliferis panicula diffusissime rami capilla-
res ternato subverticillati flexuosi ad infertionem barbata
spicula compressa linearis 8-10 floris calvulo truncato corollae
truncata purpurascens vel pallida teneris

affinis Tenella

Pinata P. panicula patenti, spiculis ovatis subdecemfloris, culmo repente

Thunb. prodr. pag. 22.

Habitat in Cap. b. Per

non vid.

Madagascariensis Pan panícula ramosa laxe patentissima, spiculis subisofloris
vaginis nudis, culmo simpliciter La Mart. T. Enc. pag 185
Habitat in Madagascariis

mai 1851

30-34 Littoralis Poa panicula fructu secunda, foliis ^{undulatis} convolutis rigidis, Culmo prostratum
Tenda

Poa littoralis: panicula coarctata secunda multica, foliis convolutis
rigidis, caule humifuso Jouan fl. Monpe. pag. 470

Poa menteniana Culmi longe per arenam procumbentes, filiformes, teretes, glabris
sua ovata Qulmi longe per arenam procumbentes, filiformes, teretes, glabris
speculi rimis; articulis bipollicaribus. Rami ad genicula plura,
compressi floriferi et steriles: floriferi geniculati, digitales vel triverti-
glomerati tes, vaginati.

Savan u. 2 folia alterna, unguicularia, patentissima, subulata, minima
pag. 23. 4. 26 pungentia, subtilissime striata, glabra. Vagina folio parum
huc referuntur fenigio plana concolorata
Pluch. 33. 433. brevior saeva marginis pilosa. Solia ramulorum sterilem

quoniam nina min bifida
que ad in man Spicula sesile, alterna, conferta in spicam oblongam, pollicarem vel
tanquam herb. Tournef. ultra, unde in flora, ovata, vello villosa.

quoniam tanquam impura 2 calyx spicula brevior: glumis ovatis, acutis, con avis
tanquam ment min petala exteriora ovata, con cava, marginis pilosa: interiora membrana caeva
fl. Manch. quod 2 extus plano, intus a marginibus in flexis cava
Theatr. lat. 16. 17

palleficeni Poa panicula subdiffusa spiculis // floris valvulis ovatis foliis planis
gemma barbati

Habitat in Arabia vel Egypto ^{complanata} Concha

spiculis lanceolatis, valvulis ^{complanatis} in nervio, oper. latis canno superne sub
ciliata

Cyperodes P. paniculis spicatis glomeratis spiculis undecimfloris, culmo ramoso
fo. foliis subulatis Thunb. prodr. pag. 22.
Habitat in Cap. b. frei

Culmi erecti breves rigidi crassius penno columbino leve,
inferne vaginis imbricata. foliis f. tripollicari involuta
rigida pungentia. spicula ovata compressa breviter pedicellata
pallide viridi

an mea Thunbergii

~~non~~

viscosa P. panicula coarctata oblonga spiculis inferioribus trifloris, superioribus ^{duo} bicifloris, culmis rigidis demum viscosi Retz. *obf. f. 4. pag. 20*

Habitat in glaucosis Malabura.

Culmi cespitosi, inferne geniculis infractis, adscendentes terete interdum pedales. folia filiformia convoluta, bipolliciana. vaginae barbatae. Panicula pollicibus pedunculis inferioribus parum remotioribus. Spicula lineares congestae in pedicellis brevibus glumae mollinae oblongae obtusissimo canna et margine ore lenti ciliata utriusque linea elevata nervosa
culmi superne uti pedicelli orate visci odor thebraatinae seu. atamo
glorum Tempore vesperis replent

aprenum Phleum

~~Phaleni aprenum~~ ~~nanallia~~

Phleum aprenum Jacq. coll. 1. p. 110

Habitat in Europa

~~2~~ Caudex primordialis pro pedalis reliqui breviori tam ex omnibus axillis

Folia ad tactum aprenum semipedalis, Panicula spicata cylindrica 1-2
pollicaris vel parum ultra. gluma ad centem dorso serrata mucrone albi
do terminata

Phaleni aprenalis

Dyrenna P. panicula. panem speculu linear. ^{1. us} ~~causolati~~ 12 flori, folia involuta

Habitat in India orientali

Calmus sic thes pedali glaber tenuis. Folia glabra. pedunculi
paniculae ferè spithamea. Pedunculi alterni, remoti, densi
fundani flexuosi. Speculo ^{inflexo} pinnatifido vel panem longior
vires compressi diffusi. Salvuli acuti ternarii

offens. P. eragrostide

punctata P. panicula diffusa, spiculis duodecim floris, floribus dia-
phanis lobis punctatis intus fuscis her. Suppl. p. 109. t. v. 114

Habitat in Malabar

Culmi squipedali adscendentes teres insipidi pennis columbi-
nis. geniculis tumidioribus saepe tubis. Folia graminea striata
siula subtus lora adnatis longiori margine scabra basi vespi-
culosa vagina lora ligula nulla panicula expansa
milii deflorata in racemum coarctata. Spicula lanis
late 12-14 floris. Gloruli diaphani cum puncto (coarctata
in punctis fuscis et stria aridi utrinque glumae corollina
ovata acutiuscula lobis calycinis similibus

Specimen herbarii Dubium

Poa.

Poa racemosa spiculis linear-lanceolatis compressis, racemus compositis, pedunculis basi barbatis, foliis involutis subpilosiss.

Habitat in America meridionali. var. Robt.

Calmi ser. qui pedales, erecti, filiformes, simplices, glabri, teretes, basi compressiusculi.

Folia com involuta, subulata, tri-vel quadrinerviata, striata, pilis raris, prope basin supra adspersa, subtus saepe glabra.

Vagina glabra; faucibus barbata.

Pedunculi alterni, retrorsum scabri, 5-6, remoti, uti pedicelli basi barbati. Pedicelli brevissimi, alterni, remoti 3-7. in singulis pedunculo.

Rachis flexuosa
denticulata

Spicula cypripina, lineares, ~~compressa~~ compressa, circiter 13. florea: florea ^{li alterni, solitarii}
Valvula calycina lanceolata, glumae corollinae angustioris. Bracteola

Semen cro-
cerum, nitidum
subpellucidum

lineans sub singulis floreculis saepe brevior, a basi ad medium rachi adnata, ~~superne recurva, hinc rachi flexuosa.~~

Glumae corollinae ovatae, caninatae, attenuatae, acutae, apice patulae, quae ^{ne} pureoque, obscurae trinervis.

Varia spiculi 29. florum pallidiorum ~~coloratis~~ coloratis, uti et Dulmo. foliisque brevioribus.

17-13

vide

Squamata Poa paniculata pilantibus remotis, spiculis lineantibus lunicada
tis sub 15 flori, corollamur valvulis interombus persistantibus La Mark
Tab. Enc. pag. 105
Habitat ad Sierram Leenam.

amabilis P panicula patente, spiculis octo ad eum floris lineandis
J. V. p. 113 & fl. zeyl. 464

Habitat in India.

Poa unioloides panicula erecta spicula, spiculis subdecem floris
ovatis, calycibus inferioribus multivalvibus Retz obs.

foliis: strob. pag. 19

Habitat in India orientali

Kaizer: Bona Culmi ramosi ut pithamoi. Folia planis
pollicaria glabra. Panicula subsimplex. glauculi
panicula ^{compressa} primum 5 floris deinde 12-20 infer glauculi inferiores
semper decidua valvula carinata glabra utrinque nervo
elevato

~~sub~~ multifloris ovatis glauculis inferioribus deciduis
foliis linearis lanceolatis culmo ramoso
Poa rubens La Martre fide herb. La M.

52-33 bifaria Poa spiculis sessilibus distichis: inferioribus remotis rectis: superioribus
approximatis recurvatis

Habitat ~~in~~ in India Orientali

Gramen totum glabrum: Culmo filiformi

Spicula lanceolata: ^{compressa} inferiores undecim floras ^{inferioribus undecim trifloris} vel ^{superioribus} ~~tridecim floras~~ superiores

Corolla ^{res 19 floras} ^{valvulae} ^{est} ^{varia} ^{ovata}, ^{carinata}, ^{obtusiuscula}, ^{ut} ^{naque} ^{uni} ^{versis} ^{latis} ^{videnda}
facili negotio a reliquis distinguitur spica simpliciter dodrantali
Spiculis superioribus recurvis

Amourettes maderaspatensis, spica simpliciter colica Petrus.

579. herb. Vahl.

Littoralis Poa panicula spicata secunda, foliis ~~convolutis~~ ⁱⁿ ~~volutis~~ rigidis, culmo procumbente
Poa littoralis: panicula coarctata secunda mitica, foliis convolutis, ^{rigidis} caule
In arenosis ^{humifuso} Guar fl. monsp. pag 470

Ad littora lacus hifano Tracti in arenis Legi habitat quoque in his panis
Culmi longae per arenam procumbentes, filiformes teretes glaberrimi,
articulis bipollicaribus. Rami ad gemmella plura steriles et
floriferi. floriferi gemmellati, digitales vel dodrantales, vaginati
foliis alterna semiunguicularibus unguicularibus, patentissimis, ~~convolutis~~
^{subulata} ~~convolutis~~, minime pungentia, subtilissime striata, glabra.
vagina folio parum brevior, faucibus margine pilosa. folia ramulorum
sterilium bifaria

Spicula sessilis alterna conferta in spicam oblongam, pollicarem
vel ultra, undecimflora, ovata

Calyx spicula brevior ~~foliis~~ glumis ovatis acutis concavis
Petala exteriora ovata, concava margine pilosa, interior membra
nacea extus plana intus a marginibus reflexis inflexis
cava

Koeflingii P. panicula patente, spiculi ovato-lanceolatis compressis ^{glumis obtusis} verticillatis
Habitat in India occidentali a collectione Koeflingii Madag. habui
gramen palmarum vel pithameum culmo text. ramoso. Folia
pilis longis adpersa. Pedunculi paniculae alterni flexuosi indurati
Spicula alternis pedicelli brevis infimi duo triflori. Spicula unguiculares
culmo corollina trinervis obtusa glabra

ramosa prope hanc collata

prolesum P. panicula patente stricta, spiculis subrigenti floribus culmo
ramosissimo nodoso ad nodos prolesum Sw. prodr. pag 27

Culmi prostrati rami ad nodos congesti teres basi foliosi caeteri caeteri
nodis spithamea rami semipedales teres glabri laxes. Folia
involuta bipollicaria parum longiora vel minorum superne folio
vix breviora. Panicula parva rami aliter simpliciter
spiculis linearibus

Brizoides panicula racemosa, spiculis ovatis compressis, p. 10 s. novem
floris, culmo compresso Her. suppl. pag. 110 + L. V. p. 115

Habitat in Africa

binodis

Culmus usque pedalis erectus simplex glaber. Folia plurima
radicalia glabra involuta palmata pedicelli inferiores
quadri-flori. Spicula fere unguiculari ovata oblonga obli-
qua communi fere data. valvula carinata glabra flexile
seu vixit 40

~~*Briza capensis* spiculis ovatis decemfloris, panicula comata
Thunb. pr. pag. 21. vel p. 10 forte p. 10a racemosa
forte Thunb. Racemosa~~

a

(224 f)

— ovatis oblongis spic. multifloris
culmo basi subcompresso

74
Bromoides Poa pubescens, spiculis lanceolatis 25 floris; ^{brevi} inferioribus pedicellatis
superioribus sessilibus, foliis bifariis involutis
Habitat lino? Ex herbo parisiensi habui,

Caumi in fractis, glabri, vaginis foliorum fecti.

Folia alterna, scabulae bipollicaria, striata, glauco-viridia.

Vagina striata, ore barbato, foliis brevioris

Flores in spica terminali sesquipollicari, disticha, subsimpli.

Spicula lanceolata, compressa, glabra, pollicares, 25 floris et ultra,
inferioribus pedicellatis, pedicellis bifloris: superiores sessiles

Colla valvula margine vix ciliata

^{caninatus}
- ~~triangularis~~ Convolvulus foliis cordatis subulosis, pedunculis multifloris, bracteis saepe trican-
natis

ex Insul. Amer. meridionalis

Caulis pubescens triangulari linea foliacea decurrens per singulum angulum

Folia sagittata cordata, acuta, supra pilis adpressis oculo armato viden-
-do subtus magis conspicui, tripollicaria & ultra, petiolis ulloset
bifloris ^{pedic.} Pedunculus longitudine foliorum ^{bifloris} trifloris pedicellis
conicis venis acutis, colorata decidua pubescentes, ~~duo alia ad~~
calycis foliola duobus exterioribus bracteis formis ovatis acuta
- sericeo, ~~tribus interioribus~~ glabra breviora apice rotundata
affinitas maxima cum C. anguste an varietas foliis vero
obtusis gaudet antequam

Subspeciunda Pan panicula oblonga laxa, spiculis lineari acutis multifloris
lateralibus estrosum versus La Mart. P. Enc. pag 105
β- spiculis minoribus Planch. tab 190 fig. 3
Habitat in China β in India orientali
Spicula glabra 14-30 flora

tremula *Poa panicula ramosissima* capellan patente spiculis linearibus
glabris sub30floris Ca Mark T. En. pag. 185
Habitat in Senegal

Poa chinensis Ca Mark. Sesbii. Di. Her
non vidi.

hypnoides Poa spiculis linearibus subsessilibus congestis longissimis sub
50 floris, culmo brevissimo ramoso La Mark P. Enc. pag 185
Habitat in America meridionali

nonardi

Spicata P panicula spicata, floribus subulatis, flosculis remo-
tis Lin. Mant. 324 L. V

Habitat in Lusitania

Culmi plures e basi adscendentes palmares vestiti undique foliorum
vaginis. Folia linearia angusta coria vaginis crispantibus.
Florem racemus coarctatus in spicam longioribus fere culmi
aequalem. Calycis valvula exterior bene ovata interior
duplo longior. flosculi diffracti valvula exterior oblonga
acuminata. Habitus festucosus huius

Subri ordinis