

Podophyllum

1. peltatum P. foliis peltatis ^{lobatis} geminis caulinis
2. Podophyllum P. foliis semicordatis binatis radicalibus

umbellatum Podophyllum

Diphylleia cymosa Richard.

Habitat in America boreali Richard.

Caulis herbaceus, simplex, striatus. Folia duo, remota, peltata, subpitho-
moa, basi sine semicirculari subcordata, 8-16 lobata, glabra, venosa.
Lobi ovati denticulati. Pedunculi laterales, elongati. Pedicelli plu-
rimi, umbellati, pollicares, uniflori. Cal. 3phyllus: foliola ovata, concava,
membranacea, decidua. Petala 6. concava, nitida nuxea. Stami-
na 6. petalis dimidio breviora. Anthera erecta, basi in duabus ca-
mellis dehiscentibus. Germen ovatum. Stylus nullus. Stigma ca-
pitatum. Baccis Coerulea. Semina purpurea.

1 peltatum P. folio peltati lobati Lin 1. ✓

Aimphi folia humilis, flore albo unico campanulato fructu Cynosba
fi mentz. pug. t. 11.

Anapodophyllum canadense Cat. Carol. 1. p. 24. t. 24.

Habitat in America septentrionali 7

Caulis erectus glaberrimus angulatus glaber, uti tota planta.

Folia duo petiolata, palmata novem fida, ~~la~~ venosa, laciniis
lateralibus minoribus, parvis omnibus ~~exterioribus~~ ~~exterioribus~~
sum dilatata, duo quatuor quinque intermedia bifida
ut reliqua dentibus non nullis remotis. Peduncululus uni
cus in caule ex axilla folii inferiori bipollicari, petiolo
brevior, uniflorus

caulenis

2 *Diphyllum* P. foliis binatis semicordatis Lin. l. V. pag. 409 + Sprei. pl. pag. 723x

Habitat in Virginia. 2

Folia radicalia, petiolata, binata ut in *Hymenocallis*, glabra
integerrima, semicordata, absque pedicellis. Capiti radi-
cali, unifloro, fructus antecedente. An *Sanguinaria*
Sprei? 2

radicalibus, integerrimis