

Polygala

* cristati

1. incarnata P. floribus spicatis, caule herbaceo ramoso, foliis alternis subulatis
2. brasiliensis P. floribus subspicatis, caulibus simplicissimis, foliis lanceolatis sparsis
3. appalacha P. floribus corymbatis, caulibus simplicissimis, foliis petalis sparsis
4. genistifolia P. racemis lateralibus terminalibusque, caulibus ^{at simplicissimis} virgatis ~~spicatis~~, foliis linearibus remotissimis, caule ~~sp~~
5. brachosperma P. floribus spicatis, caulibus virgatis spicatis, foliis linearibus
6. bifida P. racemis lateralibus longissimis, foliis linearibus lanceolatis, caule superne bifido
7. paniculata P. racemis nudis, caulibus herbaceis erectis superne ramosis, foliis linearibus
8. amara P. floribus racemosis, caulibus adscendentibus, foliis inferioribus obovatis majoribus superioribus lanceolatis obtusis ^{omnibus}
9. vulgaris P. floribus racemosis, caulibus adscendentibus, foliis lanceolatis obtusis ⁱⁿ ~~inf~~ ^{aeque altis inferioribus majoribus}

- 10. mouspelicaea P. floribus racemosis, caule erecto, foliis lanceolatis-linearibus acutis
- 11. hirsuta P. racemo terminali, foliis hirsutis inferioribus subrotundis petiolatis, superioribus oblongis sessilibus
- 12. supina P. racemis terminalibus, foliis inferioribus oblongis superioribus lanceolatis caule intriculoso ramoso.
- 13. brevifolia P. racemis lateralibus terminalibusque, foliis lanceolatis sessilibus, caule ramoso intriculoso
- 14. Lunensis P. racemis oppositifoliis, foliis oblongis bifariis, caule suffruticoso prostrato.
- 15. glaucoides P. racemis lateralibus, foliis oblongis acutis mucronatis, caule ramoso diffusis.
- 16. fbnica P. racemis laterali nuda, cauli bust herbaceis, foliis lanceolatis
- 17. ^{oppositi} ~~hirsuta~~ folia P. floribus racemosis, foliis oppositis sessilibus cordato-attenuatis
- 18. myrtifolia P. racemis terminalibus, floribus cernis cucullata, foliis oblongis glabris subpetiolatis
- 19. callosa P. floribus racemosis, foliis linearibus petiolatis glabris ^{planis} apice callois.
- 20. lini folia P. floribus racemosis, foliis linearibus glabris involutis frasis apice callois
- 21. cernua P. floribus racemosis cernuis, foliis linearibus mucronatis frasis, ramis attenuatis ^{dentatis}
- 22. bracteolata P. floribus racemosis erectis, foliis linearibus subulatis

- (18-19) 23. *Vincetoxicum* P. villosa racemis axillaribus terminalibusque, bracteis triphyllis, foliis
obovatis caule fruticoso.
24. *Junica* P. floribus racemosis pendulis; foliis subulatis mucronatis remotissimis, caule
virgato
25. *umbellata* P. floribus subumbellatis, foliis linear-lanceolatis sabulatis scabrispulis
approximatis.
26. *visifera* P. floribus racemosis pendulis, caule virgato, foliis acicularibus distan-
tibus.
27. *aphylla* P. floribus lateralibus solitariis pedunculatis, ramis virgatis spinescenti-
bus; foliis deciduis
28. *spunosa* P. floribus lateralibus; caule spinoso fruticoso, foliis ovalibus mucronatis
29. *teretifolia* P. floribus lateralibus; caule fruticoso ramoso, foliis filiformibus foliatis

24. imberbes frutescentes

30. *Theerans* P. pedunculis unifloris, caule fruticoso, foliis lanceolatis
31. *Chamobuxus* P. floribus lateralibus solitariis, foliis oblongis mucronatis
32. *violacea* P. floribus racemosis lateralibus terminalibusque, caule piloso, foliis
oblongis
33. *Diversifolia* P. floribus racemosis, caule arbores, foliis inferioribus oblongo ovatis,
recentibus puberatis

34. *oftuans* P. floribus racemosis, foliis lanceolatis petiolatis, caule fistuloso.
35. *Penco* P. floribus lateralibus solitariis: foliis obtusis petiolatis scabris.
36. *Duba* P. floribus lateralibus; foliis obovatis supra punctatis scabris
38. *microphylla* P. floribus racemosis, caulibus suffruticosis virgatis, foliis ellipticis minus
 si firmis remotis.
39. *triner via* P. floribus solitariis axillaribus, foliis ovatis cuspidatis, ramis triquetris
39. *thymifolia* P. floribus lateralibus, foliis oblongis glabris mucronatis, ramis teretibus villosis
40. *myrsinites* P. floribus lateralibus, foliis subrotundis mucronatis glabris
41. *enicoides* P. floribus axillaribus, foliis subulatis solitariis ciliatis adpressis, ramis
 virgatis
42. *lestenia* P. floribus lateralibus, foliis lanceolatis carinatis mucronato-spinosis
 pungentibus
43. *squamosa* P. pedunculis unifloris, foliis aggregatis lanceolatis patulis
44. *verrucosa* P. floribus lateralibus, foliis aggregatis linearibus glabris acutis
45. *inermis* P. floribus lateralibus, foliis aggregatis linearibus obtusis apice patulis
46. *floribunda* P. floribus lateralibus spicis solitariis, foliis fasciculatis aciculatis
 glabris
47. *tenuifolia* P. floribus lateralibus, foliis aggregatis linearibus setaceis mucronatis
 inermibus

filiifolia Polygala foliis ⁷ filiiformibus, racemis ⁸ terminalibus, floribus ³ remotis, ⁴
capsulis nudantibus.

Habitat in Guinea 482

Indescens Rami tenues, angulati, glabri, uti vota planta. Folia frequentia,
ut pollicaria, venusima. Racemi terminalis cum ramo laterali, pauci
fiori, erecti, solitarii. Corolla parva, concolorata

Dichotoma Polygala foliis lanceolatis obtusis, racemis axillaribus compactis foliis
brevioribus, caule diffuso dichotomo. proliifero.

Habitat in arenosis Guinea Herb. O. Thonnery C

Caulis vix epithamoi, terre, pubescens. Folia subsessilia, pollianis,
obtusissima, sub marginibus illora, supra glabra. Racemi villosi.

Corolla cristata. Affinis P. sinensi.

semipollis ^{caer} oblongi
breviter pedunculati
lobi parum supra
basin ramorum

pubescens Polygala imberbis, pubescens, foliis lanceolato-ellipticis, racemis terminalibus.

Habitat in America ^{Jamaica} meridionali. In v. Rohr. 4

Rami teres, teneri, canescentes.

Folia breviter petiolata, alterna, pollicaria, lanceolato-elliptica, mucronata, utraque acuta, venosa, tenera, pubescentia, pallide viridia, mollia, subtus canescentia.

Petiolus brevissimus

Racemus terminalis, erectus. Pedicelli nitantes. Flores, magnitudine Polygala vulgaris.

Petala uti Alyxos, uti Petala et capfula, villosi.

Rohri *Polygala folii oblongi pubescentibus* raris emis lateralibus
terminalibusque.

Habita in Capena v. Rohri no 162

Caulis ramosus vix pubescens. Folia brevissima petiolata
semipollicaria basi acuta, plerumque obtusa ovata
sub nervosa supra glabra. Pedunculi binarii terminaliter
dein laterales elongati post caput florum denticulati.
Calyx et fructus glabri. Costa nulla.

Polygala

Habitat Cayenne herb. Desfont
Caulis rimosus, spithamov. Folia quaterna, infima oblonga mucosa

Polygala

Habitat in Carolina herb. Desfont.

Caulis simplex, glaber, angulatus. Folia semipollicana, canaliculata, glabra, integerrima. Racemi terminales, 3 pollicares. Bractea minuta. Flores non cristati.

humilis Polygala

Habitat Ban-clonette herb Thourin

Caulis digitalis, basi ramosus, erectus, filiformis. Folia lanceata. Racemus terminalis, erectus. Flores parvi, pediculi, distantes

habes

Lymosa Polygala

Walther

Habitat in Carolina

uniflora Polygala

Carolina
Habitat herb. Michx.

habes

Polygala

Polygala orientalis *supina* *myrtifolia* *flore* *coerulea* *Tournef. Cor.*

Habitat in oriente herb. Lespenit

Caulis plures, lignosi, fruticatosi, ascendentes, filiformes, glabri, subramosi. Solum
subsessilia oblonga, ^{vel obovata} ut unguiculata, glabra, aerea enervia. Flores rari
terminales, pauci, instati.

habeo

Oxyroccader Polyzala

Habitat

hest Desfont.

Caulis lignosus, ramosus, glabrus, uti tota planta, decumbens. Solia oblonga
crassa, avenia, enervia, uti semilanguiculana. Pedunculi axillares, plura
ni, uniflori

polycephala Polygala

Habitat in America septentrionali herb. Brit.

Caulis herbacaeus, adscendens, simplex, superne in peduncululos divisi, glaber, e margine & canisimo decurrente subtetragonus. Folia sessilia, distantia, semipollicari sursum sesquim. minora et angustiora, basi ciliolata. Pedunculi plures, subampli inferiores caule altiores. Flores in capitulo magnitudine pisi, ovato

cap. saltem habet

Setaea Polypoda

Habitat in Amer. septentr. herb. Reich.

Caulis fere pedalis, interdum superne ramo uno. alterove

Lalierifolia Polygala

Habitat in Brasilia herb. Jusf. O

Caulis erectus, simplex, glaber. Solia petiolata, 3-4 pollicaria, lanceolata, utrinque attenuata, glabra, subter pallidiora, simpliciter venosa. Petioli unguiculati, satemi-terni, femipollicares. Flores parvi, nudi flavescerentes. Cresta nulla.

Polygala

Polygala orientalis Jussena myrsifolia, flore *Coenobea* Tournef. Cor.

Habitat in Oriente herb. Tournef.

Caulis fruticulosus, tenuis, diffusus, ramosi, palmatis et ultra, adscendentes. Folia petiolata, unguiculata vel panem ultra, oblonga vel obovata, mucronata, glabra, a senis. Racemus terminalis, brevis

Polygala

Habitat herb. Mus.

Caules prostrati, ramosi.

habes

Polygala

Polygala orientalis L.: folio, flore magno purpureo Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Mus.

Caules plures, suffruticosi, saepe pedales, adscendentes. Folia infima obovata, unguis
citrina

Polygala

Polygala orientalis *supina* *myrtifolia*, flore coerulea Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Mus.

Caulis plures, diffusi, prostrati

fl. flore purpurea

Gräber

Habitat in Java. K. H. H. H.

Polygala

Habitat in monte video Commenf. herb. 4ur.

Caulis plures, semi pedales, simplices, vel superne ramosi, diffusi. Flores umbel-
bes, florentes erecti, albi, deflorati penduli, caerulei, perpurascentes.

Polygala

Polygala orientalis *linifolia* flore magno purpureo Tournef. Cor.

Habitat in oriente Herb. Turc.

Facies *polygala* vulgaris. Caules ascendentes, simplicis sive, sterthamici.
Folia petiolata glabra, inferiora oblonga minus, superiora linearia, ^{vult} semi polli-
ciana, sessilia, acuta. Pedunculus terminalis, bipollicaris. Flores racemosi,
conferti. Bractea lanceolata, parva, arida, corolla brevior. Corolla cri-
stata. an varietas vulgaris.

Sanguinea Polygala

Habitat herb. Fusf.

Caulis glaber, e linea decurrente angulatus; superne ramosus. Folia linearia, semipollicaria, acuta, glabra. Flores in capitulo magnitudine pipi, rachis per
sua elongatus prostrati flores cadunt, e bracteis minutis persistentibus squarosa.

Canescens Polypoda foliis lineariibus villosis canescentibus, floribus axillaribus sessi-
libus solitariis

Habitat in Cap. b. p. herb. Royen

Planta palmatis, basi ramosissima, diffusa, villosa-subcanescens, floribus axil-
laribus. Rami filiformes, teretes, latti, ramulosi, folia unguiculata, linea-
ria, angustissima, mucronata. Flores non cristati.

Polygala

Habitat in St. Domingo Leb. Gusf.

Fruticulus. Rami villosi. Folia subreticulata, lanceolata, semipollicaria, obtusiuscula, utrinque glabra. Racemi oppositifolii. Flores magnitudine Polygali vulgaris, an constati. Capsula oblonga. Semina linearia, villosa, iniana.

1 incarnata *Polygala floribus spicati, caule herbaceo ramis erecto, foliis alternis subulatis*
Lin Spet: pl. pag 986* L.V. p. 637

Polygala mariana, angustifolia, flore purpureo Pluk. mant. 153. t. 430.

fig. 5.

Polygala mantlandica foliis tenuissimis, spica parva compacta in summo
caule flospulis carnis Raf. suppl. 639.

Habitat in Virginia Canada ☉

Caulis pedalis, interdum simplicissimus, filiformis, angulatus, glaber.
Rami communiter tres, in alii summi, longi, angusti. Folia ^{angusta} plana, distan-
tia acutissima octo vel plures in caule. Spicae Vermenales; solitariae
breves, vix semipollicares, oblongae, vix dissimilem incarnatae. Corolla,
alio calycinis triplo longioribus: penicillis multifidis dilatatis, incar-
natus, alii corolla erecta.

fere filiformia

^{ancipis}
60 violacea *Polygala floribus capitato-ovatis*, foliis ^{lanceolatis} verticillatis alternisque, caule ramo
se ancipiti.

Habitat in America? ☉

Caulis semipedalis, erectus, ramo uno alterove, ancipis, uti rami, et foliorum
basi decurrente. Folia alterna, interdum quaternaria, lanceolata
glabra, sessilia sinuquicircularia. Flores in capitulum ovatum col-
lecti.

Polygala Tomenti aublottii fl. Gu. tab. 295.
seorsus cristat.

rotacea

P. spici terminalibus foliis canalicatis hirsutis. Aubl.

fl. Gu. 2. p. 73 5. v. 294.

Habitat in Guiana

2
brazilensis
Aparatho

Polygala floribus capitatis, caulibus simplicissimis, foliis petalis parvis lan-
^{subpinnatis}
ceolatis
Mart. 997 ~~IV~~ pag. 630.

Habitat in Brasilia

Caules simplices, palmares, filiformes, prostrati: Ramo la rarius laterali. Spica
pista terminalis, alba: floribus brevissime pedicellatis absque bracteis.
Ala ovata obtusa; Corolla penicillata. Capsula feminibus solitariis.
Pedunculis pucis elongatis deciduis inferioribus floribus, unda raris
denticulata. Lin M. l. c.
Folia mucronata supra semper angustiora frequentia

^{apalatha}
~~basilicensis~~ ^{capitata} Polygala floribus subspicatis, caulis simplicissimis, foliis ^{setaceis} lanceolatis sparsis
Lin. Mand. 99 * L.V. pag. 637

Habitat in Brasilia

Caules simplicissimi, subpedales. Folia sparsa, filiformia, acuminata, patentia,
pelticaria: superiora breviora. Flores subcapitati terminaliter: pedicellis
longitudinali florum. Bractea subpetala singulis lanceolata subulata, longitudi-
ne pedicelli, colorata. Corolla alba, alis lanceolatis, carina penicillata
fr. Bacis apalathi Lin. M. l. c.

non vidi

4
gonistifolia Polygala fls racemis lateralibus terminalibusque, foliis linearibus remo-
tis primis caule simplicissimis

~~habitat in Arabia et India Orientali~~ ^{angulatus}

Caulis erectus, sesquipedalis, striatus, simplicissimus. Folia linearia
remota, inferiora linearia acuta, superiora latiora superiora angustio-
ra. Bracteae foliorum terminalis interdum usque laterales
terminales interdum tantum terminales elongati. Flores approsi-
mati patentis. Bractea fere nulla. Capsula subrotunda emarginata
femina oblonga villosa.

femina in prima descriptione Polyg. hinc apice gemm. capsula adnata pilosis. pilis fere
versis. Capsula absque rostro emarginata

Triehosperma Pol. floribus pucatis, caulibus virgatis striatis, foliis linearibus. Len. S. Nat. 3.
pag. 232. * Mant. 259 * S. V. pag. 630.

Polygala floribus pubescentibus pucatis, foliis subulatis pappis, seminibus anthesis circumvallatis Jacq. off. 3. p. 16. t. 67

Habitat in Regno novo Granada &c.

Caules erecti, teres, striati, virgati. Folia pappis lanceolato-subulata, acuta remota, glabra. Spicis terminalibus oblongis, inferne denticulatis e capite florum. Florum corolla absque cristis, sed epiloio apertis multifloram pappis. Corolla minuta, alba. Semina anthesis deorsum spectantes, setis numero. Len. Mant. 1. c.

6 bifida Polygala Racemis lateralibus longissimis, foliis lineari lanceolatis, caule
superne bifido

Habitat in Cariboeis O

Planta tenera, glabra, erecta, simplicifolia caule superne diviso in ramis binis.
Folia sessilia, ovato-oblonga, distantia unguiculata. Racemus ad latus
singuli vel eorum binis remoti, erecti spithamei longitudine
ramorum. Flores Pedunculi capillares dentati & capsulae florum. 8 lo
res penduli parvi albidi vel incarnati. Capsula oblonga vix emargi
nata. Semina oblonga vix emarginata.

~~folia eadem cum punctulata~~

frequens est an Polyg. quod folia inferiora caulis vel ramorum laticosa et breviora sunt

7 paniculata Polyg. racemis nudis, caulibus herbaeis erectis superne ramosis, foliis lineari-
lin. Am. 8 pag 402* S.V. pag. 630

Polygala herbaea minor erecta, foliis lineari-bus, spica multiplici terminali foliosa
Brown. Jam. 287.

Habitat in Jamaica

Caulis pedalis, filiformis, erectus, superne ramoso paniculatus. Folia alternata
linearia, vix lanceolata, acuta, glabra. Racemi longi, laterales et termi-
nales: Bractea plana, decidua. Corollae albae purpurascentes. Capsula
oblonga compressa, vix emarginata Lin. Am. l. c.

Jemina villosa

varietas rarius flouitur albis et purpureis Richard

8
amara Polygala floribus racemosis, caulibus ascendentibus, foliis inferioribus obovatis majoribus
superioribus lanceolatis obtusis

Polygala vulgaris, foliis circa radicem rotundioribus, flore condeco, sapore admodum
amaro Bauh. Pin. 215

Polygala buxi minoris folio Vaill. Parif. 161. t. 32. fig. 2.

Polygala amara floribus congestis racemosis, caulibus erectis apiculatis, foliis radica-
libus obovatis majoribus Lin. S. V. p. 630. Gaerq. fl. Austr. 5. t. 412.

Habitat in Gallia, Austria subalpinis montosis ^{inferis que}
valde similis Pal. vulgaris, distinguitur amaritie foliisque radicalibus 10 plo majori-
~~bus majoribus obo-~~
vatis Lin.

Caulis basi ramis uno alterove parum decumbens demum ascendens, flori-
penduli remotiusculi

9 vulgaris Polygala foliis floribus racemosis, caulibus ascendentibus, foliis lanceolatis obtusis.

^{inferius brevioribus}
β Polygala vulgaris major Clus. hist. 1. p. 324. Vall. Bot. Panf. 161. t. 32. fig. 1.

Polygala major Bauh. Pin. 215

Polygala major floribus cristatis racemosis, caulibus herbaeis simplicibus suberectis
foliis linear lanceolatis Lin. S. V. p. 630. Faicu fl. Austr. vol. 5. t. 413.

α Polygala vulgaris Dodon.

Polygala vulgaris Bauh. Pin. 215

Polygala vulgaris floribus cristatis racemosis, caulibus herbaeis simplicibus
procumbentibus, foliis linear lanceolatis Lin. S. V. p. 630. Fl. Dan. 516

γ Polygala Ang. Cam.

Polygala lutea Bauh. Pin. 215

Habitat in cupressis pratis et pasuis sicis 3

Agre distinguitur ab amara. Folium vero in femina quidem oblonga, sed longe
angustiora quam in amara. superiora sensim majora, latiora quam in amara.

Flores in racemum ovatum primum brevior quam in nec elongata ut in amara,
primum approximati erecti demum remotiores pediculi. β. magnitudine
differt. γ. colore florum luteo alacriso vrsa

major P. floribus racemosis caulibus simplicibus sub erectis, foliis
lineari lanceolatis Jacq. fl. austr. 5. t. 413.

forte non nisi varietas *Polyg. vulgaris*
in herb. non ad est

10 *monspeliaca* *Polygala* floribus racemosis, caule erecto, foliis lanceolato-linearibus.
Linn. S. V. p. 8138

Anagyris 3. Lued.

Polygala acutioribus foliis monspeliaca Bauh. Pin. 215

Polygala vulgaris colonis obsoleti, foliis angustissimis Bauh. hist. 3. p. 300
Raj. h. 1336.

Habita *Monspeli* in qua *Barbaria* collibus sterilibus O

Caulis palmaris fere pedalis teres interdum superne ramo uno alterove.

Folia septica, glabra, acuminata, mucrona pallido terminata pollicia

na, ^{ima} ~~inferiora~~ mucrona, majori approximata ^{suprema} remotiora angustiora.

Racemus longus ^{rudine} dimidia planta ^{terminalis} per pedunculum post eam
florum dentatus. Florum remotiusculi penduli viridi purpurascentes.

11. *hirsuta* Polygala racemo terminali foliis ^{hirsutis} inferioribus subrotundis petiolatis superioribus
~~oblongis sessilibus~~

Habitat in Capite Bonoppei

Caulis ramosus rami ascendentes teres petiolis utriusque folia. Folia inferiora bre-
ve petiolata, ovata, femperque ulana, superiora oblonga summa ~~cum~~
ovato lanceolata. Racemus pollicaris. Flores glabri: bractea minuta ad basin
pedicellorum

172 *Jupina Polygala racemis terminalibus, foliis inferioribus oblongis superioribus lanceolatis caule
fruticuloso ramoso*
Polygala orientalis Jupina, myrtifolia flore conules Tournef. corol. p. 10.
Habitat in Oriente
similis amara at caule ramoso lignoso pubescentibus differt ceterum habitus vulgaris

16 glaucoides Polypala pedunculis floribus racemosis racemis lateralibus, caule ~~raro~~ foliis
oblongis mucronatis, ^{acutis} caule ramoso diffuso.

P. gl. floribus imberbibus; pedunculis multifloris lateralibus, caulebus diffusis herba
cui, foliis acutis Lin. Th. Zeyl. 270*. S. V. p. 640

Habitat in Zeylona. †

Caulis filiformes ramosi ramis diffusis vix manifeste vellosis. Folia
oblonga, glabra, basi acuta, sessilia, apice ~~mucronata~~ acuta mucronata
vix unguiculata, distantia. Pedunculis capillares supra folium
inserta cum foliis alternatae; foliis ^{parvis} longioribus. Flores parvi albi di
floris cristati

17 Sibirica Polygala raris mo laterali nudo, caulibus herbaris, foliis lanceolatis Lin. Spec.
pl. pag. 907* S. V. pag. 638. Gmel. Sib. T. 4. p. 32.

Polygala multicaulis Am. Sibir. 43. 44. 45.

P. foliis lineantibus

Habitat in Sibiria

Cauli ^{caudum} ramo uno alterove,

semipedali ^{pubescente} inferne

~~foliis glabra~~

^{glaberrima} folia ^{inferiora} ~~in~~ ^{ovata} superiora

concolorata. Racemus lateralis ^{unus} ~~plurimus~~ ^{oppositis} ~~foliis~~ ^{unicis} raro ^{duo}. Pedicel-
li capillares laxi basi bractea nulla

18 *Oppositifolia* *Polygala floribus racemosis, foliis oppositis sessilibus cordato acuminatis*
Polygala fruticosa floribus cymatis subumbellatis, foliis oppositis cordato lanceo
caulis acutis, erg. Cap. 183.

Polygala oppositifolia floribus cymatis, caule fruticoso, foliis oppositis ovatis
*acutis lin. M. 259 * S. V. pag.*

• *Habitat ad Cap. b. spei in montosis*

Truxter bipedalis ramosis. Rami teretes, laxes, glabri. Folia glaberrima
subcordata, mucrone tenuissimo terminata. Racemas terminales, polli-
cans: pedicellis filiformibus basi bractei minutis. Flores magni. Peta-
la calycina subcordata. nigra. Capsula obcylindrica compressa emargi-
nata, marginata. affinis myrtifolia

20 calloso Polygala foliis linearibus petiolatis glabri apice callosi.

Habitat in Cap. bonoperti

Caulis ramosus. Rami glabri alterni teretes. Folia brevia petiolata, pollicina
coriacea obtusa, frequentia apice callosumigena. Flores inflorescentia et
flores ut in bracteolata. affinis myrtifolia differt foliis angustioribus.

24 *linifolia* *Polygala* floribus racemosis foliis lineariibus glabris ^{capitulis} revolutis parvis quae
Habitat in Cap. bono spei
Rami tenues glabri. affinis *bracteolata* et differt a reliquis foliis lineari-
foliiformibus margine revolutis

Cernua
attenuata Polycala floribus racemosis cernuis, foliis linearibus mucronatis, ramis attenuatis ^{sparsis}
dentatis
Habitat in Cap. Bonospei
Affinis bracteolata dignoscitur a reliquis ramis inferne crassitie pennis asperis
Hincet ~~ramis~~ ^{ramis} ~~attenuatis~~ ^{attenuatis} ~~dentatis~~ ^{sparsis} ~~dentatis~~ ^{dentatis} ~~quamosis~~ ^{quamosis}, viridibus.

23 bracteolata *Polygala floribus racemosis erectis, caulibus foliis linearibus lanceolatis subulatis*
Polygala frutescens, foliis linearibus, flore majore purpureo Burm.
af. 202. t. 73. fig. 2.

Polygala foliis linearibus subulatis Hort. Cliff. 353.

Polygala bracteolata P. Lin. Spec. pl. pag. 980.

Habitat in Cap. bono spei t.

Tota glabra, linea per ramos decurrens e basi foliorum utrinque. Folia pollicaria linearia exorsum attenuata plana remotiuscula. Racemus terminalis. Pedunculi remoti pollicares basi bractea ternata in omni *Polygala* inaequalis. Flores majores erecti alii ovato subrotundi

13-14 tinctoria Polygala villosa floribus cristatis, bracteis triphyllis ^{obovatis} ovatis, foliis oblongis ~~obtusis~~, caulis ~~fruticosa~~

Polygala bracteolata; foliis alternis, obovato-cuneatis, integris subvillosis, pollicibus Corth. Desf. pag. 213.

Tota planta villosa.

Rami virgati teretes.

Folia subpetiolata, alterna, obovata, mucronata, interdum emarginata, pollicari.

Racemi axillares terminalesque, sesqui pollicares.

Bractes triphyllae, ovatae, minutae.

Calycis foliola oblonga, acuta, inaequalia.

Ala subrotunda, Calycis triplo majores, persistentes, pubescentes.

Legumen ovale, emarginatum, brevius alis brevius.

(maxime affinis Pol. myrtifolia, differt figura foliorum, villositate, floribus duplo minoribus, alis rotundatis non vero ovato-rhomboidalis acutis.

24 juncea Polygala floribus racemosis pendulis, foliis subulatis ^{minoratis} remotis semis, caule vixato
Polygala foliis linearibus acutis, flore purpureo minore Breyer. Cent. t. 49. Baum
apr. 203. t. 73. fig. 3.

Polygala bracteolata J. Lin. Sp. pl. p. 900. V

Habitat in Cap. bono sp. t.

et procedente differt ramis tenuioribus ~~ramis~~ elongatis junceis, foliis
minoribus angustioribus, rigidioribus remotis minoratis, rigidis. Flori-
bus majoribus approximatis triple minoribus, alii ~~oblongis~~ capsulis, oblongis
seminibus hirsutis semis

conf: semina bracteol.

25 umbellata *Polygala floribus subumbellatis foliis linearibus lanceolatis subulatis* ^{pub. Patricii foliis} ~~Lin. Mant.~~
aprotismatis
254 * S.V. p. 630.

Polygala foliis oblongis acutis, flore purpureo latiore Burm. afr. 204.
t. 73. fig. 5.

Polygala floribus cistatis subumbellatis, foliis linearibus subulatis Mant. Lin.
254 * S.V. p. 630.

Habitat in G. bono spitz

Rami filiformes teres subtilesime vellosi. Folia vix femine angustulata, ~~folia~~
f. folia frequentia margini et carina late vix, vellosa, subtiles punctis
minutissimis vellosi s. abrupsiula. Flores terminales in racemo brevissimo
subumbellati. Pedicelli capillares laxi basi squamis ovatis. Folia 3
extrema calycis ovato, acuta concava glaberrime

13 brevifolia ^{caeterislibus terminalibus} ^{sepibus} Polygala racemis oppositifoliis, foliis lanceolatis glabris, caule ramoso fruticuloso
Habitat in Regno Tunetano

~~Plant~~ palmarum basi ramoso ramis simplicibus angulatis. Folia lasiosipha
acuta, glabra, ut pinnatifida. Racemi oppositifolii vel
terminales pollicari. Flores Pol. vulgaris

~~Polygala frutescens lusitanica magno flore, foliis minimis~~

26 viscosa *Polygala foliis straccis d. floribus racemosis pendulis, caule virgato*
acicularibus

Habitat in Cap. bono speit

Similis antecedentibus at folia acicularia, angustiora, breviora, calycis margine membra
nacci glandulosi.

Rami glabri juncei, tenues. Folia margine lente ^{minutissime} viso, denticulata. Racemus semi
pollucens, alio cordato purpureo venosi intus albi. bractea apice peltata.

20 *Spergula Polygala* floribus lateralibus, caule frons fruticoso: foliis ovalibus mucronatis
Lin. Am. Acad. 2. p. 141* Mant 437. & S. V. pag. 63 D.

Genista pedum bacciferum, erico foliis, africanum Pluk. Alm: 166. 7. 185
fig. 6 mala. Pet. Gar. g. t. 83. fig. 9.

17 *Ulex capensis* foliis solitariis obtusis, spinis simplicibus & terminalibus
Lin. Spec. pl. p. 1046.

Habitat in Cap. b. p. 17

Herba ramosissima rigidus, glaber, ramis & ramulisque in spinam
validam desinentibus. Ramulis mucronatis. Folia parva sessilia lineari
oblonga subaristata, frequentia, ut semiuncinulata. Flores ex omnibus
axillis gemini vel solitarii longitudine foliorum, brevissima pedunculo
lati, pedicelli basi quasi squamis aliquot minutissimi

2029
teretifolia Polygala floribus ~~erectis~~ lateralibus, caule fruticoso ramoso, foliis filiferis
mibus falcatis Lin. suppl. p. 316. S. V. p. 638.

Habitat in Cap. bono specie.

vellosa P. racemis lateralibus, caule ^{terrean} folisque lanceolatis vellosis obtusis
Habitat Dahle

Similis polygala vulgaris at villosa et racemi laterales