

# Polygonum

\* caule frutescente

1. frutescens P. caule fruticoso, calycinis foliolis duobus reflectis  
\*\* Bistorta, spica unca
2. Bistorta P. caule simplicis spinis monostachyo, foliis radicalibus ovato-lanceolatis  
in petiolum decurrentibus
3. viviparum P. caule simplicis spinis monostachyo: foliis radicalibus ovalia, caulina  
lineari-lanceolata
4. virginianum P. floribus pentandris semi-dygnis, corollis quadrifidis inaequalibus,  
foliis ovatis, stipulis ciliatis
5. lapathifolium P. floribus hexandris digynis, stipulis muticis, pedunculis scabris,  
feminibus utraque compressis, foliis ovatis
6. alpinum P. floribus pentandris digynis, foliis lanceolatis, subtus molliter  
villosis, spica paniculata
7. paniculatum P. floribus foliis linearibus, caule ramosis spinis
8. Dahlia P. paniculato, stipulis muticis

9. amphibium P. floribus pentandris semidygnis, spica ovata  
 10. feliforme P. floribus pentandris digynis, spica feliformibus, foliis ovatis, stipulis  
 ciliatis  
 11. ocreatum P. floribus pentandris trigynis, foliis lanceolatis  
 12. minus P. floribus hexandris submonogynis, foliis lineari-lanceolatis, caule  
 basi repente.  
 13. hydrociper P. floribus hexandris semidygnis, foliis lanceolatis, stipulis muti-  
 cis  
 14. persicaria P. floribus hexandris digynis, spica ovato-oblonga, foliis lan-  
 ceolatis stipulis ciliatis  
 15. hesperium P. hispidissimum, floribus foliis lanceolatis  
 ellipticis attenuatis, stipulis hypocrateriformibus  
 16. glabrum P. glabrum, floribus foliis lanceolatis, stipulis tubi-  
 cosis ciliatis, spica virgata  
 17. sordidum P. floribus hexandris digynis, foliis lineari-lanceolatis, stipulis  
 ciliatis, bracteis tubinatis ciliatis  
 18. barbata P. floribus hexandris trigynis, spica virgata, stipulis truncatis, sta-  
 ceo ciliatis, foliis lanceolatis.  
 19. orientale P. floribus hexandris digynis, foliis ovatis, caule erecto, stipulis hypocra-  
 teriformibus barbatis  
 20. mantimum P. floribus pentandris digynis, pedunculis hispidis, foliis lanceolatis sti-  
 pulis muticis



x x x Ulyssia foliis indivisi, floribus octandis

121. maritimum P. floribus octandis trigynis, foliis ovali lanceolatis semperverantibus; caule suffrutescente
122. arcuatum P. Ulyssia floribus axillaribus; foliis lanceolatis caule procumbente herbaceo
123. setosum P. floribus trigynis axillaribus; foliis linearibus; caule prostrato
124. erectum P. floribus trigynis axillaribus; foliis ovalibus; caule erecto herbaceo
124. Bellardi P. floribus remotis simplicibus; foliis lanceolatis; stipulis lacero ciliatis
126. articulatum P. floribus trigynis; spicis articulatis paniculatis; stipulis vaginalibus uncinatis
127. divaricatum P. floribus trigynis racemosis; foliis lanceolatis; caule divaricato patulo
128. undulatum P. floribus trigynis racemosis; foliis lanceolatis attenuatis undulatis subtus villosis
129. serratum P. foliis serratis
- x x x x Heltonie foliis subcordatis
130. cheueni P. floribus octandis trigynis; pedunculis scabris; foliis ovatis; bracteis cordatis
131. tinctorium P. floribus hexandris trigynis; spicis virgatis; stipulis glabris acutis uncinatis ciliatis; foliis ovatis acutis; stipulis glabris
132. distichum P. floribus  
foliis inferioribus sagittatis acuminatis rotundatis; caule aculeato; stipulis tubulosis

- + 33. hastatum P. foliis hastatis caule inferne aculeato, stipulis campanulatis ciliatis  
 floribus capitatis (eodem folio cum precedente)
34. sagittatum P. foliis sagittatis, auriculis lanceolatis acutis, caule aculeato
35. anisoleum P. foliis hastatis, caule aculeato
36. crispifolium P. floribus octandris trigynis, foliis hastatis carnosis, caule decumbente  
 inermi
37. perfoliatum P. foliis triangularibus, caule aculeato, stipulis perfoliatis folio  
 si patentibus subrotundis
- + 38. Vatanicum P. foliis cordato-sagittatis, caule inermi erecto, seminibus subdentatis
- + 39. sagopyrum P. foliis cordato-sagittatis, caule erecto inermi, semine angu-  
 latis aequalibus
40. Convolvulus P. foliis sagittatis, caule volubili angulato, floribus <sup>inermis simplex</sup> obtusatis
41. multiflorum P. foliis cordatis, caule volubili angulato, florum panicula  
 ramosa
- + 42. Dumetorum P. foliis sagittatis, caule volubili teri, floribus racemosis can-  
 nato alatis, racemo simplici
- + 43. scandens P. foliis cordatis, caule erecto scandente



*Senecium Polygonum*

Habitat in arenosis ad fluvium Bai Thal herb. Musai

*Senecium*. Caulis villosus, subcanescens. Folia sessilia, oblonga, sesquipollicaria, integerrima, utrinque villosa, subtus ferruginea. Squamulae membranaceae hyalinae, truncatae, villosae. Spicae axillares et terminales, simpliciter, axillares foliosi.

*Polygonum orientale*, canyophyllifloro, flore magno  
Habitat in Armenia herb. maj.

habes



*Polygonum orientale*, humifusum folio subrotundo rigido.  
Habitat in oriente herb. musci

habes.

Polygonum

Habitat in Bonana Commera herb. Hoff

Caulis glaber, lavis, scandens, purpurascens, angulatus. Folia petiolata, hypoleucana, sagittata, mucronata, glabra, venia, integerrima. Stipula tubulosa, internodiobreviter, integerrima, membranacea. Spica racemosa, flexuosa. Flores distantes plures. Bractea truncata.

an perficaria affinis



Tomentosum Polygonum

Habitat ad Senegal herb. Mus.

Caulis simplex, erectus, uti folia utrinque dense tomentosa, incana. Solum sessile, lanceolatum, integerrimum, acutum, 2-3 polliciana. Stipulae subrotundae, superne ampliores, ciliatae. Spica nonnulla superne, alterni, glabri. Bractea truncata. prope persianam collocatur.

*Polygonum*

Habitat ad Senegal herb. Guss.

Caules herbacei, erecti, scitro vagini foliorum lutei, integerrimi alterni la-  
tere oblique truncati. Folia petiolata, spithamea, lato-lanceolata, acule adha-  
erente, venia, anervia, utrinque glabra, basi acuta, oculo armato ferrula-  
ta. Pedunculi superne. Spica 3. 4. alterna pedunculata, sesqui polli-  
cari. Bractea campanulata, oblique truncata. Stom. pluri-  
affinis perfrans



Polygonum

Polygonum orientale caryophylli folio, flore magno albo Tournef. Cor. purp.  
Habetur in Oriente herb. Turc.

Caules plures, filiformes, diffusi, striati, glabri, simplices, fruticosi. Stipula an-  
do, multiplex. Folia subulata, striata, semipollicina, glabra. Flores axilla-  
res solitarii vel terni magnitudine P. avicularis.

*Polygonum*

Habitat in Romania. Comnes. herb. Gesf.

Caulis suffruticosus? angulatus, purpurascens, glabrus, purpureus, laxes. Folia petiolata, bipollicaria, lanceolata, acuta, integerrima, avenia, enervia, glabra. Stipula tubulosa integerrima. Spica racemosa, flexuosa. Flores remoti affini persicaria.



*Polygonum*

*Herzianum maximum repens Lufitania rotundifolia*

Habitat in Lufitania herb. Tournef.

habeo

Polygonum

Act. Petrop. tom. I VIII.

Habitat in Siberia herb. musc.

Caules herbacei, ramosi. Folia lanceolata. Spicis pyramide ramosis



Polygonum

Habitat in Philippinis herb. Thonini

Caulis herbaceus, erectus, pilosus, ramosus. Folia petiolata, 2-3 pollicaria, ovata,  
attenuata, integerrima, villosa, subnervosa, arena. Petioli villosi, iniani,

Stipula unguicularis, infundibuliformis, pilosa, ciliata, spinescentes. Limbo  
vix, intus glabro. Strob. distantes, villosi.

Differt P. orientale, a P. chinense diversum videtur

*Dactyloctenium Polyzonium*

Habitat in Bonana Herb. Thouni

Caulis scandens, glaber, purpurascens. Folia petiolata, inferiora lanceolata  
hasta bipolliciana, superiora lanceolata, cetera emma: auricula apice  
recurva, glabra, acuta, avenia, enervia. Sepala tubulosa, integra. Flores  
non vidi



Polygonum

Habitat in Aemelia? herb. Thouini

Stem glaber. Rami trichotomi. Folia sessilia, vix pollicaria, oblonga, acuta  
integerrima, avenia, e nervis, subtus glauca. Flores axillares

Polygonum

*Polygonum orientale* humifusum folio subrotundo-ovato Tournef.

Habitat in Oriente Léb. Desfont.

affine *P. maritimo*. Caulis lignosi, filiformes, decumbentes, flexuosi  
glabri. Folia petiolata, semipollicaria, lanceolata-oblonga, glabra, acuminata, enervia.  
Stipula lanceolata, hirsuta, superioris longitudine internodiorum. Stems  
axillares, terni, an monogyne



terre Polygonum

Habitat Herb. Ruth.

Caules se mpedales, ramoji

habes

ramosissimum Polygonum

Habitat in Carolina herb. Aub.  
caulis, erectus, 3 andrum digynum

habes



*Polygonella parvifolia* Richard.

Habitat in aridissimis Carolina Richard

♀ flentis. Calyx 5que partitus: lacinis ovales, patentes, duo extenores angustiores. Stamina 7. Longitudine calycis. Germen oblongo-conoideum, triquetrum

stylis 3 stigmata vix ulla

♀ Cal. utraque. Stamina nulla. Peridium longitudine calycis. Germen utraque

stigmata 3. <sup>sub</sup>sepalia ovoides - clavata

odoratum Polygonum. foliis lanceolatis glabris, spicis terminalibus longis  
floribus trigynis, radice repente. Lour fl. Cochinch. p. 243  
Habitat in Cochinchina.

Caules herbari cuius pediculi puberuli simpliciter. Stipulae obtuse  
ciliatae. folia verticillata, glabra, subsessilia. floribus  
nubis rubris. Corolla 5-partita. Stigmata globosa.

non vidi



ciliatum Polyg. foliis ovato lanceolatis glabris, spicis terminalibus, <sup>brevifloris</sup> ~~floribus~~  
suspensis ciliatis

Polygonum ciliatum floribus octandris trigynis, sepalis 5 et natis ad  
superi ciliatis, spicis brevifloris Lour. fl. Cochinch. pag. 243.  
Habitat in Cochinchina. Cantonum Siamum

Herbaceum tetragonum simpliciter erectum, sesquipedale. Folia  
integerrima subsessilia

non vid.





14 *herpitem* Polygonum *herpitem* minus floribus ————— foliis lanceolatis  
ellipticis attenuatis stipulis hypocyrtidenformibus <sup>dentatis</sup> <sup>telatis</sup>  
Habitat in Haenam China.

Stipulae unguiculares inferne ferrugineae superne virides. <sup>herpitem</sup> ciliato  
tota planta molliter *herpitem*. Possidet her et in <sup>herpitem</sup> <sup>herpitem</sup> <sup>herpitem</sup>  
ut in barbato. Stipulae apice foliatis

Sichovanna - modela mucieu Rheed. mal. 12. p. 147. tab. 76

*herpitem* folia <sup>et potius campanulata / sal</sup> <sup>tem in cuncta</sup> <sup>apparent quod</sup>  
stipulae in orientali non toto membranaceae  
basi acuminatae aut *herpitem* vere varietas nec ne.  
nec adnatae  
attenuata

Quomodo *herpitem*.

14 orientale Polygonum floribus heptandris digynis, foliis ovatis, caula erecto, stipulis hypochloeriformibus hirtis Lin. S. V. p. 377.

Perficaria orientalis Nicotiana folio, calyce florum purpureo Tournef. Cor. 3 p.  
Com. rar. 43. t. 43.

Schovanna - modera muscu Rheid. Mal. 12. p. 147. t. 76.

Perficaria foliis ovatis - lanceolatis acutis, floribus pentandris, caula erecto Mell. Dub. t. 201.

Act. panf. 1703. p. 302. t. 11.

β. ~~Perficaria indica~~

habitat in Oriente β. in India C

caulis sesquipedalis stratus pubescens ramosus. Folia petiolata remota bipollicaria, sesqui sesquipollicem lata, venis villosa. Stipulae unguicularis. <sup>pubescentes</sup> piceae axillares breviflorae; terminales tri- sesquipollicem res erecti imbricati crassitie digiti. Bractea ovata colorato. Flori purpurascens



purpureum  
glaberrimum

<sup>glaber</sup>

P. foliis lanceolatis glabris utrinque attenuatis petiolatis stipu-  
lis integri spicis virgatis seminibus compressis

Habitat in India orientali

Paulis <sup>glaber</sup> purpureis ~~fructibus~~ uti costa et vaginis, striatis arti-  
culatis articuli pollicariis sesum longioribus vaginis tubulosis  
glabris inferius petioli longitudine superioris dimidio bre-  
vioris integri. Sola petiolata 5-6 pollicaria utrinque pro-  
fectum extrosum valde attenuata acuta glaberrima supra  
lora arenaria subtiliter transversim venosa oculo armato pers-  
picienda. Spicis ut in affinis ad lat. pedicelli parum longioribus  
bracteis integerrimis. Stylis brevibus

*Congitolum*  
*astadium*

*Polygonum floribus hexagonis* <sup>Diogeni, specis variatis, stipuli truncatis, sebaceo</sup>  
ciliatis, foliis lanceolatis <sup>subsessilibus de lobis cordatis</sup> ~~in spec. pl. 518. t. 1. f. p. 277.~~

Perficiana Maderapatana, longior folio, hispida Pluk. Alm. 200. t. 10. fig. 7.

Perficiana folio ovato glabris Nov. Act. pet. vol. 1. p. 375. t. 13?

Habitat in China et India Orientali <sup>fami steriles ter</sup> ~~Stipula vagi~~

in florentibus  
adnulo d'aplo  
b'eros

Caulis sebaceus, erectus <sup>perquisitales</sup>, stipuli <sup>terre lectas</sup> ~~Stipula vagi~~  
nales, laxe piloso, petioli <sup>validis</sup> longitudine internodum, petioli <sup>validis</sup>  
longitudine fere <sup>quasi</sup> stipula ciliato. Solum <sup>albescens</sup>, glabris <sup>foliis</sup>

in argente  
subsessilibus  
petioli brevior

longitudine fere <sup>quasi</sup> stipula ciliato. Solum <sup>albescens</sup>, glabris <sup>foliis</sup>  
longitudine fere <sup>quasi</sup> stipula ciliato. Solum <sup>albescens</sup>, glabris <sup>foliis</sup>  
longitudine fere <sup>quasi</sup> stipula ciliato. Solum <sup>albescens</sup>, glabris <sup>foliis</sup>

late dum folio <sup>supremo</sup>  
et tam <sup>terminalis</sup>  
apparent

moa. Pedunculis <sup>lateralibus</sup>, caule <sup>albis</sup> pedalis, internodiis  
quadri pollicibus. Spica <sup>varia</sup> pedunculata <sup>palmaris</sup>  
et ultra 3. 4 in <sup>angulo</sup> pedunculo. Flores <sup>remoti</sup>, tubis <sup>ext.</sup>  
singula bractea <sup>turbata</sup>. Bractea <sup>oblique</sup> truncata glabro  
ciliato. <sup>Stamina</sup> longitudine <sup>colla</sup> stylis <sup>bifidis</sup>

# pedunculata  
semina compressa  
nigra nitida

in alio specimen <sup>ramis</sup> apice pedunculus <sup>spica</sup> unice et  
ramo apice <sup>spica</sup> tubis in <sup>feris</sup> remota <sup>pedunculata</sup> duo  
in <sup>apice</sup> pedunculi <sup>communi</sup> seples <sup>foliis</sup> punctato <sup>scabris</sup>  
filiis <sup>punctis</sup> elevatis <sup>pro</sup> olulo <sup>ornato</sup> piliferis <sup>foliis</sup> an <sup>specie</sup>  
diversa <sup>specie</sup> minor, <sup>filio</sup> <sup>stipularum</sup> <sup>longioris</sup>



16 <sup>barbatum</sup> ~~glabrum~~ Polygonum glabrum floribus  
foliis lanceolatis, Stipula  
tubulosis ciliatis. Specie varietati subramosa

Habitat in India Orientali  
Ciliata Stipula semipollicari ciliata ciliis stipula Duplo

bracteis quinquifloris. Semel barbatum inflorescentia  
an diversa. foliata detentata ut naquea acuta ovata flexuosa  
flores breviter pedicellati nictolis brevibus  
Aliam e Queana omnino similem foliis tantum longioribus ciliis  
que stipularum ut in barbatum an diversa. Potentillae

stipula glabrora quam in longifolia uti et folia quo breviora  
specie tenuiora semina triquetra

flor in meo videtur semel cyano

De Synonymia

*Nunculatrum* P. foliis lanceolatis attenuatis subsessilibus punctulatis, spicis virgatis  
+ is umbriatis seminebus torquetis, stipulis ciliatis.

Habitat in India Orientali

Similis longifolia at folia longiora latiora et virgæ punctis minutis <sup>quibus videntur</sup> <sup>spicis</sup> <sup>longis</sup>  
superius articuli bipollicares <sup>basij</sup> summe pilosi. Stipula ciliis longis arti-  
culo dimidio brevioribus pilis frequentibus aspersi. Semidigena  
Folia <sup>basij</sup> saepe ultra pollicem lata <sup>atque</sup> <sup>basij</sup> pilosiora vel minus  
juniora subtus saepe sericea



Convolvulus Polygonum foliis <sup>cordato</sup> cordato sagittatis, caule volubi angulato, floribus  
 octafatis Lin. S.V. p. 379. Cl. Sant. 1344

Convolvulum magnum Led. pempt. 396.

Convolvulus minor, semine triangulo Bauh. Pin. 295.

Habitat in Europa agri ☉

Caules striatus. Folia magis lanceolata angustiora quam in ~~Con~~  
 P. Dumetorum. anguli divaricati acuti. Racemi <sup>ap. flores</sup> folio duplo  
 longiores flores etiam ad basin pedunculi. Bractes anguste  
 lanceolatae.

anguli posteriori acuti      bractes lanceolatae

17 <sup>minus</sup> ~~fructus~~ Polygonum floribus hexandris digynis <sup>filononogynis</sup> foliis linear lanceolatis, stipulis  
ciliatis, ~~bracteis tuberculatis ciliatis unifloris~~ caule basi ~~erectis~~ ~~Hort~~

<sup>new. 2. p. 31.</sup>  
Persicaria pumila Tabern. Lus. p. 850.

Persicaria pupilla repens Kobel. 40. 316.

Persicaria angustifolia Bauh. Capr. 43.

Polygonum minus: floribus hexandris digynis, foliis lanceolatis, stipulis  
ciliatis, caule divaricato patulo ~~Hort~~. fl. angl. p. 140.

Polygonum foliis ovato-lanceolatis glabris, spicis stigmatosis vaginis ciliatis  
Hall. herb. n. 1555. ~~Refl.~~ ~~Mesic.~~ ~~Taur.~~ Tom. 5. p. 94.

Polygonum fructum All. fl. Ped. n. 2051. Tab. 60. fig. 1. \*

Habitat in ~~seco~~ <sup>humidibus</sup> ~~montibus~~ <sup>O. stratus</sup>

Facies ~~bracteata~~ <sup>lydypnensis. Caulis</sup> ~~et omnia minus~~. Stipulis articulis dimidiis brevioribus  
glabris <sup>pubescentibus</sup> longe ciliatis. Folia utroque attenuata basi revoluta  
bi pollicaria. Spicis <sup>pubescentibus</sup> versus apicem <sup>pubescentibus</sup> tenues, <sup>pubescentibus</sup> <sup>et jam elapsis</sup> <sup>pubescentibus</sup> <sup>et jam elapsis</sup> <sup>pubescentibus</sup> <sup>et jam elapsis</sup>  
flores alterni breviter pedunculati glabri bracteis ciliatis

~~Synonyma omnia post alleonii et forte etiam Bauh. p. ad  
aliam plantam fructantem: minus Curtisi~~



22 fetosum Polygonum floribus octandris trigynis axillaribus foliis linearibus caule  
prostrato

Polygonum orientale Caryophylli folio, flore magno albo Tournef.  
cont. 39.

Polygonum fetosum: floribus octandris trigynis axillaribus; foliis subu-  
lato linearibus; squamis petaloc-laceis; caulebus suffruticenti-  
bus Jacq. obs. 3. p. 2. t. 57. \*

Habitat in Oriente 4

Similis P. aviculari differt foliis 3 plo longioribus radice perenni  
Flores purpurei.

21 auriculare Polygonum floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule  
procumbente herbae Lin. L. V. p. 370. Fl. Dan. t. 203

Ceratium nodia Bonif

Polygonum mas Dod.

Polygonum latifolium Bauh. Pin. 201.

13. Polygonum secundum Tabern.

Polygonum brevi angustoque folia Bauh. Pin. 201.

14. Polygonum tertium Tabern.

Polygonum oblongo angusto folio Bauh. Pin. 201.

15. Polygonum angustifolium, calycibus purpureis Dill. app. 65.

16. Polygonum erectum humile, foliis obtusis Dill. app. 65.

Habitat in Europa cultis moderatis et in India

Caules prostrati diffusi dichotome ramosi. Stipulae lineari-oblongae  
acutiusculae penninerviatae glabrae uti tota planta <sup>perhyacinthata</sup> Stipulae  
hyalinae lacero ciliatae. Flores 2-3 in singula axilla. Stipulae in  
India magis ciliatae caulibus firmioribus, omnia minus a rigida

lineari-oblongae



175

*Erasifolium Polygonum* floribus octandris trigynis, foliis hastatis carnosis, caule  
decumbente inermi Ten. f. V. p. 370.

*Polygonum sibiricum*, floribus octandris, foliis hastatis, caule inermi  
Lam. in nov. Pom. petrop. v. 10. p. 531. t. 7. fig. 2.

*Polygonum hastatum* Murr. in Comment. gotting. 1774. p. 37. t. 6.  
Habitat in Sibiria

non vidi.

conferatur specimen herbarii sub nomine sibir. cum fig. in Com. Gott

11 ocreatum Polyg. floribus pentandris trigynis, foliis lanceolatis. Lin S.V. p. 377  
Spec. bot. mag. 517. \*

Habitat in Libania

Sepala sunt vagina integra, ventricosa lobes, ampliores multo quam cau-  
lis. Corolla lanceolata, revoluta. Flores ratemofi hu

non vid.



24 *maritimum* Polygonum floribus octandris trippnis, foliis ovali-lanceolatis semper  
versutibus, caule suffulte penta L. p. pl. p. 519. \* S.V. p.  
*Polygonum maritimum* Lam. epit. 691.  
*Polygonum maritimum latifolium* Baud. Pin. 201.

Habitat in littoribus maritimis in mediterraneis, Orientis, virginid &  
Affine nemis <sup>P.</sup> *aviculare*, ut vix distinguitur, etiam floribus qua  
ternis et caule hinc planiore, sed omnia majora et duriora  
caulis proculumens glaber, dichotome ramosus, striatus. Folia coria  
cea, ex plicatone canulescentia, pollicari. Bipulo hyalino  
caetera foliis duplo breviora. flores axillares breviter pedunculati  
liti

4 amphibium Polygonum floribus pentameris semidivinis, spica ovata Lin. L. V. pag 377.  
86. Jan. 4. 202

terrestri Phyllitis Lacustris Cord. herb.

Potamogeton Gad.

Potamogeton foliis folio Bauh. Lin. 193.

aquatica  $\beta$ . Persiana palustris fluitans, foliis brevioribus et latioribus, florum spica  
speciosa purpurea compactiore Rapp. Gen. 72.

Habita a in pratis argillofis juxta vias.  $\beta$  in fossis et paludibus &  
a Caulis stipulis vaginantibus vestitus. Folio petiolata patentia lanceolata  
ha <sup>affrenata</sup> basi ovata, <sup>petiolus unguiculatus</sup> nervis adpressis. Apicula tubulosa truncata mutua  
Peduncululus terminalis erecta pubescens. Spica unguiculans crassitie  
penna cygnea. olores confert.

$\beta$  caulis striatus glaber uti folia. Tolia magne patris obtusa  
3-4 pellicanis transverse venae nervosa puberula. Spica  
terminali glabra



29 Chenop. Polygonum floribus octandris trigynis, pedunculis scabris foliis ovatis, basi  
cordatis. Lin. Spec. pl. 520 & F. V. pag. 370 Burm. ind. 90. t. 30. fig. 3

Habitat in India, China.

Caulis flexuosus glaber inferne vel stipulis vaginantibus, latis, integerrimo  
nec ciliatis, supremis ovatis, superne divisis articulis longioribus  
bipolliciaribus. Folia ovata, basi ovata utraque glabra basi maxime  
angustata in petiolum. <sup>acutiuscula</sup> Bractea remota ad basin pedunculorum.  
Pedunculi subsimpliciter. Flores capitati, pauci, terminales

# Stipula <sup>ovata</sup> inferiores magis tubulose supremi infundibuli  
formes, folia suprema simpliciter cordata

supremis cordatis  
stipulis superioribus integerrimis  
inferioribus in campanulatis

30 tinctonum Polygonum floribus hexandris Trigenis, spicis vagatis, stipulis & lobis arotis  
truncatis ciliatis, foliis ovatis ac utrinque glabris Hort. Kew. 2. p. 31.  
Habitat in China.

Similis P. Chinesis. Stipula hyalina longitudine internodium longe ciliata  
Folia petiolata, pollitana glabra. Petiolus folio dimidio brevior. Spica  
terminalis solitaria ramosa. Bractea verticillata hyalina

— oblongo ovatis ju



32 ho statum Polygonum foliis hastatis, caule inferne aculeato, Sepalis campanulatis ciliatis, floribus capitatis

Tay. Hist. v. 1. rectum sinen. p. Convolvuli minoris folio, ad Caulium nodos appendicibus pilosis aut aculeatis Planch. Analt. p. 86. t. 398.

Fig. 4

Polygonum angolum Thunb. fl. Jap. p. 168. \*

Habitat in Japonia

var. n. p.

Caulis sulcatus decumbens, angulatus angulis inferne retrospem

internodiis multo brevioribus aculeatis superne scabris. Folia petiolata, acuminata, venis  
semunguicularibus apice villosa striata scabra uti petiolus, pollicina <sup>vel ultra</sup> Petiolus ungui-  
cularis. Sepala petiolo breviora. Pedunculi pilosi, pubescentes glandulosi, Pedunculi axillares et terminalis. Bractea ciliata  
ovata  
Stamina 7. Styli 3. Semina locia angulis integri

ab angulis mihi diversa videtur

7. *Disselium Polygonum floribus; foliis inferioribus sagittatis auriculis rotundatis superioribus lanceolatis caule aculeato*

*Polygonum foliis sagittatis caule aculeato Gmel. bot. 3 p. 65. t. 13. fig. 2. 2*  
cum auriculis rotundatis

Habitat in India

Caulis erectus prostratus; sulcatus, sulci aculeati aculeis linearibus setosis reversis. Folia petiolata inferiora hastata oblonga, superiora lanceolata, glabra <sup>disputa</sup> pollicaria <sup>retroflexa</sup> remota, canna <sup>anthera</sup> <sup>trispicata</sup> ab aculeis minutissima. Stipula tubulata integra glabra. Pedunculi <sup>filiformes</sup> setati

# internodiis  
dimidio brevioribus  
uniguicularis

Stipulae pili raris apice glandulosis, 2. vel 3 ad apicem caulis. Flores  
pauci flori 4-5. Bractea tubulata subclavata. flori con  
ferti

Stipulis tubulosis

superioribus lanceolatis

~~eadem forte cum aristatis Humboldtii~~



34  
arifolium Polyg folus hastatis, caule aculeato Lin. I. V. p. 370

Planta proxi e novo belgio Caet Amer. 73.

Tagetico simili spenosa scandens, arifolus latiore floridana Pluk  
amalth. Ort. 348. fig. 3.

Habitat in Virginia, Florida  
Caulis scandens

— scandente

non vidi

*Pagopyrum Polygonum* foliis cordato-sagittatis, caule erecto, sculo inermi, seminum angulis  
 aequalibus Lin. S. V. pag. 379

*Oryzum cereale* Tabern. hist. 646.

*Oryzum cereale*, foliis hederaceo Bauh. Pin. 27.

Habitat in Alpibus

Caule glaber pedalis fructus. folia petiolata attenuata sesquipedaliana,  
 basi latitudine et longitudine aequalia, suprema sessile pedunculati  
 axillares et terminalis. basi racemosa, supra inflorescentia terminalis  
 racemosa corymbosa, axillari racemosa. stipula brevis caule ante ad  
 pressa