

Polymnia

Corollula radii ovata tridentata

Calyc. 5 phyllis. Recept. paleaceo. Semibus obovatis nudis

vide off. no 142.

Canadae Polymnia foliis alternis hastato pinnatis Am. ac. 3. p. 15. T. 1. fig. 5 *

Habitat in Canada 2

Caulis humano altitudinis, crassitie calami asperius, varie ramosus, ramis alternis, senioribus longioribus, pilosus. Folia alterna, secundum nervos subvillosa, consistentera sonchi, figura Osteospermi, suaveolentia. Ramorum folia triangula hastato subdentata, petiolata, summa foliola linearia. Flores subtundi, in pedunculis terminalibus ramosis. Am. ac. uti tota planta pubescenti: viscidus odor in gravi

Caulis herbaceus, villosus. Folia petiolata ovata, dentata, interdum alca triloba hastata, alca subtriloba angulata, alia sive loba alca pinnatifida: pinnae lobo lanceolata, indivisa: laciniis attenuatis dentibus mucronatis, interdum laciniis uncinis subpinnatifida, terminali: major hastato triloba, in aliis ovata integerrima. Flores subtenduntur herb. Rich. Folia alterna, petiula magna breviter petiolata inferiora utraque latee biuncis pinnata; laciniis infime multos minoribus hastato divergentibus, suprema maxima triloba superiora subhastata triangulata, omnia repando subdentata, subtus reticulata venosa nervis pubescentibus. Flores versus summitatem ramulorum, coarctati, fasciculati. Calycis foliola ante anthesin imbricata, apicibus inflexis, dupliciter seri, 5que exteriora lanceolata, longiora, interiora ovata. Corollulae radii 7-10 regulata, viri exserta; ligula alba, infida: laciniis oblongo lateralibus minus recurvis, tubus deorsum pilosus, & stamens longiora hypogynis interfor- mei laciniis ovata margine glandulosa, tubus filiformis, globosus, basi sub-

to incurvatus. Styli tadii apice bifidi; corollula parum longior. Germen obovatum
compressum glabrum, apice parum angustatum. Pappus nullus. ♀ antheris corollula lon-
gior, germen inane, apice incurvatum, gracillimum. Recept. compositum paleatum
cum: palea externa lato-ovata viscido pubescente, interne obovata, inti-
mo membranacea, oblonga, omnes breves acuminatae; nervosa, superne leviter
laevio fimbriata, longitudine corollae. Reicheid

maculata Polymnia foliis oppositi connatis polymorphis caule sulcato
maculato Cavan. ii. vol. 3. pag. 14. tab. 227.
Habitat in Nova Hispania

in eodem ac Uvedalen

Uvedalia P. foliis oppositis hastato sinuatis. Lin. S. V. pag. 1.

Chrysanthemum virginianum perenne majus, platani orientalis folio Monf.
hist. 3. p. 22. f. 6. 7. 7. fig. 53.

Chrysanthemum angulosi platani folio virginianum Plukn. alm. 99. V. D3. f. 3

Habitat in Virginia 4

Caulis sulcatus villosus folia opposita petiolata basi valde
attenuata et per petiolum decurrentia ovulo armato pilis uncti
diffusa sinibus obtusi lacinae ovato subdentate scabra
pedunculi terminalis villo dense villosi incani. foliola
calycis oblonga inermis

Tetragonotheca P. foliis oppositis frathulatis subdentatis L. V. p.
~~Tetra gonotheca~~ ⁱⁿ ~~Donnellii~~ ^{matami} folio Dell. Cat. 370. 4. 203. fig 65.
Tetragonotheca helianthoides / spec. pl. p. 1273

Habitat

Folia radicalia petiolata oblonga ovata dentata dentata
venosa glabra. Caulina opposita sessilia lanceolata ob
longa.

^{dentata}
folia radicalibus petiolatis oblongis caulinis sessilibus
lanceolatis

abyssinica Pol. foliis oppositis sessilibus oblongo lanceolatis subdentatis, calycibus quinque
partitis, flosculis omnibus seminiferis Hort. Kew. 3. p. 269

Polymnia abyssinica L.

Habitat in Africa ♂

non vidi