

Polypodium

ebeneum Polypodium

Habitat in Madagascari Commerson herb. Musc.

Stipes niger, uti costa pennarum, crassitie penna anserino, inter frondis loric
glaber: Truncus subbipinnatus: foliola alterna, fere pedalia, attenuata: pin
nae pollicares, inferiores longitudinaliter adnatae, superiores confluentes, alter
nae linear-lanceolatae, obtusissima, glabra, nervis bipartitis, altera bifida
exterioribus obsolete ferrata. Puncta fructificantia, alterna, prope costam
frequentia, solitaria, in membrana ferruginea, tripartita, inclusa

tuberosum Polypodium

Habitat ¹ herb. fr. sp.

Radices fibrosi, Paleae subulatae, tuberi globosi peso duplo majoribus paleis per
regineis hirsutis. Emendationes sequuntur Vaito, subreiformi
exactato affini

Polypodium

Habitat in Anglia Francia Comites herb. Guss.

Fronds ~~pinnata~~: Pinnae breves, petiolatae, alternae, distantes, 5-6 pollicares
exteriorum minores, lanceolatae, basi superiorum obliquae, inferiorum retundatae
obtusae serratae. Puncta senaria
accedit ad Plum. fol. tab. 112. ad dexterum

Polypodium

Habitat in insula Borbonia Commeson herb. Gu.

Fructus paleis subulatis adpressis hirsuti. Stipites plures, palmares vel
paucissimi ultra, frondes lanceolatae, pennatae fide: lobi lanceolati, alterni
acuti vel obtusi, intermedii unguiculares, superiores et inferiores decies
ter, infimo ^{pinnata} triangulari, rotundata. Sines junctum utrinque ad costam
pinnula alterna superficem fere tegenda, bis singula membrana nulla.
affinis suspensa.

Polygodium

Habitat in insula Francae Communi herb. hup.

Stipes cum fronde bipedali, altero latere convexo; basi hirsutus, sursum paleis
copiosis, infimo lanceolato, attenuato, bipollicares, sursum sensim angustio-
res, deorsum in fetis mutatis, Petiolis paleis fetosis hirti. Fronds bipinnata: pin-
na lanceolata, pollicares ex trospira sensim breviores; breviter petiolata,
acuta, pennatifida ⁱⁿ infima; lamina oblonga, acuta: in fimo extrosum
dentata uno alterove, extremo remota serrata, utroque fetis raris ferrugineis
adpressis, supra hirta. Nervi punctonum longitudinales ^{ad} in costa, alter-
na rita, distantia. Squama or biculans, centro fusto margine pallidore

Polypodium

Habitat Cambois hie. huf.

^{per pennatum}
Petioli semiteretes, rubro, paleis, striatis adpressi. Pinna pennatifida lanceolata, petiolata, rubra, glabra, obtusa, apice dentata, inferos semunquiu-
lares, terminalis attenuata, lanceolata, incisura serrata: laciniis obovato-
latere extenore 4. 2 dentata dente inferos fructifero. fructu feracis penna
in suphis

Aspidium Polypodiaceae

Habitat in superior Canada herb. Rich.

Rich.

Polypodium

Habitat in insula francis Commerson herb. Thonai

Surculi umbriati paleis lanceolatis vultu attenuatis crassitie pennis angu-
natis. Frondes petiolata, integerrime, glabra, steriles oblongae semipollicares
fertiles lanceolatae. Fructificationis solitariae mediovisi membrana nulla
affine heterophyllo

Oppositum Polypodium

Habitat in Domingo herb. Thourini

Stipites angulati; pubescentes. Frons pinnata: pinnae fissiles, oppositae, superiores
coherentes, 3 que pollicares, attenuatae, pinnatifidae, extima profunda ^{remota} & serrata.
Laciniae lanceolatae, obscure crenatae, subtus pallidiorae. Pinnae fructi-
ficantia prope costam distantia, alterna, absque membrana.

obtusatum Polypodium

Habitat in Madagascar herb. Thourin Commerson

Stipes niger, utriusque costae, glaber nitidus. Frons subbipinnata. Soliola lanceolata
in, pithamosa, attenuata; juncturae cohaerentes, lineari lanceolatae, proli-
ces obtusissime, glabrae, utriusque obsolete crenatae, glabrae, nervis bipartitis.
Functio fit uterque puncta utriusque prope costam fere simplici, in pitho mem-
branaceo demum lacero

pyramidale Polypodium

Habitat in Domingo herb. Thourini

Rachis e paleis angustis ferrugineo tomentosa. Frons bipinnata: pinnae
ceolata, acuta, serrato-incisa, dentibus acutis, glabra, vix semipollucari.
exteriorum minores, membrana nulla. Ornificationes demum totam pinnam
tegentes, pinnas serie utrinque ad costam.

radicans Polypodium

A habitat in St. Domingo herb. Thonini

Frons pedalis et ultra, apice radicans, pennatifida: pinnae inferiores et superiores sensim minores, ovatae, intermedia lanceolata, bipollicares, dentata: dentibus ovatis acutis, Costa et nervi villosi, nervosa. Sicutificationes ^{lineares} ad costam singulae costae partialis ad apicem dentium costa dentium pennata, membrana nulla

Polypodium

Habitat in St. Domingo herb. Thauri.

Fronds pedalis et ultra, linearis, glabra, integerrima. Puncta fructifican-
tia solitaria membrana nulla.

linearis Duxi. Adest vero in flor. Japonica Polyp. sub hoc nomine

Polypodium

Habitat in St. Domingo herb. Desfont.

Stipites *Spithamei*, filiformis, inter frondes villosi. Tronco pinnata: pinnae rot
semitrilocatae, interiores et exteriores minores, lanceolatae, angustae, acutae, mar
gine subrepandae, ope lentici interdum puto uno alterove in margine. Fructif
cationes serratae. Membranae nulla

Polypodium

Habitat in Insula franco herb. Desfont.

Stipites bipedales, teretes, glabri. Sponsa pinnata: pinnae sesquipedales, sequi pollicari
caesi; interiores et exteriores breviores; subobovatae, rigidae, inferiori opposita,
lineari-lanceolata, subserrata, glabra, nitida supra, ciliolata, revoluta, sub
tus uti stipites villosi, rufescentes. Trunificationes fenestratae, membrum nullum

Polypodium

Habitat in Cap. b. per Herb. Dufrenoy

Stipes acuta subtrigonus, villosus. Eriis subbipinnata: foliola ex trochaem
sum decrescentia: pinnae lanceolatae, obsolete serratae, glabrae, vix simpliciter
cuneae, costa villosa, nervi transversi remoti, simpliciter, in medio fructificantes
fructificationes simpliciter, membrana nulla

acrostichoides Polypodium

Habitat in Carolina sylvis Richard.

habes

Polygonum

Plum filic. tab. 72?

Habitat in America herb. Desfont ^{femineus} ^{real}
Affine Conchitide. Stipes pedalis, e paleis lanceolatis subciliatis, hirtis. Bractea
pinnata: pennis breviter petiolata, alternis, ovatis, vix semipollicari. Inanula
res, inferiores et superiores sensim minores, acutae, serratae, rigidiuscula, supra gla
bra, subtus pubescentia: serratura acuta. Emulsi-formationes ad marginem utriusque
membranae nullae

marginal Polypodium

Habitat in Armenia septentrionali herb. Ruth.
Hypocotyle supra sulis ~~erant~~ us, paleae fuscatae, lanceolatae, etiam in
des foliola inferne. Solida breviter petiolata, bipinnata, lanceolata: pin-
nae lanceolatae obtusae extenore confluentes, integerrimae, internodii infer-
ne crenatae, majores semipollicares, Emittit fructus ad marginem tanquam
duos, contiguos, membrana reniformis

Canopem Polypodium

Habitat in Carolina nuper herb. Michx.

habeo

Polypodium

Habitat in Lyna herb. Desfont.

Stipites paleacei, profusum inter frondes. Eorum bymnata: pinna ovata sublan-
ceolata, serrato-incisa, vix semi-pellucens, glabra: segmentis 2-5 dentatis acuti-
bus. Eruet. sic atheris in apice serraturae foliis ano. Membrana orbiculato reniformis
tecta.

Polypodium

Habitat in Cap. b. spec. herb Desfont.

Stipes pedalis et ultra, supra sulco profundo, glaber, nitidus; paleae setosae
hispidae, uti petioli. Frons bipinnata: pinnulae lanceolatae, incisopinnatae
subpinnatifidae, acutae, glabrae, nitidae, semipollicares; extus versus uti foliola
sensim minores. Emarginatae 1^o in singulo dente ad basin incisurae, mem-
brana fusca tecta.

aculeatum P. sordibus bipennati: pennulis cuneatis ciliatis dentatis
Stipite strigoso.

Filix mas, pennulis latis auriculatis pinnosif. Monf. hist. 3. p. 500

[14. 7. 3. fig. 15]

Filix aculeata major Bauh. prodr. 151. pen. 358.

Filix mas non ramosa, pennulis latis auriculatis pinnosif. Pluch. alm.
152. 7. 179. fig. 6. et 180. fig. 1.

Habitat in Europa.

fragrans P frondibus subbipinnatis lanceolatis: foliolis confertis: lobis
obtusis serratis, stipite palmeo. Lin. Sp. pl. pag. 1550
Dryopteris rubrum Edum. Juran. Ann. vith. 251.
Habitat in Sibiria, Anglia

phlegonidens P. folioli infimis reflectis: pariter pennula quadrangulari
coadunatis

Filix non ramosa minor et sylvestris Pet. et. epist. 56. t. 56.

Filix minor britannica, pediculo pallidior, alis inferioribus deorsum
prostantibus Monf. hist. 3. p. 575. f. 14. t. 4. fig. 17.

Phyllitis minor hispida, pennis variis Act. pet. op. 10. t. 21.

Habitat in Europa Gaesati et Virginia

marginale P. pennis superioribus coalitis. inferioribus ensiformibus sordidum
auriculatis incisis, stipe villosa Thunb fl. jap. pag. 1. V. p. 937.
Habitat in Japonia.

falcatum P. frondibus pennatis: pinnis cordatis falcatis acuminatis
integris, fructificationibus approximatis parvis Thunb. jap. p. 1. V. p.

937.

Polypodium falcatum frondibus pennatis pinnis petiolis latius cordatis
lanicollatis falcatis crenatis: fructificationibus plurimis parvis
Lin. suppl. p. 446.

Habitat in Japonia

rhodice una p. frondibus bipinnatis: foliolis pinnisque remotis lanceolatis
pendulis acuminatis.

Filix rhodice tenuissime denticulata Bauh. hist. 3. p. 740

Filicula fontana major f. *Adiantum album, filicis folio* Bauh.

per. 350.

Habitat in Anglia, Gallia, Helvetia

Pterodes Pol. Grande pennata: pennis alternis canaliculatis incisio serratis:
Serris uni superioribus coalescentibus, fructificationibus marginalibus.
Retz. off. 6 p. 39. 4
Habitat in Ceylona

novboracens. P. pennis oblongis integerrimis parallelis, stipite. Lori
Lin. Spec. plant. pag. 145 & 7
Habitat in Canada

fontanum P. frondibus pennatis lanceolatis: folioliis subtundis argute
incis, stipite lavi.

Filicula saxatilis omnium minima Tournef. cap. 71.

Filicula fontana minor Bauh. pin. 358.

Adiantum filicinum Duriv. Eriophum minimum Barr. ii. 452. f.

fig. 1.

Habitat in Galloprovincia Sibiria.

femelle P. pennis canicollatis integerrimis distantibus supremis minoribus, punctis serialibus

Longitudo altissima. pennuli raris non laciniatis Sloan-hist. 1. p.

77. t. 32.

Habitat in America

Cordifolium P frondibus pinnatis: pinnis cordatis obtusis integerrimis
repandis

Trichomanes folio cordato Pet. fol. 79. t. 1. fig. 11.

Habitat in America

Plum tab. 71.

Stipes Tetragonus. Frons pinnata, pinna petiolata oblonga triangulari
seu, serrulata, obtusis unguicularis, inferioris et superioris minoris, gla
bris, membrana intus papereis. an Asplenium ex herb. Mus.

Triangulare P. pinnis & angulatis dentatis

Trichomanes folio triangulo dentato Pet. fol. 76. v. 1. fig. 10.

Habitat in America

Dispermale P. frondibus pinnatis: pinnis lanceolatis subpubescentibus confluentibus: inferioribus distinctis, punctis grossis.

Lelex jamaicensis Jacq. majoris omula, falcatis foliis integris marginibus aequali Plukn. alm. 154. t. 200. fig. 1.

Habitat in America.

auriculatum P. pennis falcato-lanceolatis serratis: basi truncatis superum auri-

tis

Silene fronschitii apera maxima in domo Platin. alm. 152. t. 30. fig. 4.

Silene reglarica fronschitii fide Bryon. cent. 109. t. 44. fig. 2. Bern

zuyf. 90. t. 44. fig. 2.

Habitat in India

Cicutarium P. frondibus ternatis: folioli bipinnatis basi laciniatis obtu-
se cuneato serratis acuminatis; infimis gibbosis

Polypodium minus triphyllum, foliis profunde divisis, lobis oblongis sublo-
bato-crenatis Brow. Jac. 97.

Habitat in America

exaltatum P. frondibus pennatis: pennis ensiformibus integris, basi inferio-
re introspum, superioribus fimbriatis.

Lonicera glabra minor Plum. amer. 19. t. 20.

Lonicera alba, pennulis ex utroque latere auriculatis Sloan. herb.

1. p. 77. t. 31.

Habitat in America.

Lonchitis l. *pinnis cuneatis ciliato-feratis declinatis, styptibus frigo*
Jus. Sei. pl. p. 1484 fl. Lon. 7. 497.

Lonchitis *aspera* Bauh. pin. 259.

Lonchitis *aspera* major Mont. hist. 3. p. 566. f. 14. t. 2. fig. 1.

Habitat in alpebus Europe, Virginiae

Trifoliatum P. frondibus ternatis sinuato lobatis: intermedio majore hinc

Hemionitis maxima Trifolia Plum. amer. 22. t. 32. fol. 127. t. 140.

Polypodium trifoliatum Pet. w. fol. 10. t. 7. fol. 3.

Hemionitidi affinis filix major Trifida auriculata: pennulis
Catosmii sinuati Sloan hist. 1. p. 85. t. 42.

Filix s. Hemioniti dicta cariborum, amplissimis foliis trifoliata
Pluken. alm. 155. t. 291. fol. 3.

Habitat in Caribis insulis.

unitum P. frondibus pennatis: pinnis ensiformibus serratis serraturis
semioratis ovato-nervosis Lea. S. V. p. 9364

Lilox pyramidalis med. crassipetala elegans, pennulis serratis Petri.
f. maj. 10. V. 1. fig. 59.

Lilox reglarica denticulata non ramosa Buron. Reyf. 90. V. 44. fig. 1.

Habitat in India Trif. Botanico herb. Guss.

Stipites bipedales et ultra, inferne nitidi, superne villosi subtonantofi. Fronds pen-
nato, plano sessiles, alternis, lanceolata, spithamea, attenuata, interiori et
exteriori minoris, terminalis elongata, infimo remoto, demum in squamam
ovalem abeunt, obtuse serrata; serraturis ultimis mucronatis, sulco inter
singula dente, supra nitida; Costa universalis canescens, subtis pallidiora
nervi et margo elevata inter singulum dentem, villosa, nervi obliqui in
singula denticuli, simplices, ovulo armato lucido punctati. Puncta frui-
ficantia parva, conferta ad marginem elevatam dentis, squamula orbicu-
lata tecta
in Ind. Occident. eadem