

Polypodium

Polypodium

Delix non ramosa. Latus dentata minor Plam.

Habitat in America herb. musci

Fronds subbipennata. pinnae cohaerentes, lanceolatae, acutae, fere punctum utrinque ad marginem.

Cruc. quod habes

Asplenium

Plum. tab. 3.

Habitat herb. Tournef.

Ironi tripinnata: pinnulo alterno, oblongo, obtusifido, unguiculares
exteriorum semper minorer, serrato-inciso, serraturia singula subbidenta
ta, glabra, basi acuta. Emittit peritomer cupula in singulo dente parva

Polypodium

Plum-filio. tab 49

Habitat in America herb. musci

Stipites plures, pedales; fusio villosi. Frondes ^{folioli} subbipinnatis, proque pol-
licaria ex dorsum breviores: pinnulo lanceolato, obtuso, venis
trifurcatis serratis, costa villosula

Polypodium

Plum. filic. Tab. 48.

Sp. bitata in America herb. musc.

Hepiter plures

habes

Polypodium

Habitat in insula Jamaica Commercio Herb. Musci

habes

Digitatum Polypodium frondibus simplicibus bifidis trifidisque
Habitat in Cap. b. spec. herb. Royenii

herb.

Polypodium

Habitat in montibus Taro Comnesor Herb. mus.

Stipites basi recti setis fuscis longis, glabri, laxes, pedales. Frons elliptica
concolorata, utraque attenuata, pollices 23 lata, nervi remoti, obscure
reticulata, inter nervos puncta in nervos

Polypodium

Habitat herb. mus.

Fronds tripinnata. Stipites inter frondes villosulo, uti costa subtus: pinnule
coherentes, oblongae, apice rotundatae, cartilagineae, sublineato punctatae
utrinque 3-4 ad pagulum lateri costa. Membrana nulla

Polypodium

Habitat in Puerto Rico Herb. Mus.

6-25 pedales, Truncus fruticosus. Petioli purpurascetes; cavi supra, subtus palea
eui, costa villosa. Frons bipinnata: pinna lineares, obtuse, ext. vixim serrata,
alternatim adnata, unguiculares, subtus villosa. Fructificatione man-
na involuta, series ad singulum latus costae, pinnae.

Polypodium

Plum. fol. tab. 30

Habitat in America meridionali herb. Guss.

Frondes tripinnatae. Petioli glabri, semiteretes, folia attenuata: pinnae
subdecurrentes, unguiculares, oblongae, obtusipinae, nitidae, in iis, in
pinnis obtuse denticulatae. Diminutiones parvae solitariae in sum-
mitate in Syria

Cicutanum Polypodium

Habitat in monte viduo Comnes. herb. Guss.

Stipites laces purpurascetes. Trons bipinnata: pinna ovata, obtusifolia, serrata, serraturis obtusi, infimo subnatis serraturis serratis, unguiculares. Fructificationes seriebus longitudinalibus approximatis magnis ut in Polypodio mosae. Squamula orbiculata fusca testis. supra e regione fructificationis puncta impressa in disco
an Plum. Tab. 36. ? dubito

Polypodium

Plum. pl. tab. 47.

Habitat in America herb. Mus.

Stipes sesqui-pedalis, pubescens. Frons sub bipinnata, pectola inferne opposita, intermediis bipollicariis, inferiori et superiori pinnis minoribus, punctis coherentes, ovata acuta. Emittit fructus maturae confluentes, membrana quantum vidi non dedit.

Polypodium

Habitat Port Praslin

Fronds bipinnate

Stipulis tenes, bipedales, superne, uti costa pinnarum villosis. Pinnae et
pinnulae alternae, pinnae ^{et, rarius utra} pithameae, lanceolatae, extrosum decore
fientes, lanceolatae, attenuatae: lacinae lineari lanceolatae, obtusae, in
tergerrimo, unguiculatae; extrosum minore, ciliata. Puncta fructi
fiantia parva, ad marginem utrunque, distantes, squamula orbiculata
tecta

Accedit ad Sloan 50 fig. 1. ad pinna in hoc magis attenuata

Polypodium

Habitat in insula Juncia Comneso a herb. thes.
Stipes bipedales (cum fronde ut semper) crispate fere panno anserino basi,
convexus, altero latere excavatus, perleis copiosissimis, uti inter fron-
des et pinnas adpressus: fructu ferruginea, membranacea, ovata, sursum
sensim inter frondes angustiores, demum subulata vel setacea. Frons bipin-
nata: foliola et pinnula alterna sex pithamea, denticolata, supra niti-
da, subtus pilis raris albidis, acuta: pinnula ovata, sesquialterae pollicia-
ris, extropium sensim minus, basi extropium latius, inferne subniti-
da, subaurita, denteque uno alterove obtuso, extropium serrato. Serris
punctonum fructificantium ad jugula^{um} costa lateris, distantes, parvos, subop-
posito. Squamula orbiculata, fructificationem tegens in diplo

Polypodium

Plum fol. 22?

Habitat in Puerto Rico herb. Guisf.

Stipites inter frondes villosi, tetragoni, dorso sulcati, angulati. Frons pennata
pinnae per para approximatae, breviter petiolatae, alternae, semipedaliae, polli-
cem lato, attenuatae, subpinnatifidae: lacinae ovatae, inferne versus convexae
obtusae, subciliatae, integerrimae: linea punctorum fructificantium in medio
inter costam et discum lacinarum, parva, membrana nulla
lacinae obtusior quam in figura Plum.

105
Cortium Polypodium

Habitat in Java Comerson herb. Ins.

Stipuli crassae penna asperna, hirsutissimi et pilis fuscis. Stipuli semipedalis
Eronis simplex, rugulosa, pedalis, lanceolata-elliptica, obscure crenata, utraque
acuta, glabra, nervosa: nervi distantes, supra adpressa squamulis numerosis albi-
dis inter nervos, late deciduis, reliquias punctum fuscum, subtus nervos
stata. Series punctorum amplificandium inter singulos nervos transversi
amplificationes senales

immersum Polypodium frondibus oblongo lanceolatis oblongeve obtusissimis basi acutis
^{integerrimis glabris}
 inestificationibus ^{libris} ~~l~~ seriatis immersis.

Habitat in India orientali ad de König

Herpes plures, aggregati, unguiculari vel pollicari, supra planiusculi, sub
 tus carinati, glabri, laxes.

Frondes indivise, tri vel quadri pollicares, ~~in~~ lanceolato-oblongo, ~~passi~~
^{pollicem} ~~est~~ ~~com~~ lato, interdum oblongo medio ~~parum~~ dilatato, ~~pollicis~~ ^{quasi} ~~brevi~~
 lato; integerrima, basi ~~per~~ ^{acuta} ~~per~~ ^{acuta} attenuata glabra, apice obtusissima,
 crassiuscula, ~~in nervosa~~ ~~sub~~ ~~venosa~~ ~~in~~ ~~venosa~~, glaberrima.

Inestificationes ratione frondis magno, in serie duplici longitudinaliter
 digesta, substantia frondis immersa,

~~immersum Polypodium frondibus oblongo lanceolatis oblongeve obtusissimis basi acutis~~

No 17-6

~~Calycis Pentactheum superum, persifiani ^{5 que} ~~quod~~ partitum laciniis cratis villosi
duabus oppositis majoribus acutis altero venim parum longior
Corolla petala quinque subrotunda subvillosa concava intus calycis parum
inacido longiora
Stamine filamenta numerosissima tenuissima corolla longiora.
Nectarium marginis ellipticus germen cingens.
Pistillum germis inferum oblique pentagonum breve villosum foris feli
formis longitudo sine filamentum. stigma simplex acutum
Pericarpium ovum monosperma oblonga tomentosa monosperma coronata
um trilobata margine alavo crasso coronata. Semen plicatum~~

Montferri

Cactia ferruginea Rayana

Polypodiumstellatum

Polypodium frondibus lanceolato-linearibus obtusis integerrimis subtus incanis
 fructificationibus solitariis, surculis reptantibus hispidis

Polypodium serpens: frondibus linearibus obtusis pubescentibus, fructificationibus
 solis serialibus, stolonibus reptantibus Forst. prodr. pag. 81. no 435.

Wedit in Tabernicus

Surculi reptantes, tenues, pili ferruginei adpressi hispiti. Radicula tomentosa.
Stipites parvi, bi f. tripollicares, altero lateri, convexo, altero planiusculo,
 incanis & vili minute ac adpressi oculo armato videndis.

Fronds lineari lanceolata, quadripollicariis, linear-lanceolata, obtusa
 basi parva attenuata acuta, subtus & pili ^{integerrima & plana} vili minute stellatis in
 cana, supra glabra, &

Fructificationes in serie simplicii longitudinali ad marginem, saepe confluen-
 tes, pili vili pallidi vili minuti ferrugineo villosi.

(A Polypodis serpente Swartzii omnino distinct

~~Trichomanes~~

~~Piper reticulatum~~

~~Rami teretes glabri striati~~

~~Folia petiolata alterna ^{lope} spithamo et ultra, cordato-
ovata basi altero late obliqua, obtusiuscula utroque
glabra 7 nervia venosa.~~

~~Petioli pollicari~~

~~Pedunculus opposit. foliis sesquipollicari. Sprea cylin-
drica cuspidi penna columbina. acuta~~

hippocrepis Polypodium

Polypodium hippocrepis Jacq. Coll. 3. pag. 186

Habitat in Amer. merid.

Radix pollicem crassa nigricans squamosa. frondos plures, pedales
pinnato-stipes teres, non sulcatus, inferne paleaceus gracilior
plus minus sordide purpureus ad tendem villosulus. Pinna oblonga
in acumen solum angustata supra vix pilosa, subtus fere glabra
obtusè incisè, opposita utrinque 3-5; infima brevis sine petiolo
ta per dexteram extemur infimam elongatam auriculatam, spalli-
catis duo sequente adnato sessile, reliquis confluentibus. fructifica-
tiones absque ordine sparse semine equine formae villosae

Fraxinifolium Polypodium

Polypodium fraxinifolium Gaerq. Coll. 3. pag. 187.

Habitat ad Paracicas 4

Nadit Vesi ^{pediculi} crispitii calami, nigricans, serpens, paleacea. Funder
plures erant, glabri. ^{in basi} Frons pennata, folioli utroque quinque. Pinnis sessilibus longe lanceola
to, acuminatis repanda undulata secundum nervos lineata intermedia
et terminalis quadripollicare. reliquis majoribus infimo parvis
alberis, summo opposita basi stipitata acuta terminalis per stipi
tam productam petiolata inferne interdum in auriculam
rotundam incipit. Fructificationes sine longitudine quadruplici
subrotundo Gaerq.

multifidum Polypodium

Polypodium multifidum Jacq. coll. 3. pag. 107.

Habitat.

Radix pollicem crassa stipites plures teretes antice sulco, glabri basi
squamis semineis vestiti infra frondem pedales. Frondium scriptio
ne ~~per~~ triangulari, sesquipedali, glabra, triplicato-pinnata; pinnulis
oblongis, semunciales, pennatifida incisivi lobuli oblongi superne incisivi
acuminati. Puncta fructificantes distincta

molle Polypodium

Polypodium molle Gaerth. coll. 3. pag. 188.

Habitat in rupibus udis ad Caracas &

frondes plures bipedales. Stipes teretis compressus; penna asperna
pennaeque pilosior, basi fuscescens; palea ^{et} glabra; ad pennae pubescens. Frons
pennata longe lanceolata. Pinna pennatifida angusta et elongate oblon-
ga, acuminata brevissime petiolata, approximate alternante utrinque
villosa et molles; intermedio longior, trijollivares. Infundibulum magis distan-
ter. Lacinia oblonga obtusa et rursus sensim minor integerrima
excepto infundibulo crenata. Fructificationes in unica serie in utroque
latere prope la lacina profunde parva vellis albi erectis hirtula

quercifolium P. frondibus sterilibus sessilibus brevioribus obtuse sinuatis,
fructificantibus alternis-pinnatis lanceolatis.

Polypodium Andicum Clus. exot. 80. t. 89. Rumph. amb. 6. p. 70. t. 36

Panna-Melengo-Marava Rheed. Mal. 12. p. 23. t. 11.

Polypodium exoticum, folio quercus Bauh. pin. 359. Monf. hist.
3. p. 564. f. 14. t. 1. fig. 15.

Habitat in Andia

aurum P. frondibus pennatis fidis lobatis: pinnis oblongis distanti-
bus: infimis pinnatis; Terminali maxima, fructificationibus seriali-
bus.

Polypodium majus aurum Plum. amer. 25. t. 33. fol. 59. t. 76.

Polypodium maximum Pet. fol. 15. t. 7. fig. 8.

Habitat in America ad caudices veterum arborum.

similem ex Insula francis et herb Mus onoversem.

Cambrium P. frondibus pennatis, fidi: pennis lanceolatis lacero pennati:
fidi serratis

Polypodium cambro bndannicum, lobis foliorum profunde denta-
tis Monf. hist. 3. p. 565. p. 14. t. 2. fig. 8.

Filix amplissima, lobis foliorum laciniatis, cambria Platin.
alm. 153. t. 30. fig. 1.

Habitat in Anglia Mespelii

Dichotomum P. frondibus dichotomis bipennatis: pennulis linearibus in
segni parallelis Thunb. fl. jap.

Telox furcata, pennulis longiusculis non dentatis Plum. Amer.
17. 7. 20. fil. 22. 7. 20.

Telox furcata, vari. foliis Pet. fil. 51. 7. 5. fig. 4.

Aethostichum furcatum: dichotomum, foliis pennatis: pennis
parallelis lanceolatis approximatis integerrimis Lin. b.
pag

Polypodium

Barnes. fl. Ind

Habitat in India

specimen P. frondibus bipinnatis: folioli suboppositis: pinnis alternis
lacinate

Ficus regia, *Fumaria pennulis* Vaill. panf. 52. t. 9. fig. 1.

Habitat in Gallia

Fragile P. frondibus bipinnatis: folioli remoti: pinnis subrotundis catis:

fo.

fl. Dan. 401.

Filix pumila saxatilis 2. Pluf. pan. 706.

Filix saxatilis, cauleculo tenui fragili Pluken. alm. 150. V. 100.

fl. 5.

bulbiferum P. Linnæi bipinnatis: folioli remotis: pennis oblongis obtu-

si: serratis subtus bulbiferis

Tilia bulbifera Poir n. canad. 5: Monf. bot. 3. p. 579. f. 14.

Tab. 3. fig. 10.

Habitat in Canada

marginale P. frondibus bipinnatis: pennis basi sinuato-repandis, fructificationibus marginalibus. Lin. Spei: pl. pag. 155 24
Habitat in Canada

pubescens P. Frondibus bipinnatis pectatis: pinnis lanceolato-ovatis
subincisive acutis: extremis confluentibus

*Polypodium minus puberulum simpliciter pinnatum foliis distinci-
tis subovatis crenatis, capsulis parvis Brown. Jacq. 101.*

Habitat in Jamaica

parasiticum P. frondibus semibipinnatis lanceolatis: Lobulis rotundatis
integerrimis striatis. Lin. Spec. pl. p. 15514
Kari-welli-panna Rhed. Mat. 12. p. 35. T. 17.
Habitat in Andia supra arbori

ranium P. Lonicibus lateralibus bipennatis: foliolo infimo bipennatifido

Lin. Spec. pl. p. 1554

Habitat in China.

crissatum P. Cordibus subpinnatis: foliolis ovato-oblongis: pinnis obtusiuscu-
li apice acute serratis
p. 257. t. 9. fig. 1. Act. Holm. 1707.

Tilix non ramosa major pinnulis latiusculis longioribus: in profun-
dos denticulos divisas Mon. hist. 3. p. 14. t. 3. fig. 11

Tilix mar ramosa, pinnulis dentatis Pluk. t. 101.
fig. 2.

Habitat in Europa septentrionali

f. mas P. frondibus bipinnatis: pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo
her

Filix mas Fuchf. hist. 594.

Filix mas non ramosa dentata Bauh. pin. 350.

Habitat in Europa Sylvis

f. foemina P. fronde bipennata: pennis pennatifidis acutis den. l. V
puz.

Salix mas non ramosa, pinnulis angustis rarioribus profunde
dentatis Monf. herb. 3. p. 579. f. 14. t. 3. fig. 9. Pluken.
tab. 100 fig. 4.

Habitat in Europa frigida subhumida Canada

vulgare P. frondibus pennatifidis: pennis oblongis subternatis obtusis
radice squamata.

Polypodium majus L. od. pempt. 464.

Polypodium vulgare Bauh. pin. 359. Plum. fil. 27. Tab. A. fig. 2.

β. *Polypodium minus* L. od. pempt. 464 Bauh. pin. 359.

Habitat in Europa nunc rarum et sibi in partibus

virginianum P. frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis subpinnatis obtusis
radice lani

*Polypodium radice tenui et repente Plum. Amer. 25. t. 36.
fel. 60. t. 77.*

Polypodium minus vulgare facie Pet. fel. 22. t. 77. p. 9.

*Polypodium virginense minus, foliis obtusioribus Morif
herb. 3. p. 563. f. 14. t. 2. p. 3.*

Habitat in Virginia

Ates P. frondibus pennatis: lobis lanceolatis alternis obtusis distantibus.

Polepodiium Cochitidis folio, minus. Pat. fol. 32. v. 1. fig. 16
Habitat in America.

pectinatum P. Frondibus pennatis lanceolatis: Lobis approximatis angu-

formibus parallelis acutis horizontalibus radice nuda

Polypodium regium Venenius sectum Plum. amer. 26. t. 37.

Polypodium Comitidis folium Pet. fol. 31. t. 7. fig. 14.

Habitat in Jamaica

Saxifolium P. frondibus pennatis. Lobis approximatis ensiformibus paral-
leli acutis ascendentibus, radice hista

Polypodium Tenue et pendulum Plum. filic. fol. 69. T. 89.

Polypodium *Saxifolium* pendulum Pet. fil. 35. T. 14. fig. 1.

Habitat in America meridionali

Polopendroides P. frondibus pinnatifidis lanceolatis: lobis obtusiusculis:
inferius remotis.

Lilix novae-angliae *Polopendroides* Plum. am. 7. t. 11.

Polypodium minus *Appleni* folio Pet. fol. 23. v. 1. fig. 14.

Lilix jamaicensis simpliciter pinnatis *Appleni* folio aversa
parte duplici serie punctorum notatis Pluken. alm. 152.

Tab. 290. fig. 1.

Habitat in Jamaica.

applanifolium P. Frondibus pennatis fidis pelosi: lobis semiovatis acutis
Linn.

Polypodium applanifolium vellosum Petw. fol. 26. t. 7. fig. 16.

β. *Polypodium pendulum subtus vellosum* Petw. fol. 35. Tab. 14.

Fig. 1.
Polypodium pendulum hospiti rufa pubescens Plum. fol.
60. t. 88.

Habitat in America meridionali.