

Pontederia

P. foliis cordatis subrotundis et Menyanthes nymphoides flore albo Plum.

ovalifolia Pontederia foliis ovalibus basi squalibus flenbus-^{ovali subrotundo} pinnatis
Habitat in America meridionali son Pohl n^o 102.
Planta ^{netivola} frithamoa, saginata: vagina medio tumida. Folia
via pollicaria basi subordata. petioli apicem versus
attenuati

an Phrynium

Pontederca dilatata

pag. 80 Tab. 23.

Habitat in aquis Rangoon

Tacit. Pont. vaginalis, et multoties major. Folia ovata, profunde cordata, angulis posterioribus oblongis, obtusis, minime divergentibus. Petioli: dehiscencia spathe formis, ovata, magnitudine ore gallinacei. Flores corulei, corymbosi. Spatha multiflora, oblonga, monophylla, lutea intus dehiscens, petioli dehiscencia opposita. Petala 6. sessile, carinata, duplici serie: tria interiora obovata, obtusa, supremo erecto inferioribus patulis. tria exteriora lanceolata, acuta. Filamenta petali inserta eisque breviora. Anthera laceraeque declinatae, fertiles, ad apicem dehiscentes: sexta inferior, major, sterili diversi coloris. Germen ovatum, torquatum. Stylus cylindricus, longitudine flaminum, incurvus. Stigma obtusum, compressum. Capsula ovata, acuminata trilobulata, trivalvis, tecla carinis petalorum persistentibus, contracti

1 ovata Pontederia foliis ^{ellipticis} ovatis, floribus caputatis
Nanikula Rheed. Mal. 11. p. 67. t. 34. Raj suppl. 573.
Habitat in Malabara aquis 2

Omnes species gaudent radiculis apice vaginula indurata Richard

non vid.

Portidemia

Habitat in monte video. Commerfon herb fust.

Folia radicalia, petiolata, sesqui pollicaria, reniformi rotundata, subis
naeco, enervia. Petiolus tri pollicari vel ultra pyriformis, apice acu
minatus. Flores plures a petio² empuentes superne.

2 rotundifolia Pontederia foliis orbiculato-cordatis Lin. Suppl. p. 1924

Habitat in Surinamo

Folia radicalia, petiolata, reniformia, obtusa, acronia. Solum
caulium unicum, ex cupis petiolo vaginae et pedunculis semi-
seris, digitalis. Spatha monophylla, ovata, persistens, terminalis.
Spadix hispida. Spica pedunculata, ovata, floribus pedicellatis
brevissimis, fere imbricatis in capitulum. Corolla fossida
inaequalis, lacinae et magnitudine floretuli neutri Centaureo Cyani
germen triquetrum. Stylus simplex L. l. c.

3 timosa Pontederia foliis ^{ovatis oblongis} cordatis ovatis, spatibus lateralibus unifloris, floribus
triandris Scher. prodr. p. 97.

Nymphaea affinis planta palustris aquatica flore hexapetala stellata
Comes Sloan. h. l. t. 149. fig. 1.

Habitat in Jamaica, Hispaniola &

scapus caulis crassitie penno columbinae. spatia lanceolata - foliis
vix pollicaria oblonga

Phygnon Banksii

ovalifolia Pont. foliis cordatis ovalibus, flombus spicatis
Habitat in India occidentali

A. *Reichenow*

~~Fraxetens A. umbella subrotunda ramis subulatis, foliis lanceatis
canaliculatis. Gussq. coll. 2. p. 305. pl. rar. ii. Cent. 2 pag. tab 33~~

non vidi

vaginalis Pontederia ^{attenuatis floribus racemosis} foliis cordatis, racemo ~~cornuco~~ ~~floribus racemosis~~ racemo
cornuco Lin Mart 222 * S.V. pag.

Plantaginif. stellato foliis florum picea ex articulo caulis prodeunte
Pluk. alm. 215. t. 215. fig. 4.

Olus palustre Rumph. Amb. 6. p. 170. t. 75. fig. 1.

~~Pontederia~~ ~~gola~~ Rheed. Mal. 11. p. 94. t. 44. ? ~~Canm-gola~~ Rhoeo. Mal. 11. p. 91. t. 44

Pontederia vaginalis foliis ovatis floribus piceatis. Burm. fl. Ind. p. 80

Habitat in India orientalis aquis ?

Folia radicalia, ^{attenuata} ~~attenuata~~, foja basi six sine ex cep, petiolata. ^{sesquipedalana}

Petiolis. Petioli longissimi, interdum semipedales teretes ^{semper} ~~semper~~ ^{attenuati} ~~attenuati~~
ati, basi membrana reticulata varnatis. ^{midia} ~~midia~~ ^{floribus} ~~floribus~~ ^{medio} ~~medio~~

dilatatus longitudinaliter ^{fusis}

^{erectus} petioli simplex, pedunculatus, pollicaris, absoluta florescentia
reflexus. Flores 5-8 glabi breviter pedicellati. Pedunculus longi-
tudo racemi

5- aurea Pontederia foliis subrotundo ellipticis, basi inaequaliter, floribus purpatis

Schw. prod. pag. 57.

Pontederia L. Brown. Jam. 1795.

Habitat in Jamaica

Solia pitthamoia

6 cordata Pontederia foliis cordatis floribus spicatis in L. V. p. 316

Sagittae similis planta palustris virginiana, spica florum conulea Mon. f. h.
3. p. 610. f. 15. t. 4. fig. 8.

Gladiolus lacustris virginianus conuleus, sagittifolius Pet. gar. t. 1. f. 12.

Plantaginis aquaticae quodam modo arcedens, floribus conuleis hyacinthi spica
tis Pluk. mant. 152. t. 349. fig. ult.

Habitat in Virginia aqueis &

Caulis altus teris laxis, folia ~~petiolata~~ ^{con} attenuata ^{semi pedalia}

~~superne petiolo spatha basi spathateo dilatata caulom~~ ^{tripollicari}

~~trier. spatha lanceolata spica bipollicariis hirsuta~~
Petioli superne versus folium dilatati longitudinaliter fissus ut
in reliquis. Spica pedunculata spithamea. Vagina sub floribus
tripollicariis. flores hirsuti

Liliiforme Athenicum foliis filiformibus teretibus scabris, filamentis glabris,
petalis lanceolatis Hort. Kew. 1. p. 451. 7

Habitat in C. bono p. 24.

Scapus filiformis pedalis, foliis brevior, basi nigrescens, maculis pallidis.

Petala tria, externa intus albida, tria interiora alba, extus linea viri-
di. Hort. Kew. 1. 6.

7 ha stata Pontedera foliis hastatis ^{ovatis} floribus umbellatis Linn. LV flor. Zegl. p. 94 +
S.V. pag. 316

Sagitta quodam modo simili planta madagascariensis, floribus medio caule
quasi ex tuberculo prodeuntibus Pluk. alm. 226. fig. 8. Mon. h. 3. p. 610
p. 15. t. 4. fig. 7.

Habitat in India Orientali &.

halmam late

Folia spithamea auriculo rotundata, divaricata interdum emar-
ginata. Petiolum medio vertice ^{pa}lo. Coleolum spatheum lanceo-
latum acuminatum. Flores plurimi in capitulo conconferti
in umbella hemisphaerica

non completum.

Specimen aliud floribus racemosis, foliis magnitudine hastatis at minus
late eadem

an Flores racemosi

10 Sagittata Pontedena foliis sagittato ^{Canicologu hb} floribus umbellatis
Pontedena sagittata: foliis hastatis floribus umbellatis Lin Suppl. pag. 192. &
Habitat in Cap. bona spei et Malabana &

Folia bipolliciana et ultra, attenuata. Petiolus versus folium valde
dilatus, vagina superne angustior. Flores ~~subpicati~~ ^{speciosi} per
racemus peracta ^{Racemus pedicellis approximatis in subumbellatis sub sesqui pollicia}
florecentia reflexa ^{nbis. Spatha lanceolata longitudine racemi}
differsa Bent. spec: pl: foliis triplo angustioribus angulis rectis
nec ad latera divariatis, flores pauciores.

Specimen Pontedena ex And. Orientali habeo floribus speciosis. Folia videntur
esse peltata sed cum basi dilacerata sunt vix dicere audeo
num reversa peltata vel non, a reliquis speciebus certe differat