

Populus

1. alba P. foliis subcordato-ovatis dentato-angulatis
2. tremula P. foliis subrotundis dentato-angulatis, utrinque glabris
3. nigra P. foliis deltoidibus acuminatis serratis utrinque glabris: diametro longitudinali longiori.
4. dilatata P. foliis deltoidibus acuminatis serratis utrinque glabris: diametro transversali longiore.
5. balsamifera P. foliis ovatis serratis subtus albidis, stipulis resinosis
6. candicans P. foliis cordatis acuminatis subtus albidis subtriplicinerviis, stipulis resinosis, ramis teretibus
7. longata P. foliis cordatis trinerviis glabris basi glandulosis inaequaliter serratis, petiolis compressis, ramis teretibus
8. monilifera P. foliis subcordatis glabris basi biglandulosis: serraturis castis teretibus spinosis hamatis pilosiusculis, nervis patulis, ramis compressis
9. graeca P. foliis cordatis glabris basi biglandulosis remote crenatis, petiolis compressis ramis teretibus.

10. heterophylla P. foliis cordatis, junioribus villosis ^{pubescentibus} basi biglandulosis
11. angulata P. foliis cordatis glabris, ramis alatis angulosis ^{et foliis pubescentibus ramis teretibus}

argentea Populus

Habitat in America herb. Desfont.

Rami teretes, glabri, juniores tomentosi, incani. Folia petiolata, parva, sub
cordata ovata, palmata, juniora incano-tomentosa, adultiora glabra, sub
tus pallidiora, venosa, obtusa. Capsula oblonga, rostrata, subtuberculata.

1 alba P. foliis subrotundis dentato-angulatis subtus tomentosis. Lin. 1. V
per

Populus alba Dod. prompt. p. 35

Populus alba fo. majori bus foliis Bauh. pin. 429.

Habitat in Europa temperationi 5

Rarai Vertes canescenti superne tomentosi cani uti folia subtus

Folia inequaliter dentata dentibus apicibus fuscis, parum
acuminata; veno supra tomentosa ciliata

a canescens foliis angulatis dentatis subtus tomentosis cineriscentibus
β. fivea foliis sublobatis dentatis subtus tomentosis nives. Lobis
acutis patulis

foliis subcordatis-oratis dentato-angulatis

Athenaea Populus

Habitat. herb. Desfont.

Rami teretes, glabri, fusco-purpureo-ferentes. Folia petiolata, alterna, sequi
pollicaria, eglandulosa, ovata, glabra, acuta, aequaliter serrata, basi ver
sus integerrima, subtus glaucescentia. Petioli compressi, folio parum
longiores.

Tremuloides - Populus

Habitat in Carolina herb. Ruck.

herb.

ruvea P. folis subtrilobis dentatis, subtus tomentoso ruveo. Colis acin
& inflorescentia patulis Willden. berl. baumz. pag. 227

Populus major Mill. Diet.

Populus alba ruvea H. Kew

Populus alba Pall. fl. ross.

Habitat in Persia Caucaso Europa australi.

2 Tremula P. foliis subrotundis dentato angulatis utroque glabris Lin. S. V. p. 389.

Pucci. pl. pag. 14644

Populus tybica Dod. rem pt. 136.

Populus Tremula Bauh. pin. 429.

Habitat in Europa frigidioribus.

Stipula involuta basi interne glandula duplici. Lu

in herbario desideratur

2 *negra* P. foliis deltoidibus acuminatis serratis An. Spec. pl. pag. 1464.

Populus nigra Dod. pempt. 336. Bauh. pin. 429.

Habitat in Europa temperatae &

negra P. foliis utrinque glabris acuminatis serratis deltoidibus: diametro
longitudinali longiori Hort. kew. 3. p. 405

4 Delatata P. foliis utraque glabris acuminatis serratis deltoidibus: diamete
tro transversali longiore Hort. Kew. 3. p. 406.

Habitat ad Cap. b. in Italia

Rami glabri erecti superne angulati. Folia ^{basi glandulosa} petiolata basi
sepe transversa, subtripollicaria acumine obtusiusculo, serr
tuni subglandulosis angulis basi rotundatis

5 balsamifera P. foliis ovatis serratis subtus albidis, stipulis resinosis Linn. Sc. V. p. 209

Taiamahaca foliis crenatis Plukh. alm. 360. t. 201. fig. 3.

Populus foliis ovatis acutis serratis Gmel. Sib. 1. p. 152. Tab. 33.

Populus nigra, foliis mastimo, geminis balsamum odoratissimum glandentibus
Luham. arb. 2. p. 170. t. 30. fig. 6.

Habitat in America septentrionali

Rami & caetera glabri inferne cortice cinereo nitido. Sola
petiolata ^{rupta glabra}, acuminata saepe palmata serraturis obtusiusculis
crassiusculis basi versus saepe integerrima. Stipula lanceola
40

6 *Candicans* P. foliis cordatis acuminatis subtus albidis subtriplicinerviis, stipulis
repropiis, ramis teretibus Hort. Kew. 3. p. 406.
Habitat in Canada

7 *Coryata P. foliis cordatis trinerviis glabris basi glandulosis inaequaliter
serratis, petiolis compressis, ramis teretibus Hort. Kew. 3. p. 206.
Habitat in America septentrionali* }

non vidi

o monilifera P. foliis subcordatis glabris basi biglandulosis: serratis Castilagi
neis hamatis pelosiapiculis; nervis patulis, petioli compressi, ramis
Veretibus Hort. kew. 3. p. 406.

Habitat in Canada

3 dentes remoti obtusi folia ovuminate utraque glabra

9 graeca *P.* foliis cordatis glabris basi glandulosis remote serratis, petiolis com-
pactis ramis teretibus Hort. kew. 3. p. 407.
Habitat in Insulis archipelagis &

non vidi

10 heterophylla P. foliis cordatis: junioribus villosis. Lin S.V

Populus magna, foliis amplis: aliis cordiformibus; aliis subrotundis:
junioribus tomentosis Gron vuy 157.

Habitat in Virginia 5

pubescentibus basi biglandulosis
petioli subtentibus, ramis tentibus

det in herbario

11 angulata P. foliis cordatis glabris, ramis alato-angulosis Hort. Kew. 3. p. 407.
Populus magna virginiana, foliis amplissimis, ramis nervosis quasi
quadrangulis Dideramel. tab. 2. p. 170. t. 39. fig. 9. mill. Det.
~~Habitat in Carolina Populus balsamifera Dideramel. tab. 2. p. 170.~~
~~tab. 39. fig. 9.~~
Habitat in Carolina t

canadensis P. foliis cordatis crenatis eglandulosis Mönch-Weisheit. p. 93
01.

non vid.

carolinensis P. foliis cordatis crenatis supra glandulosis anteriori integerrima
Moench. Weiffenst. p. 11.

non vidi