

Prostema

Porosteme

Sanguinea

~~Nectandra~~ foliis alternis lanceolatis: antheris quaternis ~~lanceis~~ colla-  
teralibus ~~Rottb. d. j. pl. Sur. pag. 11.~~ apice antheris 4 parallelis colla-  
teralibus ~~Rottb. d. j. pl. Sur. pag. 11.~~  
Habitat Surinami &

Arbor ramosissima. Rami alterni, teretes striati purpurei, ramulosi.  
Folia alterna subsessilia, patentia, lanceolata glabra acuta  
integerrima, 6-nervi venosa subtus venis et striatis reticula-  
to. Racemi pedunculati terminalis et axillares laterales: com-  
positi foliis brevioribus. Flores parvi. Corolla latere interiori pulve-  
nula. antheris quatuor in apice styli antheris 4 in unum  
fere Rottb.

Nectandra sanguinea caule diffusis, foliis alternis lan-  
ceolatis; antheris collateralibus Rottb. d. j. Sur. pag. 11.

non vidi

*Persea*

*bijuga* ~~Nuttall~~ foliis ovato-lanceolatis acuminatis, floribus polygamis  
nectariis squamis oblongo-linearibus antheris biseriatis

*Nuttallia* *bijuga* foliis ovato-lanceolatis acuminatis, racemis  
filiformibus, floribus polygamis, antheris biseriatis Nutt. *Transp.*  
Vol. pag. 12.

Habitat Surinami

Caulis arborum. Rami glaberrimi patentissimi teretes alterni  
et nigro-purpurei. Folia alterna breviter petiolata patentia  
ovato-lanceolata, integerrima costa, reticulata 4-5 pollicares.  
Racemi filiformes flores minores atropurpurei. Squamis nectariis  
tunicato Nutt.

*ocotea* Aubl. fl. gu. pag. 700 hujus generis esse videtur obstat  
tantum fuit Roland. Supra Aubl. cap. polypp. 4-6 *Coccoloba*  
specie tamen diversa dicitur omnino

non vidi

Guanerpi Ocolea

Ocolea guanerpi Aubl. fl. gu. 2. p. 700 Tab. 10

Habitat in Cayenne Dedit Richard

non vidi

Roma

Cal. communis part. sui. Collula monoxetala supra receptaculo commune  
grae. Ca. pp. a. permo

1. umbellata P.