

Portulaca

4 Capsulis cinamensis

1. oleracea P. foliis cuneiformibus axillis ^{naevi} geniculisque nudis, floribus ^{sesquilebibus}
2. humilis P. fruticulosa, foliis cuneiformibus, axillis longe pilosis
3. pilosa P. herbacea, foliis subulatis ramisque alternis, axillis pilosis floribus ^{terminalibus}
4. lenifolia P. herbacea, foliis subulatis axillis pilosis, caule prostrante floribus solitariis ^{in dichotomia}
5. quadrifida P. foliis oppositis oblongis, caule geniculis pilosis, floribus ^{quadrifidis}
6. mendiana P. foliis ellipticis carnosissimis, geniculis pilosis, floribus ^{terminalibus} ^(an a precedente diversa)
- + 8. anacampsis P. foliis ovatis gibbis, pedunculo multifloro, caule frutescente
7. halmoides P. foliis oblongis carnosissimis, caule corymbose, floribus ^{sesquilebibus}
- + 9. triangularis P. foliis obovatis planiusculis, racemo simpliciter triquetro ^{valeribus}
10. crassifolia P. foliis lanceolatis planis, racemo triquetri, caule erecto
11. cuneifolia P. foliis cuneiformibus

fruticosa. P. foliis obovatis planiusculis, pedunculis racemosis, calycibus
pentaphyllis, caule fruticoso erecto

decumbens P. foliis mucronatis, calycibus pentaphyllis, caule densi-
fruticoso decumbente

cuneifolia P. foliis cuneiformibus, pedunculis saepe natis racemo trifloro
calycibus diphyllis floribus

patens P. foliis obovatis planis, panicula ~~ramosa~~, calycibus diphyllis

patens Portulacca foliis lanceolato-ovatis, planis, particula ramosa, calycibus di-
phyllis in l. V. pag. 446.

Habitat in Montserrat ab Ryan.

Folia inferiora cuneata.

Pedunculus terminalis, pedalis & ultra, basi foliis nonnullis albionis.
Cancibus lanceolatis, purpureo-roseo striatis.

260

~~Erullon Epidemion~~

montserrat

101 *pelosa*
halimifolia ~~Podulacis~~ *flores terminalis*
Montserrat *halimifolia* differt axillis nudis

102
sonora *Hernandia folia peltata* vel petiolus ^{et basi} ~~apice~~ *foleorum*
Montserrat

103. *arborescens* *taiquinia* an *abasmullari* diversa nisi altitudine
Montserrat

quadripida Portulacica

Aizoides Potularia

Habitat in monte video Commenon herb. Thaurini
Caulis lanuginosus. Folia glabra, ovata, rubentia

habes

Linifolia Portulaca

Herb. maj.

Caulis erectus, ramif. rami teretes, glabri, uti tota planta. Folia
parva, linearia, sesquipedalana, carnosae, basi parum dilatata,
pedunculi laterales et terminales, elongati, subhamis, teretes
glaberrimi, apice trifidi vel bifidi. Bractea sub flore orata,
membranacea, attenuata

Portulaca

Habitat Pondichery Herb. Mus.

Radix tuberosa - Caulis plures, digitatis, ramosi - Folia linearia,
alterna, glabra, unguiculata. Axilla villosa - Flores Vermi-
colores, solidari, basi cuncti folio semis lineari bus, pili int et folio

Portulacica

Portulacica sedifolia flore albo Treville

Hab. et in hema herb. Guoj.

Tota herbata. Rami copiosi, teretes, oppositi. Folia linearia, carnosia, semi
unquiculata. Flores in apice, ut in Port. pilosa

oleracea *Portulaca* foliis cuneiformibus, floribus septem. Lin. 1. V

Portulaca angustifolia sylvestris Bauh. pin. 280.

β *Portulaca domestica* Lob. ic. 300.

Portulaca latifolia sativa Bauh. pin. 280.

Habitat fere per totum mundum 0 ^{Dichotomis}

Caulis decumbens glaber ramosus, glaber uti omnia rami
folia oppositi folia alterna, unguiculata. flores

nervi in dichotomis et opice

ex inflorescentia peltata digitali ramosa, rami inferne
dichotomis superne alterni

utitur describenda

aculeata G.

Thalimoides P. foliis oblongis carnosis, caule corymbose, floribus sessilibus. Lin. b. v

Portulacca erecta, sedi minori facie; capitulo tomentoso Sloan. herb.

1. p. 205. t. 129. fig. 3.

Habitata Jamaica

Calyx diphyllus. Capsula circumscissa

non vidi

^{geniulis hirsutis fere}
2 humilis P. fruticulosa foliis cuneiformibus axillis hirsutis fere
Habitat in Borussia 4

Fruticulus ramosus rami digitales e pulis longis in axillis
hirsutis fere. Folia sessilia alterna unguiculata glabra
carnosa. Flores terminalis solitarius cunctis foliis pluri-
mis ut in pulosa

3
pilosa P

foliis subulatis alternis: axillis pilosis, floribus sessilibus terminalibus
Lin. spec. pl. pag. 6394 L. V

Portulaca carasfavea, angusto longo lucidoque folio procumbens Comm
hort. 1. p. 9. t. 5.

Portulaca carasfavea, lanuginosa procumbens Herm. parod. 215. descript

Portulaca lanuginosa procumbens vermiculata foliis americana

Plukin. alm. 304. t. 247. fig. 7. Volkh. Nonb. 341. t. 341.

β. Portulaca carasfavea lanuginosa, basi folio, erectior elatior Plukin
alm. 303. t. 105. fig. 4 et 247. fig. 6.

Portulaca carasfavea lanuginosa, pphyllis folio, erectior et elatior,
flores dilabens rubente Herm. par. 214. t. 214.

Habitat in America meridionali ☉

Folies alterne, Terminalia p. floralia ☉. in orbem digesta
flores sessiles Terminaliter, calyce bifido. Stamina 5. stylo
quinguefido. Capsula circumscissa

rami alternis a Portulaca uni folia differre videtur

elata. C. G. P.

altissima Ach.

4. lineifolia P. Caule prostrato dichotomo gemulis pulvis, foliis linearibus
subulatis, ^{oppositis} floribus in dichotomia ^{et terminalis} pedunculatis
Potulacaea lineifolia: foliis linearibus lanceolatis, oppositis, ruben-
tibus: margine reflexis; gemulis basi hirsutis. Toth. Defor. pag.

92.
Habitat in Arabia.
Calyx 2-phyllus. Stamina 4-5. petala 4-5.
Calyx unctus folio plurimum ut in pulvis cui facti femulis
an mera varietas

5 quadrifida P. bracteis quaternis, floribus quadrifidis, caule geniculis pilosis Lin
Mant. 113. * S.V. p. 445. Jacq. coll. 2. p. 356. t. 17. fig. 4.

~~Portulaca laevigata procumbens, flore luteo Heron, p. 216~~
Sedum minus arabicum, flore luteo foliis planis mucronatis Plukh
Mant. 169.

Habitata Agypto ☉

Caules siciformes repentes articulati ramosi diffusi. Rami
oppositi geniculis pilis barbati. Folia opposita sessilibus
oblongis, acutiuscula, vix seminaqueiculata. Flores terminales
sessiles flavae

— oblongis

Portulaca imbricata Forst.

quomodo a meridiana diversa.

arabia P. calycis Tetraphyllo persistente Forst. Desir. pag 92
Habita in Arabia

non vidi

Canata *Portulaca* humi fixa caulebus vellosissimo Canati foliis lineariibus con
ferti floribus terminalibus simplicibus Act. pi. h. nat. Par. 1. pag
109 q.

Habitat in Amer merid.

non vid.

6
meridiana P. foliis ellipticis carnosis planis, geniculis pilosis, floribus sessilibus
terminalibus Lin. Suppl. p. 240. + L.V. p. 446.

Portulacca Curasavica lanuginosa procumbens Herm. parad. t. 215
non vero descriptio

Habitat in India orientali ☉

Pauli statura sedicini, filiformis, herbacei repentes articula
ti, ramosi, teretes, laevi, rubentes. Genicula pilis ali
quot adpresso, radiantis. Folia laeva, terminalis
opposita, etiam quaterna. Flores lutei terminalis solita
rarius sessiles cincta lina foliisque quatuor. Ploxy bivalvis
Stamina 4. ☉.

non vidi an a prodeunte diversa

nota: Genus Portulacae in duobus dividitur a Linnæo et alio, et ut vide-
tur, jure, facie enim omnino diversa sunt varii Portulacae n. Cad 24.
nec minus differunt calyce ideoque commode distinguuntur

Portulacae Capsula circumscissa
et Anacampteros vel si nomen Adansonii placet: Talinum Capsula
3-f. 5-valvi