

Potamogeton

Stratum P

Potamogeton Stratum foliis linearibus Stratis, caule compresso, floribus spicati
fl. Peruv. Tom 1. pag. 70 tab. 106. fig. 6.

Habitat in aquis vivis limo.

Caulis alternatim ^{angustus} dichotomus, Stratus, compressus. Folia vaginantis, obtusa, cum
acumine brevissimo, alterna, nonnulla et superioribus opposita. Vagina
membranaea ad basin fissilis. Pedunculi axillares, longi, solitarii, pauci
flori. Flores spicati albo lutescentia fl. Per:

natans. *P. foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus* Lin. S. V. p. 160. Polluk. h. pl. 7. p.
170*

Potamogeton rotundifolium Bauh. pin. 193.
170*

β. *Potamogeton foliis lanceolato-oblongis, petiolis longis* Gron: Viny. 139.
Habitat in Europa lacubus et fluviiis

Caules longi teretes, geniculati superne in aliquot ramis divisi.

Folia aeterna, angustiora in petiolum definentia, suprema opposita

natantia petiolata oblongo-ovata, acutiuscula integerrima, nervosa

Petiolis supra
plani 5 polli
Cares
bis tripollicaria. Hipula lanceolata, convexiuscula, splendentes alba
Pedunculis ex summitate caulis, tri pollicari. Spica cylindri
ca, bipollicari. Flores sessili sbracteati

natantibus oblongo ovatis petiolatis ^{oppositis} inferiora linear-lanceola
tu alterna

Potamogeton foliis superioribus ovato oblongis inferioribus ellipticis lanicollatis
omnibus in petiolum attenuatis

Habitat in aquis stagnante stagnis haud profundis Hoffmanno, Zorn
Caulis simplicis, racematis vel peltatis. 11

Radix repens articulata: articuli tres ^{et} 3 pollicares, albi crassitie ^{per}
emporetici. ^{retrolati} folia ~~omni~~ petiolata superiora ovato-oblonga, opposita

obtusa, multinervi, reticulata, plana intermedia conferta ^{per} 3 pollicaria
inferiora saepe similia interdum elliptica lanicollata, plerumque

longiora in petiolum attenuata. Stipulae vaginantes, caulium ante
amplectentes membraceae tenues inferiori longitudine articularum super-

ioris breviores: pedunculorum caetero unguiculares lanicollatae. Pedun-

culi terminalis ^{et} ~~ag~~ illi ^{ult} ~~im~~ ^{is} plerumque ^{et} ~~ag~~ illi ^{ult} ~~im~~ ^{is} solitarius, bipollicaris

specia pollicaris floribus copiosis confertis. Petala obovata concava
Hamina ~~et~~ Petala ad fructus usque congenera

articulati articulis inferioribus pollicariibus superioribus 2-3 pollicibus

frax

heterophyllum Potamogeton.

Comose in ~~fragnis~~ ^{aquosis} haud profundis Hoffmanno zona et Canada herb. Guss.
Radix repens articulis sepe ovatis crassitie penno asperano ungui-
culantibus vel subteretibus simplicibus crassitie penno columbi-
ne. Caulis erectus semipedalis, ramosus ~~rami alterni aut articula-~~
tus interne radicans articulis inferioribus pollicibus superioribus
sesqui majoribus varnati vaginis lineantibus obtusis articulis
brevioribus ^{appressis} superne ramosus rami alterni foliosi teretes crassitie
fili grossiori simplicibus. Folia superiora ovata ⁴ s. que
nervis acuta lat. v. v. pollicana petiolata ^{plana} ~~in~~ opposita
2-4. Inferiora sesquialia lineari lanceolata sesquipollicana
stipula ante vaginam. Longitudine internodiorum supremi
petula. petala spatulata

Centothum Potamo. foliis alternis subulato-filiiformibus.

Centoth. Defont. fl. Atl. pag 150

Habitat in Barbana 4

non vid.

gramineum P. foliis linear-lanceolatis alternis sessilibus ^{aug 169} L. Dan. tab. 22.

Potamogeton gramineum latifolium, foliis et ramificationibus
dense serratis Raj. angl. 3. p. 149. tab. 4. fig. 3.

Potamogeton gramineum latifolium ^{Loel} pers. 206. tab. 66.

Habitat in Europa ^{et paludibus} C

Caulis compressus ~~intermediis~~ ^{oculis} ~~super~~ ^{obtusis} ~~bracis~~ ^{membranata} ~~foliis~~ ^{trilobis} ~~et~~ ^{membranata} ~~quadr~~ ^{obtusis} ~~polliciana~~ ^{trilobis}. Sepala
obtusata ^{obtusata} membranacea alba lanceolata.

β. Potamogeton minus foliis densis mucronatis non serratis Mayn.
Monsp. 363.

Fontinalis media lucens Bauh. hist. 3. p. 777.

Potamogeton foliis lanceolatis oppositis acuminatis planis Geran.
fl. 9. prov. 124

lineantibus
floribus confertis

specie pauciflora

Differentia Potamogetonum
foliis angustis vel val.

vid. Vant. 13 in fig. 1

pedunculatum ^o foliis setaceis parallelis approximatis diffusis Lin. S. V. p. 169

Potamogeton gramineum ramosum Bauh. prodr. 101. pin. 193

Habitat in Europa

a Pot. marino non diversum secundum Smith. fl. Angl. p. 102

~~mitis y notum~~

Potamogeton foliis lanceolatis oppositis acuminatis Lin. S. V. p. 169

Potamogeton ramosum angustifolium Bauh. Prodr. 101. Pin. 193.

Habitat in Europa fœcis paludosis

Planta Bauhini secund. herb. Tournef. gaudet foliis linearibus alternis

michi ignotum

serotum P. foliis lanceolatis oppositis subundulatis Lin. I. V. pag. 169

Potamogeton longiserrato folia Bauh. pin. 193.

Habitat in Europa rivulis
varietas forte prociidentis.

Folia lanceolata acuta, glutinosa, suprema opposita herb. Tournef.
an varietas P. lucentis?

Compressum P. foliis linearibus obtusis caule compresso. L.V. p. 169 Et. Dan. Tab. 203
Polluch. hist. pl. n. 174.

Potamogeton caule compresso, folio graminis canini Raj. hist. 189.

Habitat in Europa, foris paludosis.

Caules longi, capites sub aqua formantes. Folia integerrima in
medionem obtusum terminata. Stipulae breves ^{alterna superius opposita} _{subulata foliis} ^{nuda angu-}
parva pauciflora, et dichotomia umbellorum _{stion}

densum Potamogeton foliis ovatis acuminatis oppositis confertis, caulis dichoto-
mis specie quadriflora. An. Spec. 102 * S. V. p. 160. Guett. Stamp 1. p. 102 *
Pollak h. n. Tribulus aquaticus minor alter Clus. h. 2. p. 252.
172. Continalis media lucens Baud. h. 3. p. 777. Raich. 109.
Potamogeton minus foliis densis mucronatis non serratis Magnol. Monsp.

303.
Habitat in Gallia, Italia.

Pedunculus dichotomia caulis brevissimus An. Spec. h. c.
Caules teretes dichotomi. Folia opposita amplexicaulia, inter prima undula-
ta late vincta, splendens, nervosa, ovato-lanceolata, caulesque
natos efformantia, semipollicaria flores 3-4. sessiles in capitulo
Pollak.

— ovato-lanceolata

Heterophyllum P. foliis submersis linearibus sessilibus; natantibus lanceolato-oblongis
petiolatis Schreb. spec. n. 920.

Habitat in stagnis Europa

Caule teres flexuosus, ramosis sumis, internodiis pollicaribus. Folia arti-
culus longiora saepe conduplicata, acuta, nervosa, summa opposita.
Stipula lata lanceolata membranacea supra folio dimidio brevior.
Folia natantia pollicaria nervosa oblonga petiolo longitudo-
ne folii. Pedunculata inter folia ultima ex apice caule coarctat
in pollicaria. Specia pollicaria densa

Potamogeton P. foliis lanceolatis acuminatis oppositis Lin. S. V. p. 167.

Potamogeton ramosum angustifolium foliis linearibus Bauh. prodr. 161.
Pin. 193.

Cnicum? foliis lanceolatis alternis oppositis ve undulatis serratis Lin. d. span
142 + l. v. p. 169. Fl. Dan. tab. Coll. bot. pl. n. 1742

Potamogeton foliis cnicis f. *Lactuca ranarum* f. *armentis planis* Bauh.
pin 193.

Habitat in Europa fosis et rivulis,

Caules compressi alternatim ramosi subdichotomi, flexuosi. Folia
alternis, ad dichotomiam opposita, amplexicaulia bipollicaria
obtusissima, nitida sine serrulata, venosa, pellucida nervo rubel
lo. Pedunculis e dichotomia, planiusculis. Spica cylindrica
oflora

perfoliatum P. foliis cordatis amplexicaulibus Lin. S. V. p. 168. Cl. Dan. Tab. 146

Potamogeton foliis latis splendens Bauh pin. 195.

Potamogeton rotunda folium alterum Loef. pruss. 205. Tab. 65.

Habitat in Europa lacibus fluvii que argillosis &

Caulis articulatus. Folia alterna bipolliciana articulis duplo longiora, 5-7 nervia integerrima. Spica terminalis

_____ cordato-oblongis

Luceni P. foliis lanceolatis planis in petiolo desinentibus in fl. Soc. 147, ^{f. v. p. 69.} Dan. tab

195 Poll. hist. pl. p. 173.

Podamogeton alternum God.

Podamogeton foliis angustis splendens Bauh. pin. 193.

+ Fontinalis luceni major Bauh. hist. 3. p. 777.

Habitat in Europa lacibus stagnis fluvii argillosis

Caulis sub aqua cespites ingentes, teretes, glabri, constituentes. Folia inferio-
ra alterna suprema opposita, sessilia obtusa, palmata vel sub
pithamosa integerrima. ^{reticulata} ^{nervosa} stipula axillaris sesquipollicaris lan-
ceolata. Pedunculus terminalis pithamosus. ^{caulis drupifer} Spica bipollicaris
flores conferti

varietas foliis lanceolatis angustis

lanceolato-ellipticis

marinum P foliis linearibus alternis distinctis inferne vaginantibus L.S. V. p. 169. t. 81.
Dan. Tab. 106

Potamogeton pappillum fluctans Boell. sp. 42. Tab. 20. fig. 5.

Potamogeton maritimum ramosissimum, grandis foliis capitulis, caputulis
des foliis Pluk. alm. 1305. Tab. 216. fig. 5.

Habitat in Europa ad littora maris

Caules filiformis inferne repens. Folia petiolo stipulis infiden-
tibus. Pedunculi a dichotomia specie interrupta flores glo-
merati

Marinum et pectinatum una ead. enque planta scilicet
cum Linth H. Boell

pusillum P. foliis linearibus oppositis alternisque distinctis basi patentibus; caule tereti.
Lin. S. V. pag. 164 Polleth. hist. pl. p. No. 177. 4

Potamogeton minimum, capillares foliis Bauh. prod. 101. pin. 193

Potamogeton pusillum, gramineo foliis brevior Vaill. parif. t. 32. f. 4

Potamogeton gramineum tenuifolium Loef. p. n. 206. t. 27.

Habitat in Europa paludibus 0

Caules teretes; alternatim ramosi. Folia alterna, linearia, sessilia
graminea, integerrima, acuta, apicula, summa opposita. Pa-
dunculus inter duas membranaceas vaginulas ad caulis api-
cem, spica brevis pauciflora Polleth.
folia angustiora quam in gramineo

8 distantibus

spica pauciflora floribus

compressum ante gramineum
post gramineum collocatur