

Potentilla

Potentilla

Dracopis orientalis flore luteo minimo Tournef. Por. 21.

Dracopis cappadocica flore luteo minimo Tournef. Por. 21.

Habitat in Oriente. herb. Mus. 2

Planta caespitosa, Caules basi lignosi, Digitales. Folia petiolata, triidentata, semi-
unquiculata, obovata, villosa-subsericea. Petioli sericei, uti pedunculati. Calycis
laciniis intus colorata, lanceolata.

Potentilla

Habitat ad flumen Obi h. h. Mus.

Caulis plures, digitales. Folia ternata, obovata, obtusa, dentata, fere pinnatifida
nā, lateralibus minoribus, uncinatis, mollibus, secundum nervos lineata, ^{libris per 1/2} floralibus triplicata
Stipulae sagittatae: laciniis pubescentibus. Calycis laciniis oblongis, acutiusculis,
obtusis, flore brevioribus.

compar. cum nivea vel puberula.

Salustriensis ? foliis hirsutis radice albis spinatis in capite serratis, cauli
nigrescentibus, caule adscendente debili compresso paucifloro,
calycis folioli subdentatis Haenke in Bot. Haerl. 2. pag. 60

non vidi

Salustriensis ?

Wadena

Ripularia P. foliis septenatis sessilibus; stipula dilatata in poentibus Lin
Pursh p. 712 & Gmel. p. 3. p. 102. 4. 37. fig. 2.

Habitat in Sibira v

Caulis ascendens filiformis Coris apice divaricus. Stipulae amplex.
caules solitane, emarginatae. Plicola p-g linearia canaliculata
subseriata glabra ex emarginatura stipulae pendentia ab
pedicelo Lin

— subseriatis glabris

non vidi

fragarioides P. foliis pennatis ternatisque: extremis majoribus flagellis septan-
gibus Lin. Spec. pl. pag. 711.

Potentilla foliis novenis palmatis apice serratis Hall. Gott 2. p. 106

Habitata Sibina 4

Species Fragariae sterilis. Radix tuberosa. Folia serrata, petioli
pelosi ex 3-5-7. nervulis. Soliola opposita, ovata, serrata
Caulis herbacei ascendens, pubramosi villosi, apice cinerei.
Folia radicalia pennata, superiora ternata: soliola inaequaliter
serrata. herb. Musc. Guss.

~~non vidi~~

Respitifera Potentilla

Habitat in Syria Herb. Desfont.

Tota villosa hispida alba. Folia radicalia petiolata, septenata: foliola vix unguia
lana, cuneata, inciso-pinnatifida: lacina linearis, obtusa, integerrima: caulina
ternata. Caulis plures, erecti, digitales, filiformes, simpliciter. Stipula lanceolata,
longitudine petalorum. Flores nonnulli an apice flari. Calycis foliola ovata.

ascendens Potentilla

villars

Habitat in alpebus herb Desfont

Caulis ascendens, vel rectus, pubescens. Folia inferiora quinata, caulina ternata,
semipollicina, lanceata, subtus villosa, subantheria, obtusa, serrata. Calycis
villosi subinerei.

valde affinis Pot: argentea

incisa Potentilla.

Pentaphyllum caespitium, foliorum segmentis profunde incisè serratis et minus
Herm. - Parad. batar.

Habitat herb. Turc.

Caulis prostratus, erectus villosus, parum ramosus, superne dichotomus. Folia
radicata petiolata, quae caulina quinata, suprema ternata, foliola omnia
subincisa, pollicaria, vel minora, villosa, incisè serrata. Stipulae lan-
ceolatae, integerrimae. Pedunculi a dichotomia, filiformes, bi pollicares.
Petala longitudine calycis, emarginata, flava.

montana

Trigona panli Vaillant.

Habitat circa Fontainebleau et in Gasconia

Raymond

Münchhausen

bicolor *Potentilla* caule subaphyllo, foliis radicis albis Vernatis lanicolatis sub
pennatifidis subtus nigris

Habitat in Sibiria herb. 4 usq

Folia radicis albis, pedicelata: foliola pollicaria, sessilia, lateralia horizon
talia, supra glabra, avenia, obtuse profunde dentato-incisa. Petiol: glabri,
lesqui pollicares. Caulis digitalis, filiformis, glaber, superne bis bifidus, in
medio folia duo, uti et subdivisi, opposita, mucosa, simplicia, integerrima
sessilia in medio stipula, eaque parum longiora. Peduncul: capillares. Calyx
incanus: laciniis ovatis.

tenuifolia Potentilla

Pentaphylloides etc: Amman. Tab. 16

Habitat in Sibiriâ herb. Guss.

Caules filiformes; digitales; foliis 2-3 instructi, subtriflori. Folium longitudine
caulis, pennata: penna distans, semipollicaris, saepe quaternaria, linearis, an-
gustissima, subtus incana: caulina simplicia, remota. Petoli incanis, inti caly-
ces

Vat. Willd. Wied

Dainia Potentilla

Habitat in Daunia Herb. Lus.

Omnino similis *Potentilla fruticosa*, differre videtur. foliis peltatis: paucis calycinis exterioribus oblongis utrinque acutis. an modo varietas

grandiflora P. foliis ternatis dentatis utraque subpili-losi caula decum-
 bente foliis longior. Spec. pl. pag. 715 & Gmel. pt. 3. p. 105. t. 35. fig. 1. 2.
 • Fragaria fœnalis, amplissimo folio et flore, petalis cordatis Vaill.
 Bot. Parif. 55. t. 10. fig. 1.

Habitat in Helvetia, Sibiria, Pyrenæis ☉
 villosa. Stolonibus longis repit procumbentibus foliosis. Caulis
 erectus medio folio unico proter floralis hirsuta, superne
 foliola obovata profunde unice per serrata basi versus cetera
 gemina, sempolluciana. Stipula oblonga acuta,
 foliola calycis lanceolata

bis bifidus

bis

serratis, stolonibus procumbentibus

synonym. Gerard.

an Gmelini eadem planta

verna P. foliis radicalibus quinatis acute serratis retusis; caulibus ternatis,
caule declinato L. Suec. 4557 fl. Dan.

Pentaphyllum f. quinquefolium minus Tabern. ic. 123.

Quinquefolium minus repens Luteum Bauh. pin 325.

Habitat in Europa paucis speciebus, frigidioribus &

caulis plures ^{digitati} vellosi superne ramosi. Tota

plerumque 5. interdum 7. caulina verna villosa foliola

obtusiusve sive serrata unguiculata. Stipula oblonga acuta

interosa. Petala flava emarginata calycis parum longioris.

Calycis foliola oblonga obtusiuscula

Sabauda Potentilla

Sillars

Habitat in Alpibus herb-Desfont.

• vel ^{apice} ~~synthemon~~

Caulis basi ramosus, canescens, interdum palmari, dichotomus: rami altitudine cubiti,
velloso, folia quinata, inferiore petiolata, suprema ternata sessilia: foliola ungui-
culata, cuneata. Stipula oblonga. Pedunculi vellosi. Discus axillaris
vna sexna diversa L.

herb

Senecio P. foliis bynnatis utrinque tomentosi, segmentis parallelis approxi-
matis, caule decumbente. In Spec: pl. pag. 7104

Potentilla foliis pennatis hirsutis, pennis tredecim ovatis crenatis decur-
rentibus Hall. Gott. 2. p. 106.

Habitat in Libinia ^{et in} apertis

Caulis ~~terre~~ ^{superne} vellopidus ^{in ramos dichotomos} ^{bi p. trijugis internodiis minoribus}
floriferis densis. Folia radicalia pennata pennis sessi-

bis oppositis, pennatifidis laciniis linearibus lancea lanceolata
integerrimis acutiusculis arenis supra glabris subtus

unicanis pollicariis caulens opposita sessilibus ^{in subtriangula}
summa floralibus ^{suprema trifida}. Pedunculi e dichotomia et opia uniflori
simpliciter sesquipollicares. foliola calycis majora ovata acuta

subtus tomentosi

lanicolatis

integerrimis

intermedia P: foliis radicalibus quinatis, caulinis ternatis, caule erectis
sculo ramosissimo Len. Mant. 76. + L.V. p. 477

Quinquifolium montanum luteum erectum hirsutum Benth. prodr
179. n. 325.

Habitat in Helvetia 4

Requis omnibus ramosis Cavata pubescens. foliola lanceiformia
necessaria similis norvegica et magis ramosa villis
brevis folia minima radicalia snata nec ternata
folia superiora opposita

alba P. foliis quinatis apice conniventibus serratis, caulis filiformibus pro
cumbentibus, receptaculis hirsutis Lin. 1. V. Gaigu. fl. austr. 2.

4115

quinquefolium Trazi Traz. bot. 507.

Pentaphyllum majus flore albo Clus. hist. 2. p. 105.

quinquefolium album minus Bauh. pin. 325.

Habitat in alpebus Sina, Austria, Paronibus
caulis petioli vili flavescientibus hirsuti. foliola oblonga
basi ciliata subtus villosa vili adnati margine flavescenti
villosa. tri apices - dentata stipula semiovata. calycis
foliola lanceola. petala obovata emargina

ternatisque

Alchemilloides hinc valde accedit

Clus. Syn. in hac et sequente forte falsa plant. habes a Trus. ni fallor
sub nomine Bauh.

multifida P. foliis ^{hi} pinnatis: segmentis integerrimis distantibus sub his tomento
si caule decumbentibus Lin. Spec. pl. pag. 7104

~~Pentaphylloides repens, foliis pinnatis Boerh. Cent. 1. p. 304. 49. fig. 1.~~

Pentaphylloides supinum minus, foliis glabro non serrato Ann. nat. h. 116.

β. Pentaphylloides supina minor, foliis alatis hispido vane dissectis Ann.
nat. h. 117.

Habitat in Siberia, Turana, Cappadocia &

Caulis teres pubescent superne densus. Folia petiolata altern
petiolat remota inferiora bipinnata superiora pinnata
5-6 puga foliola sessilia opposita linearia acuta. Stipula
~~ovata~~ ^{ovata} vix pollicaria. Stipula ^{unicolori} lanicolata semipollicaria
petiolo adnata pedunculata uti calycis pilosi lacinus
lanicolati

Cineobus

Syn- hys ad basium refert Gmel. Buxbaumii quope figura mala si multi

penstemonia l. foliis inferioribus pinnatis, superioribus ternatis: foliis
inco serratis, caule erecto pubescente Lin. Mant. 76. f. V. p. 477.

Pauc. bot. 2. t. 109

Pentaphylloides canadensis foliis agrimonis Boeck. Lugd. 1. p.

40.

Habitat in Canada &

Caulis erectus, subseratus simplex. Folia inferiora
longius petiolata suprema sessilia inferiora pinnata 4 juga
pinna sessile opposita extrema majoribus tripollicares
parvis decurrentes inferioribus serratis superioribus minoribus
supra glabrescens subtus villosa pallida profunde
serrata. Lacinia calycis lanceolata pubescenti, subian-
scentis, plures terminales in ramulis dichotomis
stipula lanceolata pollicaris attenuata

Potentilla canadensis Walther

Habitat in Carolina herb DeFont.

Caulis erectus, pilosus. Folia radicalia ternata, obovata: caulina quinata, cuneata, omnia serrata, villosa, nitida, supra glabra. Pedunculus superne, capillaris

Canadensis P. foliis quinatis villosis, caule adscendente hirsuto Linn
Spec. pl. Sp. p. 7134

Quinquifolium canadense humiliss. Monf. hist. 2. p. 100.

Habitat in Canada. dicit Richard

Habitur. Fraxinis folia radicalia snata foliolis obovatis acutis
te serratis supra pubescentibus subtus villosis albo sericeis
petioli valde albo hirsuti. Caulis digitalis ramosis rari
bus foliis. Corolla lutea similis P. verna a qua differt
foliis valde pilosis anguste serratis subrotundis caule
valde hirsuto Linn

sub villosis subtus sericeis

non vidi

an serena P. folis pinnatis serratis, caule repente pedunculis unifloris hinc

S.S.

fl. dan. tab. 544

Potentilla Cam. epit. 750. Bauh. pin. 321.

Habitat in Europa prope aquas &

Caulis flagellis longis repentibus foliosis et floriferis.
Folia plurima radicalia pinnata novemjugata folioli
omnia sessilia oblonga alterna ultima duo parum decurren-
tia basi acuta supra ^{viridi} villosa subtus argentea unguicu-
laria pro inferna minora incisoferrata ut inter proplem
per foliolum minutum ovatum acutum. Stipula lanceolata acuta
pedunculus villosus.

Frigida Potentilla

Villars

Habitat in alpebus - herb Desfont.

Planta digitalis, villosa. Caulis basi stipulis anidis imbricatis. Folii radicalia quina
nata, foliola cuneata, serrata, utrinque pilosa.

Facies *P. aureo* an ejus varietas?

rupetris P. foliis pinnatis ternatisque, caule erecto, flagellis nullis L. V. pag.

477. Gaigu fl. austr. 2. 8. 114

quinquefolium frugiferum Clus. hist. 2. p. 107 n. 5. Bauh. pin. 326

Pentaphylloides exilium Bauh. hist. 2. p. 398. Monf. hist. 2. p. 192. f. 2. 420

fig. 1.

Habitat ad latera montium Sueciae et Germaniae 2

Caulis tener pinnatus pubescens superne dichotome divi^{rema}sus
folia radicalia et intermedia ^{et intermedia} caulina pinnata 2juga. petiolata. fol. ~~superiora~~

opposita ternata. foliola opposita, sessilia subpetiololata pollicaria
floralia sessilia ^{ternata}
interiora ^{biserrata} minor oblonga terminalia reliqua majora obovata
~~et radicalium biserrata~~ ^{basi acuta basi vix in se gemina} superiora omnia villosa. Pedu-
culi a dichotomia et apice uniflori villosi unguicula
res. lac foliola calycis ovata stipula oblonga

inferioribus pinnatis superioribus ternatis stipulis
indivisi

pimpinelloides, foliis pennatis: folioli subtenuis dentati equalibus,
caule erecto. L.

Pentaphylloides orientale erectum, folio et facie pimpinello Tour-
nes. cord. 21. Barb. cat. 1. p. 30 & 40.

Habitat in Armenia saxosi &

Caulis ^{erectus} ^{ut dicitur} ^{superne} dichotome sursum pubescens
simplex. folia petiolata alterna remota 7-8 jugis
foliola subalterna sessilia extrema parva decurrentia obla-
nga seu utrinque villosa subtus venosa supra lineata obtusa
obtuse profunde serrata unguiculari subaequali. stipula
et folia floralia ^{holleis} ⁱⁿ ^{apice} pennatifida pedicelli ^{et} ^{cauli} ^{et} ^{dichoto-}
mii et apice caulis pubescunt foliiformes pubescentes uti
calycis foliola majora calycis ovata

Stipula pennatifida

herb. mus.

Africanica P. foliis radicalibus et caulibus inferioribus quernatis, caulibus
vellohi basi procumbentibus, dichotomis L. V. p. 470. Fairgu.

Habitat

Tota nullis longis pubescentia. Folia radicalia longe petiolata
suprema caulina subsessilia inter stipulas. foliola lanice
lata basi acuta profunde serrata suprema simplicia
integerrima. Stipula ovata pedunculata in dichotomia
et apice. Calyx hirsutus laciniis lanceolatis. Corolla magna
suprema trifida
apkylla

Jupina P. foliis pinnatis, caule dichotomo decumbente. Linn. S. V

Gmel. Bot. 1. p. 149. 127. fig. 2. Jacq. pl. austr. s. v. 406.

Pentaphylli speciei flore luteo enneaphyllos hespita Ambros. phyt. 1. 414.

Pentaphyllum japonicum quorundam, Potentilla facie Claf. bot. 2.

p. 107.
Pentaphyllum foliosum affinis Hausskn. p. 326.

Pentaphyllum alpinum minus japonicum Planch. alm. 205. 106.

fig. 7.

Habitat ad Mozundiam et in Siberia O

Caules ter^{ter}, pili rariorebus. Inflorescentia superiore dichotoma

in mopis. Folia petiolata alterna pinnata cum imponi

tri-quadrifida. Folia alterna infera parum minus

breves petiolata extensa polliciana extrema conflua

entia oblonga profunde obtuse serrata obtusa. Stipula

oblonga saepe pollicares pedunculi ex apice et dichoto

ma polliciana uniflori. Calicis calycis oblonga

serratis

externis confluentibus, Stipulis indivis

Diffusi
folia in frontem
lobata
in

recta P. foliis serratis lanceolatis serratis utraque subulosis; Caule erecto
Speci: p. 724 Gaerq. fl. austr. 4. T. 303

Quinquefolium alterum vulgare Dod. pempt. 116.

Quinquefolium rectum luteum vulg. Bauh pin. 325.

Potentilla foliis digitatis, caule erecto compositis Lin. Hort Ups. 1334

Habitat in Italia; Narbone ad marginem agrorum &

junior villosior ^{apice dichotome divisi} caulis 1-2 ped. alii. Folia petiolata suprema bipinnata: foliola septem
adulto glabra ^{obtusè profunde serrata. Stipula lanceolata acuta inciso}
serrata Calyx ^{obtusè} ^{obtusè} pedunculi e dichotomia et apice uniflori
conopsea foliola basi acuta ~~obtusè~~

Pot. Potentilla rubens a Dr. Bellardi communicata vix speciem
differre videtur

superioribus septem
inferioribus quatuor stipulis serratis inferioribus septem

alchemilloides ^o foliis quinatis lanceolatis subtus serratis integer
serris serratisve apice conniventibus indentatis, caule erecto
Lapeyrouse in Act. bot. pag. 22. tab. 17

Habitat in Pyrenaeis

Tota planta pilis longis hirsuta foliola apice obtusata
serrata inferne vix in integrum. Petala oblonga flava
foliola calycis ovata

quinquefolium pyrenaeum folio subtus argenteo Tournef. f. v. h.
Desf. 2. 2. 2.
alchemilloides La Peyrouse

— hirsuta cuneatis stipula lanceolata

intermedia

Habitat in America? herb. Desfont

Caulis sesquipedalis, erectus, villosus, canescens. Folia inferiora quinata,
digitata, superiora ternata, suprema simplicia lanceata, floralia unifo-
rmiata, floralia sesquipedaliana, sensim minor acuta supra raris villo-
sa, subtus uniano tomentosa, floralia subtus fida. Stipula ovata, albe-
ruata, unguicularis, integerrima. Pedunculi e dichotomia. Flores
parvi flavi. Calycis lacina lanceolata

nevati P. foliis septenatis utraque villosis uncei formibus
apice serratis utraque f. caule erecto, calycibus 12 fidis corolla
majoribus Lapeirous in Act. bot. 1. p. 210. & 16.

Habitat in pyrenois 4

Tacii Pot. caulescens. Radix superne ut in valdena
Caulis filiformis palmas inferne purpurascens simplex
superne villosa conopsea in pedunculor paucos bifidos divi
per foliis 3-4 instructus. Folii septenata vel quinate
peltati utraque vinda adpressa pilis aequo longis
subunciformi. Venis oblique venosa apice 3-6 den
ta dentibus acutis. stipulo angusto lanceolato in partem
attenuato. calycis foliola lanceolata purpurascens.

quinateque glabris nudiusculis unceifor
mibus apice anguste serratis caule erecto stipulis lanceola
tis

affinis *Alphana* an modo eius varietas
quomodo petala?

glandulosa ~~Antozus~~ foliis ovatis incisè serratis glabris demum venosis:
petalorum alii nitello glanduloso Moench. Veisf. pag. 31

germano. Potentilla

Quinque folium humifusum, Venetiis proae *Carminatum* Tournef. herb
Habitat herb. Tournef.

Radix superne densa in ramos plures. Folia radicalia quinata: foliola
pinnata linearia

herba P. foliis septenatis quinatoque cuneiformibus incisissimis pilosis, caule
erecto herba Spic. p. V. p. 4704

Quinquefolium scitarum minus; angustioribus foliis monspeliens; Raz
cur: p. 213.

Quinquefolium montanum erectum hirsutum Luteum Mayr. monsp.
216. non Chab. & Aub.

Habitat monspeli inque Pyrensi &

caulis utriusque folia subtus ^{retro} pedunculati. et calycis et pedis longis albis
herbui. folia inferiora septenata petiolata suprema quinata
stipulata et stipula stipularum falcata lanceolata basi attenuata
exteriorum serratis 3-5 obtusis pilis st ut pollicina latera
tia minorum stipula lanceolata attenuata.

Can. — stipulae integerrime

Furticosa P. foliis pinnatis, caule fruticoso Lx. t. V.

Pentaphylloides rectum fruticosum Bonpl. Monf. hist. 2. p. 193.
f. 2. t. 23. fig. 5.

Pentaphylloides fruticosa elater Amm. meth. PP. V. 17. et Oq. 8. 10. fig. 1.

Pentaphylloides rectum frutescens Walth. hort. 95. t. 17.

Habitat in Ebora Angliæ, Oelandia australi, Sibera &

Frutex bipedalis Rami teretes inferne glabri superne villosi.

Folia petiolata, alterna, pinnata ^{omnia} bipinna. foliola ^{opposita} ^{sæpe} ~~opposita~~ ^{opposita} ^{duo} extrema parum decurrentia lanceolata utraque acuta ^{femi-}

polluciana obscur venosa villosa supra viridia subtus
viridiana. Stipula lanceolata attenuata pedunculata ^{vel}
apices ramorum axillares uniflori villosi filiformes
Calyces villosi intus glabri colorati, foliola lanceolata

bifurca P. foliis pennatis subaequalibus: folioli oblongi subbifidis: extre-
mitatibus confluentibus Gmel. A. 1. p. 149. & 27. fig. 1. S. V

Pentaphylloides orientale Linnæum, foliis alatis bifidis vel trifidis

Tournef. corol. 21.

Habitat in Sibiria 4

Pentaphylloides repens, foliis pennatis Buxb. cent. 1. pag. 30

Tab. 49. fig. 1.

Planta palmaris. Caulis plures simpliciter superne dichotome
divisi foliiformes pilosissimi decumbentes. Folia
petiolata alterna 4 vel 5 juxta foliola sessilia subalterna
extrema saepe confluentia interdum distincta saepe unguis
culana supra glabra subtus pilosissima proferentia
juniora ~~inter~~ obtusissima, indivisa bifida terminalia
saepe plerumque trifida pedunculata dichotoma et
apice saepe pollicari uniflora. Foliola calycis ovata
glaberrima

et integris que

distinctis que

macrochiza Potentilla

Tragana cretica fruticosa folio subtus argenteo Tournef. Cor.

Habitat in Creta herb. Græc.

Radix superne divisa in ramos crassitie fere digiti minimi, fusci imbricati
reliquis stipularum setulosis, apice et caulibus et foliis aggregato cespitosa.
Caulis struthamoi, teres, subfoliosus, uti tota planta, tomentoso-iscari,
simpliciter. Folio radicalia petiolata, ternata; caulina superiora simpli-
cia et divisa stipularum: folia omnia semipollicaria, oblonga, sessilia,
supra minus tomentosa, serrata basi versus integerrima, basi acuta. Flores
in apice plures, conferti, pedunculati et dichotomia. Calycis lacines alter-
na ovata acuta. Stipula ovata, attenuata, radicali anthera

speciosa Wild.

monsipeliensis P foliis ternatis caule ramoso erecto, pedunculis supra
genicula enatis Lin. Hort. Ups. 1344

Pentaphylloides magus erectum, flore luteo Monstros. 2. p. 193. f. 2
t. 20. fig. 2.

Pentaphylloides fragans folio magis Monstros. 304

Habitat Mospelii O

Smilis norvegici foliola majora magis oblonga in illa magis
ad lanceolato cuneiformem accedunt. caulis villosus
etiam si culta. folia suprema opposita. pedunculi
sepe et dichotomia ut in illa

— foliis oblongo cuneatis

aurea P. foliis radicalibus quinatis serratis acuminatis, caulinis ternatis, caule declinato Am. acad 4 p 316 Jacq. Vind. 248. fl. Dan 7. 114

quinquefolium 3. aureo flore Claf. hist. 2. p. 105

quinquefolium minus repens alpinum caeruleum Bank. pin. 321.

Potentilla foliis quinatis acute serratis ora sericea, petalis maiori
lati Hall.

Habitat in alpebus Helvetiae norvegicae ?

foliis apice dentibus acutis serratis fere quinatis o P. verna differt
quibus a Linnæo addit proterea quod foliolorum costa est
margo sericea p. sed quod quoque in verna obtinetur aurea
secundum specimen in Helvetia Norvegia lecta fere glabra
an mod. varietas

opaca P. foliis radicalibus quinatis cuneiformibus serratis, caulinis
suboppositis, ramis filiformibus decumbentibus. Am. acad. 4. p. 274.
Gaique. coll. 1. p. 33.

quinquefolium 4, flavo flore & speciei Claf. hist. 2. p. 106. f. 106.
Quinquefolio simili enneaphyllos hesperia Bauh. prod. 139. pin.

³²⁴
quinquefolium minus repens Canadense luteum Bauh. pin.

³²⁵
Pentaphyllum parvum hesperium Bauh. hist. 2. p. 590.

Habitat in Austria Helvetia, Baldoz

Folius pedicello verno. Radix nigra capitulo unguiculari squamo
fo. ~~Radicali plures pollicares vel digitales villosi~~

folia 5-6. 7. quatuor quata foliola cuneiformia secundum totam
longitudinem fere profunde serrata apice tridentata interne

diu vix unguicularia lateralia minora villis albis adpres
sa vixia flamen. Caules plures pollicares vel digitales villosi.

Stipula lanceolata e cyper. medio folium ternatum subsimple
Calycis foliola lanceolata callosa longitudine corollae flava
foetala emarginata flava

reptans P. foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris L.
L.

Quinquefolium majus luteum Duch. hist. 624.

Quinquefolium majus repens Bauh. pin. 325.

Habitat in Europa apricis argellopsis ?

Caules filiformes longe prostrumbentes ad articulos
radicantes. Folia et pedunculi ad nodos petioli 4-5que-
bis. In pollicares. foliola lanceiformia serrata per villosa polli-
cari pedunculi plerumque foliis longiores uniflori medi-
Calyces foliola lanceolata

subcaulis P. foliis ternatis dentatis utraque tomentosis, siapo decum-
bente Spec. pl. p. 705. & Haerq. Coll. 2. p. 145.

Tragana tenlis molli lanugine pubescens Amm. nith. P. 4. 110.
Gmel. pl. 3. p. 103. t. 36. fig. 2.

Gand. p. 190 t. 37

Tragana affinis sericea incana Bauh. prodr. 139. pin. 327.

Habitat in Sibiria, Gallia australi, Granada, Galloprovincia
Nep. victor. 2

Planta altitudine digiti minimi caespitosa tota incana tomen-
tosa minime nitida, foliolo obovato obtuse dentata crassa
supra secundum venas ^{obtusius} cuneata. Calgis foliolo ovato obtusa
flores flavi.

incana tomentosa

obtusius obovati obtuse serrati

an Potentilla longioris? Haerq. hunc spectat vel potius ad
P. nitidam

Duo planta sub hoc nomine in herb. musci vidi

1801. *Tragana alpina major* foliis argenteis obtusis, flore roseo
Tournef. Guss. r. h.

Tota piceo argentea. Folia ternata: foliola unguiculata, sub
rugosa, oblonga, basi acuta, emarginata. Scapus palmatis. Flores 3

1802.

Tragana alpina major, foliis argenteis acutis flore roseo Tour
nef. G. r. h.
ambo dedit Guss.

caulescens? foliis quinatis apice conniventibus serratis, caulibus multi-
floris decumbentibus, receptaculis hispidis, petalis oblongis linearibus
a rad. 4. p. 3174. Gaerth. Vad. 246. fl. austr. 3. 7. 220

Quinquefolium 2. minus, albo flore Plaf. h. 7. 2. p. 105.

Quinquefolium album majus Bauh. prod. 139. caulescens
Bauh. pin. 325.

~~Quinquefolium album minus altema Bauh. pin. 325.~~

Habitat in Alpibus Helvetiae, Austriae, Stiriae, Horto Dei &

Habitus antecedentium plerumque majori folia glauci-
rims radice haec foliola petiolo lineiformi polluciana
lateralibus minoribus apice serratis 5-9. basi acuta infer-
ne versus integerrima. flores copiosi laciniis alycis
cuneolatis villosis variat omnibus partibus glabris pilis
vel villosis

————— ff. petalis serratis
plantam sub synonymo Bauhini in herb. mus. vidi et dicitur Gussone

nitida P. foliis subternatis tomentosis conniventibus tridentatis, caulis
unifloris, receptaculis lanatis L. V. p. 479 & Am. acad. ^{Facqu. fl.}
aust. 5. app. 8. 25. 4. p. 316

Trifolium alpinum argenteum, persici flore Pom. Bald. 222. ^{peru}
Wauk. pen. 320.

Heptaphyllum argenteum alpinum trifoliatum Sabaudum Bor
con. mus. 2. p. 20. 4. 9.

Habitat in Baldo & Neapoli in monte virginis

P. lanta caespitosa villosa sericeo nitida palmanis vel
panum ultra. Caules erecti simpliciter bif. 3 phylli, terminata
flombus 2-3. Folia ternata radicialia obovata vix uaquein
lana integra 2-3 dentata. caulens in ^{remote} fenora petiolata superio
ra folia linearia lanceolata acuta. stipulo angustis pino
integro.

Tragana alpina minor foliis argenteis obtusis flore roseo Tour
neil Gu. ref. 4. p. 1. v. h. tomentosi sericei ——— integris que
subtrifloris

argentea l. foliis quinatis lanceiformibus incisus subtus tomentosi, caule
erecto An. 1. 1. fl. Dan. 4. 865

Pentaphyllum minus Cam. epist. 760.

Quinquifolium foliis argenteo Bauh. pin. 325

Habitat in Europa meridionali &

caulis erectus in anu superne ramosus fruticulosus. folia
petiolata # remota supra villosa vixi canescente subtus canesca
na uti calycis. Sepalo lanceolato extrospum incisum.

suprema
fessilia

Lupana P. foliis quinatis apice conniventibus, caulibus multifloris
decumbentibus, receptaculis hispitis, petalis subrotundis S. V. p. 270
Gaeta fl. auct. 2. 4. 116

Habitat. in austria

Planta digitata sicut piperis diversis specibus in botanico
Caulis filiformis 1-2 phyllis. 2-3 floris villosus. folia
petiolata 5nata foliola obovata tenuissime venosa secundum
venas pectinatae utrinque villosa profertim subtus et versus
marginem apice dentibus 3-5. stipulae - foliola calycis
villosa purpurascens lanceolata. Corolla alba.

villosi

stipulae lanceolatae

receptacula in hac utri affertur.
hispita

valdensis P. foliis septenatis obovatis serratis tomentosis, caule erecto,
petalis calycis brevioribus, receptaculis lanatis Lin. Spec. pl.

perg. 714 4

Habitat in alpidibus valdenans et Vinadenibus 4

Radix superne crassa squamis fuscis e basi petiolum persisten-
tibus imbricata. Caulis ascendens. Verticilli simplices superne
dichotome ^{divisi} ~~inter~~ ^{villosi} ~~inter~~ ^{caeserentes}. Folia plerumque radicalia
petiolata 2-3 in caule petiol. foliola petiolata pollicaria
lateralia minora basi versus integerrima ^{superne nigrescentia} extrospum
serrata subtus argenteo tomentosa ~~petali basi utraque~~
stipula membranacea lanceolata petiolo inferne adnata
integerrima foliola calycis ovato-lanceolata

Villarsii et vald. est Peyroux: rivalis figur. vero Valdensis
Alloumi. Lin. secundum Peyroux

lanceiformibus subtus argenteis caule
ascendente

Norvegica P. foliis Vernatis, caule dichotomo, pedunculis axillaribus.

Lin. S. V. fl. Dan. 1. 171.

Quaquefolium hepaticum, luteum paucioribus laciniis Loeff.
pres. p. 110. 170.

Potentilla foliis Vernatis insip. caule corymboso Luedo fl.

Suec. 4574

Habitat in Norvegia, Suecia Borussia, Canada agris &
Caules plures adscendentes pilosi super ne dichotome ramosi
palmares vel pithamoi folia petiolata vase pilosa
foliolo cuneiformia in supra magis lanicolata
profunde serrata. Stipulae juniorae pollicariae lateralia
namque minora. Stipulae seniorae calycis foliolo
lanicolata.

Lepta Potentilla

Habitat in Carolina herb. Rich.

Caulis erectus, herbaceus, semipedalis, simplex, pilosus, apice bifidus. Folia petiolata, omnia ternata, obovata, incisa, unguiculata, lateralia altero latere obliqua. Stipula lanceolata, integerrima. Pedunculi inani. Calycis foliolo ovato-lanceolata.

hirsuta *Potentilla* ^{*hirsuta*} foliis ternatis ~~*hirsuti*~~ ~~*puberula*~~ calycibus
seratis ~~*puber.*~~ ~~*incanis*~~ caule erecto

Habitat in gronlandia
an modo *Sanctas Potent.*

erectus pauciflorus foliola utraque *hirsuta* ~~*puber.*~~ ~~*simulque*~~
~~*puber.*~~ ~~*incana*~~ obovata profunde serrata caulina lateralia
trifida vel nulla. sepalo ovato uti petali et calyci et
calyces *hirsuti*. foliola calycis ovata. Corolla pallide flava
ratione planta magna

tridentata Potentilla foliis ternatis Potentilla
2. pag. 216. Tab. 9. cuneiformibus apice trifidis Hort. Kew.

Potentilla trifurcata retusa: foliis ternatis, hirs, apice retuso, triden
tato fl. Danica tab. 799.

Habitatio grontandica missa

Caulis herbaceus, ascendens, simplicissimus, spithameus, villis varionibus
adpressis.

Coeca pedicelata, inferne congesta, unum vel alterum in caule, foliola
foliola ternata,
unguiculata, glabra, avenia, basi acuta, apice obtusè tridentata
et, late subequalia, lateralia angustiora. Folia floralia tripartita
prospira, lanceolata, ad basis et in medio perducent longum.
Pediculus linearis, canaliculatus, longitudine foliolorum.

Stipula lanceolata.

Pedunculifera ad apicem, subulata, trifida, pedunculus durotomus aphyllus
et hyl ter, uni florus

Foliola calycis lanceolata, pilosa.

Germena pilosa.

nuda P. foliis ternatis incisè subtus tomentosis, caule ascendente

Pl. Suec. n. 4504 Gmel. Sib. 3. p. 103. t. 36. fig. 1. Sprei: pag 715 x

Eragrostis fœnalis procumbens, foliis ternatis incisè serratis An-

man. n. 109. t. 14. fig. 2.

Habitat in alpebus Norvegiæ, Lapponiæ, inque Gronlandiæ

Caulei digitalis vel palmatis dyphyllis proter folio flo-

ut fere pennatis ^{Sibiria} ralis foliola oblonga vel obovata profunde incisè serrata
Culmibus sessilibus in caule interdum trifida. Stipulis ovatis
petala flava emarginata lata receptaculum horisum
~~varietate caule foliisque supra glabris. vel horisum~~

quinquefolium foliis ternis procedenti similis herb. Cath. et
Berch. ad. p. l. 105. dedit 4. usque