

Poterium

1. longispora P. inerme, caulibus subangulosis glabris, pedunculis simplicibus, fructis globosis
2. hybridum P. inerme, caulibus verticibus villosis, pedunculis subramosis, fructis oblongis
3. caudatum P. inerme, frutescens, ramis verticibus villosis, fructis elongatis laxis
4. spinosum P. caule frutescente, ramis ultimis spinosis - ramosis

polygamum Potanum

Habitat in Hungaria Kistabel

Caulis tripedalis, erectus; stricus, a petiolo decurrente et angulatus
ramosus: Rami remoti ^{caule brevem} simplicibus ^{et semi}. Folia remota, pet. subsquata
moa, petentia, pennata. ^{triter} cum impari quatuordecimjuga foliola
brevis petiolo, sex semipolliaris, infus versus & ex sim minor, petio
la vel opposita, subrotunda inferiorem subrotunda, basi & unum parvo-sub
cordata, superiorum ^{et} subrotunda-lanceolata, ang. utera, omni
profunda equaliter ^{et} serrata, obscure nervoso-striata, subtus glauci
duo infima & tripuliformi. Pedunculi superne, alterni ^{et} pollinaria
vel sesquipolliares. Bracteae ^{et} parvae lanceolatae concavae
coloratae, membranaceae, ad basin pedunculorum superiorum, inferis
re ex ala folii capitulum ^{et} globosum ^{et} pappo duplo major. Flores
foeminei in vertice, hermaphroditi. Catechali & styli & strobili
foliola calycis oblonga ovata

~~istud~~ Dignitatem
hinc vel ad singulas species pertinet vel tandem
modo ad nonnullorum.

Ad Calem hinc guli volumini ^{ad Didi} in
tunc videtur species eorum in eo contentis, et ne
frustra vel utique labore ~~quantum~~ ^{quod} ~~est~~
speciem qualem in variis subs auctoribus vel
sub nomine Diverso ^{diver} ~~descri~~ ^{betur} ~~vel~~ ^{sub} ~~diversis~~
sub eodem, hae quoque ~~est~~ ^{est} ~~est~~ ^{est} claritas
in Ceteris

Reliquum quod restat, est publica
mentem gratum animum testificatio
omnibus testificari, qui malum vel
placitum vel observationem se benevole
meum communiarent, et inter hos
praesidem nominare juvenem Botanici
Gallio, qui summe humane vitale me
pluribus vicibus excepere consilio
adjuvanti, obsequio ^{et} ~~est~~ ^{est} ~~est~~ ^{est}
tradidit, ditum ^{est} ~~est~~ ^{est} ~~est~~ ^{est}
non tam publicos quam privatos permixta
ment, et quod qui quid in eorum collectione
huius in duplo adest benigna Dignitas.

caudatum Poterium

Habitat herb. Desf.

Caulis a, borescens. Rami teretes, superne tomentosi, squamosi et basi foliorum persistentibus, ^{foliis} ad apicem conferti. Spicae superne, inter folia, pedunculata, striatae, minimum imbricatae et squamis ovatis, villosis-tomentosis.

Desf.

microphyllum Poterium

an *Pimpinella* minor altera rotundo splendens folio lusitanica grolly?
Pimpinella etc. Pluken. Tab. 103. fig. 4.

Habitat herb. Mus.

Caulis dichotome diviso: rami crassitie pennae arvensis, vert: squamis aridis;
et basi petiolorum persistente. Tota est radice

habes

Languiforba P. inermis, caulebus subangulosis Lin. L. V.

Pimpinella Languiforba Cam. epit. 777.

Pimpinella Languiforba minor hirsuta Bauh. Pin. 160

β. Pimpinella Languiforbam minor Lewis Bauh. Pin. 160

γ. Pimpinella Languiforba inodora Bauh. prodr. 84. pin. 160

Habitat in Europa australioris aperiis 24

Caulis erectus striatus glaber. Folia pennata foliola ^{alternata reticulata} unguiculata
argute profunde serrata. Pedunculis terminalibus elongatis. Specie
foliolum ad basin petioli parvis globosis
tribus

Species globosa

glabris, pedunculis simplicibus

hybridum *P. inermis*, caulibus teretibus striatis L. S. V

Pimpinella cegrimonioides Boiss. sic. 57. t. 29. Monf. hist. 3. p. 264.

f. p. tab. 18. fig. 9.

Pimpinella cegrimonioides odorata Barr. rar. 10. 9. 632.

Habitat Montpelii in oriente 4

Tota planta vellis adspersa Caulis striatus ramosus. Rami axillares
apice floriferi. Folia petiolata pennata cum impari rufescenti
quinque puga cum quibus duabus ^{inter extenor.} minoribus ^{superiora} et puga
ternata oblonga basi altero latere breviora ^{profunde serrata}
subpetiolata opposita vel altera. Stipulae subrotundae inaeque
serratae. Pedunculus ^{ex} apice ramorum palmaris et ultimus
capitula ^{peduna} pedicellata remota oblonga

oblongis

pedunculis subramosis
villosis, pinnis pinnatis

Caudatum P. enorme frutescens, ramis terribus velloso, specie elongatis
Lam. Hort. Kew. 3. p. 354.
Habitat in Panama &

Menopium P. spinis ramosis L. n. 1.

Stoebe legitima Droskondis Clus. hist. 2. p. 303.

Potamo affinis, foliis *Pimpinella*, spinosa Bauh. Pin. 388

Pimpinella spinosa Monf. hist. 3. p. 262. f. O. Tab. 10 fig. 5.

Habitat in Creta, Libano &

Rami striati, glabri, ultimi vellosissimi alterni, juniores in spinos
ramosos desinentes. Stipula petiolata pennata cum impari, alter
na & supra foliola opposita setifera terminale petiolatum internod
minora terminale majus feminae quae uase profunde serrata basi
latere extensiore breviora, supra nudiuscula subtus pilosa.
Petiolus basi dilatatus mox pennis complexus apice utrinque foliola
vel quatuor pedunculis ex apice ramulorum brevis spinosa subglobosa
nuda pilis longis albis inter flores