

Premna

Cal. cylind. micro-unicolatus s. dentatus. Cor. labium superius integrum, stamina brevissima. Gynae. nuda & loculari

1. integrifolia P. foliis ovalibus subcordatis obtusiusculis oppositis integerrimis ramisque glabris.
2. cymosa P. foliis ovatis acuminatis integerrimis glabris oppositis, ramis superne tomentosis
3. longata P. foliis ovatis subcordatis integerrimis acuminatis glabris alternis panicula terminali
4. serratifolia P. foliis superne serratis

tomentosa

verticillata Premna foliis obcordata ovatis quater nato verticillatis
panicula ramis dichotomis

Habitat in Guinea Thonning 5

Frutex. Rami superne teriusculi, subtomentosi. folia petio

lata 2. 3 polliciana, panem acuminata, integerrima vel
versus apicem remota obtusè serrata; supra simpliciter
venosa, oculo armato punctis frequentibus adspersa, subtus palli-
dura, venosa, villosa. Panicula terminalis: pedunculi partia-
les quater ni, verticillati, patentes semij, 4. 5. dichotomi. Bractea

lineares, quater no, scabes sub dichotomis

Calyx obscure bilobus: lobo superiore emarginato. Corolla albida.
tubus ^{sub} ventricosus, interne villosus. Limbus affidus; lacina super-
ior longior rotundato patente: lateralibus angustis erectis
stylus declinatus. Drupe magnitudine Arbor globosa a
subtuberculata. Nux negra, 4 loculari Thonning.

Cephalotes Cinnabulum

Habitat in India orientali hodiernis.

Caulis volubilis, teres, vellis asperis. Folia petiolata, 3 pollicaria, cordata, acuta, integerrima, arena, subtus nervosa, utraque pilis flavis
tibus aspersis. Petioli sesquipedicari. Pedunculi folio longiores. Stom.
in capitulo sessile, foliis involucriati semipollicariibus, oblongis. Brac-
tea lanceolata, uti reliqua pilis flavis hirsuta, utroque glabra

tomentosa. Premna

integerrima P. foliis integerrimis Lin. Mart 252. + P. V. p. 565.

Cornutia corymbosa Burm. ind. 133. t. 41. fig. 1.

Solum hirci Rumph. amb. 3. p. 20. t. 134

Habitat in India orientali &

Rami Vertes glabri. Folia petiolo glaberrima nervosa
simpliciter venosa palmaria acuminata. Panicula
terminalis cum ramis duobus oppositis uterius exsertentibus.
pauca bracteata primum trichotoma dein dichotoma.
bractea linearis utraque ad singulam ramificationem

foliis ovalibus subcordatis obtusiusculis oppositis utraque
glabri integerrimis rami glabri

Lin. fl. zeyl. no 416. herb. Herm

cymosa P. foliis ovatis acuminatis integerrimis glabris oppositis. Ramis
superne tomentosis

Scrophularia pacifica Torr.

~~Scrophularia~~ *Scrophularia* Insulis Oceani pacifici 5

Rami obscure tetragoni ciliati petioli tomentosi folia bi
f. tri pollicaria. cymbi dichotomi terminales

Premna?

Habitat in Madagascia Commerc. herb. Mus.

Rami tetragoni, glabri, glauci. - Folia petiolata, opposita, ovato lanceolata, pinnatifida, integerrima, acuta, supra glabra, subtus reticulata rufescenti glauca
Cyma terminalis, patensissima: Ramis dichotomis ferrugineo laeviter tomentosis

longata P. foliis ovatis ^{integerrimis} subcordatis acuminatis glabris alternis, pani-
culis ^{axillaribus} terminalibusque

Habitat in India orientali

Similis P. intertrifolia ad folia alterna. Peduncululi axilla-
res et terminales. peduncululi parciales alterni. ~~et~~ ^{dicto}
tomi. folium lanceolatum femurquiclosae sub rami
inferioribus panicula. Stylus bifidus.

tomentosa. P. ^{paniculatis} foliis ~~ovatis~~ cordatis subtus tomentosis inferioribus cordatis
superioribus ovatis elongatis integerrimis

Habitat in India orientali Retler &

Rami ^{oppositi} inferne teretes, superne subtetragonae apice tomentosi
sub foliis ^{oppositi} truncati a caespitibus foliorum. Folia ^{opposita} petiolata venosa
alternatim nervosa remote costata inferna fere spithamea supra
compressa et ^{panum dilata} glabra, superiora et in ramulis ovata sensim attenuata
et ^{et} utriusque mollissima secundum nervos
lineata Cymbi terminalis et ex apice ramulorum
tomentosi pedunculata partialis ^{opposita} 3-5 dichotome
divisi. Bractea subulata ad ramificationes. Calyx
persistens flores parvi. fructus magnitudinis superis
Dnipra aut glauclani herb. Boyen

Serratifolia P. foliis serratis Mant. 253. & l. V. pag. 565

Cornutioides fl. zeyl. 416.

Habitat in India orientali

Rami & vertes purpurascens. Ciliatissimi a casu foliorum truncato, marginato. Folia opposita, petiolata; ovata, obtusata, supra serrata inferne integerrima. Stipulae sub lanceolatae, deciduae. Cymae terminales, primum bracteatae, dein dichotomae. Bractee ad ramificatione oppositae lineares minutae.

non vidi

Pemna pubescens Bankf
villosa Eynd