

Prinos

6 diorica
7 nitens

Pteronyctoides Prinos foliis oblongo-ovatis integerrimis, pedunculis axillaribus subramis
floribus, flo

Prinos fideronyctoides. foliis subrotundis integerrimis Sw. prodr. pag. 50

Habitat in Montserrat. Dr. Ryan &

Rami angulati, glabri, cortice cinereo.

Folia petiolata, fraxa, 1-2 polliciana, pollicem vel ultra lata, oblonga
ovata, vel subrotunda saepe subobovata, interdum parum acuminata
obtusiuscula, vel obtusiora, basi plerumque acuta, integerrima, utraque
glabra, ^{obtusiuscula venosa} supra minime lucida, subtus pallidiora.

Petoli unguiculares, glabri, axillares, ~~superne copiosiores inferne~~

Pedunculi axillares, superne copiosiores inferne pauciores, glabri, petalo

longiores, plerumque uniflori unus vel alter triflorus. pedicelli
uniflori, alterni, gami unguiculares

Calyx sexfidui. laciniis ovatis

Corolla sexfida. laciniis ovatis

Stamina sex longiora corolla parum longiora

Bacca globosa, pisco duplo

germen conicam ovatum

Bacca globosam, pisco duplo major

Sasiat flaminibus 4. 5. 6. Dr. Ryan arborei quoque vidit floribus omnibus
in antardni

5 *Sideroxylonoides*. Trinos foliis subrotundis integerrimis Sicut prodr. 10.
Habitat in Montserrat & hinc 5

Stemmi glabri subangulati cortice cinereo.

Folia petiolata, alterna, pollicaria et ultra, obovata utriusque glaberrima
^{sepe} acuminata interdum obtusissima subconacea basi acuta, obscure
venosa subtus pallidiora

Petioles seminaequilans

Peduncululi axillares aggregati plerumque uniflori rarius triflori plerumque
formae glabri versus florem parum crassiores

Panathem sexfidum lacinis ovatis

Petala 6. limpani oblonga

Stamina filamenta .6 anthera oblonga

germen conicum

foliis obovatis integerrimis

michi videtur esse *Sid. prodr.*

pubescens Prinos

Habitat in montibus Carolina herb. Ruck. 3

Rami teretes, glabri, juniores purpurei. Folia petiolata, pollicaria, oblonga, acumi-
nata, ex trochum serrulata, subtus villosa, canescentia, basi versus integerrima. In-
ter magnitudine pipi, siliatis.

Dionia Prinos

Canada

habes

1. verticillatus Prinos ^{aluminatus} foliis ellipticis longitudinaliter serratis deciduis annuis
Pollianna major latifolia dentata Munt. phyt. 213. t. 51.

Prinos gron: var. g. *

Aqueifolium foliis deciduis Duhamel. arb. 1. p. 62. t. 23.

Prinos foliis longitudinaliter serratis Lin. l. V. p. 342.

Habitat in Virginia paludibus

Rami teretes glabri cortice griseo-fusco interdum punctato. Folia sesqui pollicari
petiolata inaequaliter serrata, subtus pallidiora venis pubescentibus. petioli
semurquiculares pubescentes. Radunculi axillares 2-3. uniflori breves.

Inter cetera: Plukin 99. tab 452. fig. 1.

Endiculus verticillatus prunifolius Congora Brasiliensis

P. gronovii Munt. an verticillatus Lin. R.

herb. Mus.

2 lucidus Pinnis foliis ellipticis acuminatis lobis apice sub serratis Hort. Kew 1. p 420

Habitat in America septentrionali? f.

Tolia semper vivente lucida

non vid.

3 glaber Pinus foliis lanceolatis sempervirentibus apice serratis
Pinus glaber foliis apice serratis Lin. Traj. pl. p. 471. + S. V. pag 342.

Habitat in Canada & f.

Indes totus glaberrimus, ramis: ramis subangulatis purpurascens. Folia
breve petiolata, pollicaria vel parum ultra, alterna, ^{subconata} supra nitida, subtus
pallidiora arena, versus apicem serratis utraque 1-3. minutis. Pedun-
culi axillares, petiolo brevioribus, solitarii uniflori vel triflori. Stigma
explanatum patinatum

Stroci masculi flamina fertilia. Germen obovatum abortivum. Styli
6. Stigmata nulla. ♀ flamina sterilia, germen subrotundum. Stylus 0
Stigma peltatum. Basia 6 sperma herb. f.

an genus ab illic diversum?

Pinos

Pinos dioica^{us}, foliis oblongo-ovatis subserratis glabris coriaceis, pedunculis axillaribus subunifloris, floribus dioicis tetrandris
Habitat in Montserrat Ryan

Rami crassitie perno cygneae, cortice griseo, punctis rariis elevatis adspersi, inferne teretes, apicem versus angulati: ramuli alterni, fusto purpurei, glabri, subangulati, apice compressi.

Folia petiolata, frequentia, alterna, pollicibus duos lato; in mare saepe rotundiora acumine brevi terminata; in foemina oblongo-ovata interdum emarginata ^{omnino} margine parum reflexa, remote obsolete serrata, basi versus integerrima, utraque glabra, venosa, supra viri nitida subtus pallida punctisque minutis elevatis adspersa.

Petioluli fusco purpurascetes, unguiculares, subtus carinati.

Mas. Pedunculi axillares, plures, caetero viginti, longitudine petioli, plerumque triflori, nonnulli uniflori. Pedicelli brevissimi

Calyx minimus, quadripedus

vulga

Corolla. Petala quatuor, oblonga.

Stamina. Filamenta quatuor, patentia, longitudine petalorum. Anthera
subrotunda.

Pistillum rudimentum germinis, depressum, striatum. Stylus nullus. Stigma
nullum.

Stemina. Pedunculi pauciores quam in mare, breviores, omnes uniflori. Flores
S. Hispanum majores.

Calyx et Corolla ut in mare

Stamina. Filamenta quatuor. Anthera effusa.

Pistillum. germen oblongum, obtusum.

Prinos ^{nitidus} ~~lucida~~, foliis oblongo-ovatis serratis nitidis membranaceis, pedunculis
axillaribus unifloris, floribus tetrandris.

Habitat in Montserrat Ryan

Rami angulati, glabri, opice compressi & scabi, fusco-purpurei
8 centes.

Folia petiolata, alterna, bi- sive tri-pollieana, pollicis ^{80pe} duos lato,
pauca acuminata, obtusiuscula, remote obsolete serrata,
basin versus integerrima et 80pe acuta, membranacea, utrin-
que glaberrima, venosa, supra nitida, subtus pallidiora,
im punctata.

Petioles anguiculares, fuscii.

Pedunculi axillares, quinque vel sex, longitudine petiolis om-
nes uniflori, glabri, fuscii.

Calyx quadrisfidus: laciniis ovatis.

Corolla. Petala quatuor, ovata, patentia, demum reflecta.

Stamina. Filamenta quatuor, erecta, petalis paucis longiora.

Anthera oblonga, e recta.

Receptaculum. Germen subrotundum: Stylus fere nullus. Stigma acutum

20
Bacca ovata, subrotunda, magnitudine Piperis nigri.

Affinis Pin. dioica, differt ramis floriferis Venuionibus fuscis nec albidis.
foliis Venuionibus, magis lucidis, basin versus plerumque angustatis et
acutis, pedunculis paucioribus, omnibus floriferis unifloris, floribus
duplo majoribus hermaphroditis.

Pterostylodes folius subrotundis calycemomni SW. prod. v. p. 50

montanui Pr. folus ovatis serratis, ped uniculis axillariibus
L.

tingitani 4

14 15