

Prothia

Cnicus

Lin. J. V. pag. 500

Prochia

Terminales

Tab. n. 1. LXIV

Prochia foliis ovatis serratis, pedunculis multi floris sub trifloris Tab. LXIV

Prochia Lin. J. V. pag. 500

Tota glabra.

Rami teretes, cortice purpureo fente. ^{quod p. pollicis ana vel minor}

Folia petiolata, alterna, ovata, attenuata, basi vix cordata,

trinervi, tenera, nervosa. seminuquiculae
Stipula salicis, attenuata, ~~ad~~ latere exteriori, ad basin usque
dentata, interiori ad medium fadum.

Racemi terminales ramulorum, tri vel quinque flori. Pedunculi
foliiformes. Pedicelli sub flore parum crassiores, ad ult. oes pedun-
culo communi longiores

Bractea lineari versus basin pedicellorum.

Calyx tri f. tetraphyllus: folioli ovatis, acuti, extus glabri, intus
villosi, staminibus parum longioribus

Stylus calycis longior.

Capfula globosa, magnitudine pisi, stylo persistente mucronato

Semina Inguetra, nitida.

Petala 3 f. 4 in Calyce quadrupeditis, minutissima pubescentia, post anthesin
etramque declivem in angulis lacunarum calycis inserta, tamen colata ^{vultu}

191

170

