

Provis

1 cephalica P.

Species alia à Thourno

pedunculata Poiris

La Martie illustrat. Tab. 763. fig. 2.

Habitat in Domingo herba Martii

Caulis herbaceus, tetragonus. Solia petiolata, opposita, sesqui pollicaria, ovato-oblonga, undulato-crenata, acuta, trinervis, avenia, glabra, crassa. Stipulae saepe bipartita: laciniis oblongis, longitudine inter nodorum, membranaceis, reflexis. Capitula globosa, peso duplo majora, pedunculata: pedunculi axillares, solitarii, oppositi, stipula longiores

Stipulaea Poirii

Habitat in St Domingo herb Le Martii

Pauli herbaceus, ramosus, glaber, semipedalis. Rami alterni. Folia petio-
lata, opposita, interdum alterna, an capi? semipollicaria, ovato-oblon-
ga, glabra trinervi, avenia, subtus subvenosa, crenata, acuta. Stipulae
linguae ulvae, opposita, ovata, obtusa, membranacea, persistentes, purpure-
rascentes. Pedunculi axillares, solitarii, bracteae stipulae longiores.
Capitulum globosum, magnitudine pisi
an Differtia caulescens

cephaleus Prostris foliis lanceolatis integerrimis

Habitat in insula Bobona Com. Mex. herb. Guaf.

Rami cespitii pennis asperis, glabris. Folia petiolata, ^{alternis} que pollicaria,
attenuata, scabriuscula, altero latere angustiora et basi breviora. Petioli
unquiculati. Stipulae subcordatae, petioli vix aequantes, caducae. Capitulum
globosum, sessile.

acuminata ~~Urtica~~ Provens foliis lanceolatis acuminatis serratis glabris
Habitat in Tera Commaron herb. Tuss.

Ar. urtica. Caules filiformes, teretes, glabri, purpureo fientes. Folia
brevissime petiolata, bipollicana, basi acuta, apice in acumine semipol-
licari attenuata, grosse serrata, utrinque glabra, glomerati sesquialter
solitarii, glabri, magnitudine vix Piperis nigri. Stipulae setaceae, petio-
lorum longitudine.

Supposita Provis foliis lanceolatis serratis

Habitat in insula Bobonia Comnes. herb. Guss.

Similis *P. cephalis*. Solius puberis pallidiora, grosse serrata, basi versus
intezerrima, sic abrupsiula, interdum latere interiori angustiora. Sti-
pulo subulato, pollicario. Capitula sessilia, axillana, globosa, villosa.

canescens C. v. n. folus oblongi extusum serrati, ramis capitulisque canescenti-

bus
Habitat in Gara Commes. herb. Guss.

Caecis reliquonem. Ramis superne, uti vena majori subtus villosa - Tomentosi.
Folia breviter petiolata, 4 pollicaria, a medio fere ad apicem grosse serrata, costarum ^{intra maxima} glabra, venosae, subtus pallidiora, aculeata supra squa
mulis albis. Stipula lanceolata, attenuata, pollicares, petiolo duplo
longioris. Capitula gemina, sessilia cinerea

repens Provis^a folus oblongis extrosus-feratis, capitulis tomentosis, caule re-
pente.

Habitat in Philippinis Commarum herb. Aust.

Caules tenues, villosuli. ^{albi} Folia subsessilia pollicaria, lania, subtus palli-
diora, ciliis praefatis ^{albi} denatis ut in urticis, obtuso, altero latere angustio-
ra et breviora. Capitula incana, magnitudine pipeni nigri.

Dorstenioides Prostris

Habitat in Tava Commeson

Caulis a foliis ad folium flexuosus, glaber, angulatus. Folia petiolata
alterna, sive polliciana. Amentum hemisphaericum, pedunculatum
atillare, nigrum

ut credo Diversam a Prostrata acuminata hoc Descripta e coll. Mus. unde habet

Cephalicia
Corymbosa Procmis.

Habitat in Insula Bortonia

Caulis herbaceus erectus simplex, ^{et} firmus erectus, glaber. Folia petiolata
alterna per paria approximata, lanceolata, acuminata, integer-
rima, glabra oblique nervosa, venia, pinnatifida, altero latere
infr. ^{appressata} ~~versus angustiora~~ breviora. Stipula ovata, unguicularis.
foliacea decidua. Petiolus unguicularis. Flores in capitulo axil-
lari, magnitudine corollae, glomerati, sessile.