

Prinella

1. vulgaris P. foliis ovatis ovato-oblongis serratis petiolatis
grandiflora

2. laciniata P. foliis ovato-oblongis petiolatis pennatifidis supremis

3. hypopurpurea P. foliis lanceolatis integerrimis sessilibus, caule erecto

parviflora P. foliis petiolatis ovato-lanceolatis subdentatis, fructu sessili;
floribus bracteas vix superantibus. Pers. A. 2. pag. 100
Habitat in Barbana

non vidi

India P. foliis oblongis superne crenatis fructu capitato, bracteis ciliatis Burm
fl. ind.

Habitat in India Orient.

an Verbena? non vid.

intermedia P. foliis inferioribus sinuato-dentatis: superioribus integris den-
tatis; Calycibus summis coloratis Luth. Ann. Maturg. 1. pag. 32

no mihi non nota

vulgaris P. foliis omnibus ovato-oblongis serratis petiolatis Lin. Spec.
pl. pag. 8374.

Brunella Dod. pempt. 136

Brunella major foliis non dissectis Bauh. pin. 260

grandiflora β Brunella non vulgaris Pluf. hot. 2. p. 42.

Brunella coerulea magno flore Bauh. pin. 261.

Habitat in Europa passim β in fessuni rupium. Semper ascendente

Caules palmari et ultra simplices ^{vati} decumbentes tetragoni
superne pilosi inferne glabrescentes. Folia petiolata ^{etiam}
duo ultima nervo-venosa pilis parvis raris adpressis
pelticatis obtusa. bractea cordata ^{acuminata} ~~obtusata~~ cal purpureo
ciliato. Calycis pilis albidis raris adpressis subpungentibus

~~bractea cordata attenuata~~

grandiflora serratis modo omnibus partibus major. folia supra
integerrima

hispifolia P. foliis lanceolatis integerrimis sessilibus, caule erecto ten.
L.V. pag. 547 *

Brunella hispifolia Bauh. pin. 261.

Brunella angustifolia integra hispidior Monf. bot. 3. p. 364. f. 11. v. 5. fig. 7.

Habitat montalis ?

Caulis erectus simplex vel ramo uno vel altero quadrifarium
pelosus. Folii inferiora ~~suppetiolata~~ ^{margine scabro} superiora sessilia alte
innata, in ^{pollicum} ~~pollicum~~ una supra pelis raris subtus cetero
pelosa. Bractea nervosa ciliata acuminata subhem
bodesi

Lacinata P foliis ovato-lanceolatis oblongis petiolatis: supremis quatuor
lanceolatis dentatis Lin Spic. pl. p. 374 Guigu fl. austr. 4. v. 370.

Brunella II. non vulgaris Clus. hist. 2. p. 43.

Brunella foliis laciniatis Bauh. pin. 261.

β. Brunella minor alba laciniata Bauh. pin. 261.

γ. Brunella verbenula foliis, flore comulis Vaill. parif 2. v. 5. fig. 1.

Habitat in Europae partibus variis

Caulis patententis pilosi patentes, semipedales simplicis.

Folia petiolata, ~~duo ultima sub pino~~ ^{superiorum} ~~folia~~, pinnatifida

laciniis linearibus lanceolatis, acutis pilosis velutis, termi-

nalis latior. petioli pilosi pini. Spica bipollicaris

bracteis subrotundis ac valde acuminate ciliata

calycis bracteis dentibus tribus attenuatis subperispermis

Duo sub pino
les filia

Superioribus
pinnatifidis