

Pedium

Conyzetum Spiduum

Habitat in Cayenna herb. la Martini.

Rami cortice unereo, uti reliquae partes & lani. Folia sessilia, tri-pollicaria, oblonga, parum acuminata, integerrima, utraque glabra, subconcaeva, supra nitida et obsolete nervosa, subtus obscure venosa. Pedunculi terminales tri-vel plures, axillares solitarii, pollicares, uniflori. Calycis foliola laciniis quinque, ovato. Germen globosum.

macrophyllum Pfdum.

Habitat in Penn Dombey herb. Aug. 5

Rami inferne teretes, superne compressi, subtomentosi. Folia petiolata, sub
fruticosa, opposita, ovata, venosa, glabra, utrinque nervosa vel tosi cinerei,
absque striis supra, extropum obsolete crenata. Petioli semi pollicis acri tomen
tosi. Peduncululi axillares, longitudine petiolatorum, 3flori, indivisi. Caly
cis lacinia ovata, utrinque tomentosa.

Ann. plexu aule *Phidium* foliis ovato-subrotundis sessilibus basi subcordatis

Habitat in Cantellis Richard herb. Aug.

Rami teretes, apice compressi, glabri, superne uti folia utrinque et calycis elevato punctati. Folia opposita, pollicaria vel parum ultra, suboriacea, arenosa, utrinque glabra, subtus obscure nervosa. Pedunculi axillares, solitarii, semi unguis ulares. Germe oblongum, uti lacinis calycis glabri

grandiflorum Pl. foliis ovatis acuminatis, baicca quadriculata Aubl. fl.
qu: 1. pag. 483. tab. 190

Habitat in Guiana ad Richard

Rami teretes, cortice uneres, glabri: ramuli compressi, submentosi.
Folia petiolata, opposita, bipollicaria, ovata, acuminata, serrata, oque
ex saepe basi, venosa, lania, absque stinis, glabra, retzerrima, subtus
oculo armato punctis elevatis, numerosis, axillis nervorum ullos.
Petioli unguicularer. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, sesqui
pollicares. Calyx tomentosus: lacinae rotundate. Petala utraque
punctata herb. Gu.

Opdium aromaticum est specimen fructiferum grandiflorae
off. Rich.

aliud specimen in herb. Gu. f. id. an modo varietas?

Petiol. breves. Folia elliptico lanceolata, utraque punctata. Pe
dunculi bi vel triflori. Flores latentes pedicellati ut in mod. i. v.
sesplici

uadi

caninum. *Spina* folus sub ovatis puberulis utraque tomentosis, pedun-
culis axillaribus terminalibus que multifloris Lour. fl. Co-
chin. pag. 310.

Habitat prope Cantonem proamum &
Aspicula bipedali ramosisima, diffusa. folia subciliata,
venosa, alterna, breviter petiolata. flori albi vix multi
oblongi cal. 5 fidius Corolla 5 petala. Bacca ovata unilocula
ni, polysperma

negrum *Spidium* foliis ovato lanceolatis leviter serratis glabris, pedunculis
terminalibus ramosis. Lour. fl. Cochinch. pag. 311.

Habitatio sylvae Cochinchinae

Abor medio ens. Folia utraque glabra, sparsa, nervis aut costis
nullis oblique vixida nitida. Flores albi. Baccis maxima
repta rotunda, loculari polysperma

non vid.

nubum. Pfdum foliis oblongis integerrimis, floribus sessilibus congestis aut illanibus
Lour. fl. Cochinch. pag. 311.

Habitat in sylvis Cochinchinae.

Arbor medicinis - folia obtusa, glabra, opposita petio breviter petiolata.

floribus multi albi. Cal. tubulosus oblongus & dentatus. Petala 4 parva
inæqualia. Baccæ oblongæ rubra parva polysperma.

Decaspermum P. foliis ovatis acuminatis planis, pedunculis bracteatis
lobis uniloculari Lin. suppl. pag. 252

Decaspermum fruticosum Forst. nov. gen. n. 37.

Habitat in Tahiti &

Rami alterni ~~op~~ teretes inferne glabri superne villosi
iniani. Folia ^{bracteis} petiolata, opposita, pollivaria ovata
acuta pericoma utraque pilis albis frequentibus adpressis
statae glabra supra nitida subtus ^{conspicuis} villosa ^{foliis} punctis copiosis
ferrugineis. Pedunculi in supremis axillis solitarii oppositi
uniflori iniani uti gemmae. bractea duo lineares ad basin
germinis. Flores parvi

pyniferum P. foliis oblongis lineatis nervosis pedunculis trifloris subtis flori

male puniceo affinis pomifera, flore pentapetalo albo,
fructu et toto esculento majori albo Sloan. hort. 2. p. 163.

Pela Rheed. mal. 3. p. 31. t. 34.

Guajava alba dulcis Comm. hort. 1. p. 121. t. 63.

Psidium pyniferum foliis lineatis obtusifusculis, pedunculis
unifloris Lin. P. V. p. 460 Jacq. off. 2. p. 6. t. 31

Guajava domestica Rumph. amb. 1. p. 140. t. 47.

pomiferum P.

Psidium pomiferum foliis lineatis acuminatis pedunculis
unifloris Lin. P. V. p. 461 Jacq. off. 2. p. 7. t. 31.

Malacca pela Rheed. mal. 3. p. 33. t. 35.

Cyrtus agesti Rumph. amb. 1. p. 142. t. 4.

Guajava pomifera india: pomi rotundi Bauh. pin. 437.

Guajava alba acida, fructu rotundior Plukin. alm. 101.
Tab. 193. fig. 4.

Habitat in India &

non ducit ex observ. Dr. v. Probr

Rami inferne. Venter fuscus glabrus, superne compressi villosi subtomentosi
Folia petiolata opposita ut Inpoliciana utroque glabra subtus
tenuissime venosa, integerrima. Petiolus brevissimus. Peduncululi axilla
oppositi foliis duplo breviori triflori: flori laterales pedunculati intermedius
sepius bractea subulata ad basin lateralis. Pyriforme et pomifor
me specie non differunt ex observatione Du Roini qui ex feminibus
alterius satis alteram excrevit.

Guineense P. Soleus ovatus integris subteris tomentosis, pedunculis trifloris
In prodr. pag. 77.

Habitat in Insula principis Africae; in Domingo culta &

non vidi

9-2 ~~pumilum~~ Psidium Psidium foliis lanceolatis lineatis acutis pedunculis unifloris, fructu globoso

Habitat in Tajlona König

Fructus brydalis

Species ex aede Ps. pyriferi ad omnia stuplo minor. Rami tetragoni villosi cinerei.

Folia petiolata, opposita, sessilia, polliciana, integerrima, acuta, mutis supra glabra, subtus villosa.

Petiolus brevissimus

Pedunculi ex apice ramulorum gemini, unguiculati villosi.

Calycis ^{obtusos} ~~foliola~~ lanceolata, ^{concolor, intus villosa.}

Fructus globosus, ^{magnitudine nuclei Carya} ~~precisus~~ ~~meo~~ ~~magne~~ subvillosus.

Cajavellus Ruum psh. amb. 1. p. 145. 7. 49

anguste folium La Mart. fide herb. L. M

montanum Pl. foliis oblongis acuminatis denticulatis nitidis, pedunculis multis
levis Sw. prod. pag. 77

Plidum 2. Brown Jam. 238

Habitat in India occidentali

Rami glabri, inferne teret. cordice uneres teretes superne per
rursascentes glabri. Folia petiolata, opposita attenuata late
gerrina vel crenata (serrata), utraque glabra subtus venis ex
stantibus supra loria nitida bis. In polliciana. Pedunculi
axillares.

integerrime que