

Pforalea

*foliis simplicibus

1. rotundifolia P. foliis ovatis integerrimis, capitulis bracteisque villosis
2. corylifolia P. foliis simplicibus ternatis ^{ve} ovatis subdentatis: spicis ovatis
3. aphylla P. foliis linearibus subulatis deciduis, stipulis ovatis acutis perenni-
bus rigidis

**foliis ternatis

4. capitata P. foliis ternatis simplicibus ternatisque linearibus lanceolatis, capitulo
terminali sespale, stipulis subulatis
5. aculeata P. foliolis cuneiformibus conduplicatis, ramis angulatis glabris, floribus
lateralibus solitariis
6. bracteata P. foliolis obovatis recurvato mucronatis, spicis ovatis, bracteis calycem aequan-
tibus, dente inferiore calycis ovato
7. spicata P. foliolis cuneatis, spicis cylindricis, bracteis flore brevioribus: laciniis
calycinis subaequalibus
8. triplora P. foliolis obovatis, floribus axillaribus sessilibus ternis, stipulis ovatis acutis
9. stachydis P. foliis petiolatis: foliolis oblongis mucronatis, spicis terminalibus in-
terruptis, calycibus villosis

10. hirta P. folioli obovatis recurvato mucronatis, spicis axillaribus floribus
ternis, calycibus tomentosis
11. repens P. folioli obovatis emarginatis, caule repente, floribus subumbellatis
12. axillaris P. folioli lanceolatis, pedunculis axillaribus unifloris
13. tenuifolia P. folioli subulato-staccis, stipulis vaginalibus bifidis laciniis subula-
tis, floribus axillaribus
14. angustifolia P. folioli linearibus, pedunculis axillaribus solitariis ternisve paucis
floris.
15. decumbens P. folioli obovatis, pedunculis axillaribus caule prostrato decumbente
16. glutinosa P. folioli linearibus, stipulis semiconcato-lanceolatis foliolis
laciniis
17. bituminosa P. folioli lanceolatis, petioli glabrisculis terribus, floribus capitatis
18. palastina P. folioli ovatis, petioli pubescentibus, floribus capitatis
19. glandulosa P. folioli ovato-lanceolatis integerrimis, floribus spicatis, stipulis staccis
20. ameniaca P. folioli ovatis dentatis, spicis axillaribus longitudine foliorum
stipulis ovatis
21. tetragonoloba P. folioli ellipticis dentatis, caule flexuoso, spicis folio longioribus,
leguminibus quadrangulis, stipulis staccis
22. denticulata P. folioli obovatis apice denticulatis, pedunculis axillaribus
unifloris foliis brevioribus.

- ~~22~~ Falcois pennatis
- 23 pentophylla P. foliis digitato-quinatis, foliolis inaequalibus
24. pinnata P. foliolis pinnatis, floribus axillaribus
25. ~~parviflora P. foliis subulatis, stipulis axillaribus minutis, rac~~
25. enneophylla P. foliolis ellipticis obtusis, pinnis axillaribus
26. longata P. foliolis lanceolatis, stipulis foliis subaequalibus minutis pinnis
27. leporina P. foliolis oblongo-linearibus numerosis pinnis, pinnis bracteatis villosis
 ~~ps lanceolatis~~
28. foliosa P. foliolis oblongis numerosis pinnis, pinnis terminalibus bracteatis globosis
 ~~ovatis, calycibus compressis~~
29. Dalea P. foliolis linearibus, pinnis cylindricis terminalibus
30. prostrata P. foliis supra decompisitis digitatis linearibus
24-25 parviflora P. foliolis subulatis, stipulis axillaribus minutis, racemis axillaribus

2 Coryliifolia ^{Pfora} ~~Pfora~~ ^{leae} foliis simplicibus ovatis subobovatis: pinnis ovatis lin. S. V. pag. 686
Trifolium unideliu; Leguminibus racemosis, nudis, monospermis, foliis simpli-
cibus cordato subrotundis, repandis Corki Desf. pag. 146.

^{resumma} ~~inter~~ plantas Corki inveni, ^{que et} quam ex India a Thongio ~~paradoxi~~
accipi, ~~foliis~~ foliis superioribus ternatis, ceterum ne tantillum a Coryliifolia lin.
diversa. Sata in horto ex seminibus a Thongio sub nomine Trifolii paradoxi,
individua alia erant foliis omnibus ~~alio~~ tant simplicibus alia superiori-
bus ~~ternatis~~ foliis simplicibus ternatisque

1 rotundifolia Pfl. foliis simplicibus ovatis integerrimis, capitulis bracteis
que villosis Lin. Suppl. p. 330. P. V. p. 605.
Habitat ad Cap. b. p. ei

non vidi

2 coryli folia l. foliis simplicibus ovatis, subdentatis: pinnis ovatis Lin. l. V

^p Loto affinis coryli folio Plukn. alm. 227. t. 96. fig. 9. Dod. art. 4.

Trifolium unifolium p. 289. t. 289.

Cum Legum. Habitat in India
et rariore si nuda ^{superioribus inferioribus}

^{β.} foliis ternatis simplicibus que
Monospermi, foliis ^{caulis} erectis bipedalis glaber ramifus. Folia petiolata, bipolli-
simplicibus ^{caulis} cana latitudine et longitudine ^{sepe} aequalia remote dentata
+ 6 ^{subrotundis} versus apicem integerrima. Stipulae cuneolatae patentis
repanda ^{superioribus} ^{inferioribus} pedunculato axillares longitudine foliorum flores
Nag. 140 ^{anther} 12 ad apicem pedunculi conferti. Bracteae cuneolatae
longitudine calycis. Calycis glabrae uti tota planta
punctis nigris adpersa

foliola lateralia in varietate oblonga minorum

Spont

7 aphylla P foliis nullis, stipulis mucronatis brevissimis versus flores subimbricatis Lin. Am. acad. 6. p. 99. n. 344.

Genita partium coeruleum C. b. Jac. Bryn. Cent. t. 25.

Habitat ad C. b. Jac. t.

Rami virgati Heretes cortice cinereo glabri Ramuli prostrati, angulati inferne simpliciter, superne ramulis filiformibus angulatis pubescentibus, stipulis dentatis, aphylli Ramuli Tenerrimi foliosi. Folia lineari subulata acuta subpubescentia unguiculata tantum in ramulis ultimis et summitatibus ramulorum, decidua Stipula parva ovata acuta rigida frequentes prostrata apice patuli ^{nudantes} inaequali Flores in summitatibus ramulorum, alterni pedunculata. Squamae duae connatae ovatae in tubum ovatum versus basin pedicelli. Calycis laciniis ovato acuminato subquadratis

aphylla P foliis lineari subulatis deciduis, stipulis ovatis acutis prostratis rigidis
Floralia decidua foliis lineari subulatis deciduis, stipulis ovatis acutis prostratis rigidis floribus alternis subsessilibus terminalibus
Berg cap. p. 226

Cutea Cf. *folia fasciculata*. foliolis ovatis rugosis, pinnis pedunculatis
Molina Hist. nat. Chili. p. 139
Habitat Chili.

non vidi

4 capitata P. foliis ternatis simplicibusque lineanibus, capitulo terminali her
Suppl. p. 339. * R. V. pag. 686

Habitat ad P. 6 pici

Rami fructu. Folio petio lato, digitalia, punctis ut compressis
utrinque adpresso. Suprema sessilia. Capitulum subrotundum
terminali, foliis oppositis ternatis ovatis, simplicibus lineanibus
dentatum. Perillum punctis adpressum

ae capitata? herb. Ruyon

Sibthorpea, ramosa. Rami vertes, punctati, glabri. Folio petiolata, ternata: foliolo
lanceolata, pollicaria, acuta punctata, glabra, nervis lobulata sessilia
Stipula lanceolata attenuata. Folio floralia simplicia, lineari-lanceolata. Pappi
cili, elongati. Flores in capitulo oblongo sessiles. Bractea ovata, attenuata
glabra punctata, longitudine calycis. Pedunculus inter flores uti calycis pili
nervi cunctis. Perillum striatum

capitata P

capitulo terminali sessile stipula subulata lineari lanceolata

³⁷
~~19~~ *Venuifolia* P. foliis inferioribus ternatis: superioribus simplicibus lanceolatis
subulatis Len. Mant. 450. P. V. p. 686.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Creidet ramis teretibus glavis. Folia in a di ripera stipulam petiolate
staiico subulata unguiculata glabra. Stipula vaginantes solitari
superne bifida unguiculares bifidi: Cacinis staiico subulatis longitu
dine oppos stipula. Flori axillares terni pedunculati: peduncu
li longitudine stipulam capillares, medio bracteii gemini staiici.
Cacinis calycis lanceolatis in stam attenuatis inferior major

Venuifolia P. foliis ternatis subulatis staiici, stipulis vaginalibus bifidis Cacinis
subulatis, floribus axillaribus

notus inter 4-5 colloc

4 aculeata P. foliis ternatis: foliolis cuneiformibus recurvato mucronatis, capitulis terminalibus Lin. Mant. 450. 4. 1
Geneta partem africanum trifolium, floribus coeruleis, foliis minimis in spem definitibus Praj. dendr. 104.

Habitat ad Cap. 6 p. 5
flore laterales solitarii habet Descriptio Mant
Rami glabri, angulati. ^{conspicua} folia petiolata. Soliola glabra, minora quam in reliquis foliis lanceati valde obtusa mucrone patulo rigido pungen-
te ut unguiculata. Bipula setacea rigida pilula. Pedunculi ex
axillis supremis angulati longitudine foliorum bini cum duobus ovatis
oppositis mucronatis. Calycis magri campanulati, laciniis ovatis mu-
cronatis subaequalibus trinerviis. Vexillum voluteum nervosum

aculeata foliis ternatis: foliolis cuneiformibus recurvato mucronatis ^{conduplicatis}
natis, ramis angulatis glabris floribus lateralibus solitariis

C bracteata P. foliis ternatis obovatis recurvato mucronatis spicis ovatis
Linn. Mant. 264. t. V. p. 685 & Berg. Cap

Trifolium africanum Gussone; flore purpurascente Comm. hort.
2. p. 211. t. 106.

Trifolium spicis subrotundis: laciniis calycum infima maxima,
foliis pinnis trifolibus Hort. Cliff. 3734

Trifolium Gussone spicis subvillosis: laciniis calycum infima
maxima, caule Gussone, foliis trifolibus Linn. sp. pl. p.
1085

Habitat ad P. b. sp. t. ramulosis, ramulosis

Caulis ~~et~~ Rami teretes superne villosi, subnervi. Folia trifoli-
cia. Petiolus vix ultra caulem exsertitur. ~~Et~~ Foliole obovate apice
mucrone flavescente reflexo supra sulco longitudinali
in medio utriusque lobis glabra venosa angustulana inter
medio parum major. Stipulae lan. obovate acuminatae stratae
semunquiculares ciliatae patentibus membranaceae. Spica
terminalis ovata compacta. Bractea ovata acuminata

Inf. fuit Syn. v. d. V. ciliata nervosa. Calyx luteus

bracteata P. foliis ternatis foliolis obovatis seu recurvato-mucronatis
speciis ovatis calycis bracteis calycis aequantibus calycis bracteate inferiori
^{ovato} ^{folior}
Pforalea bracteata: foliolis obovatis recurvato-mucrona-
tis, specibus terminalibus, bracteis ovatis acuminatis citra
li. Berg cap. 2247

calycium deorsum inferius ovatum ^{acuminatus} major

in differentia forte adde ramis teretibus villosis

7 *Spicata* P. foliis ternatis oblongis obtusis, spicis cylindricis hinc Mund
2644 S. V.

Habitat ad Cap. b. spici 5

Rami teretes glabri ramulofi. Ramuli alterni cinereo villofi
foliis ^{foliolis} ^{trifloris} ^{trifloris}
Folia breviter petiolata ^{oblonga} oblongo-cuneata in inferioribus obtusa
absque mucrone in superioribus mucrone recurvato in utroque
villosi pollicaria gibbi sub petioli. Nervis lacunculato ad
natis villosi adpressi. ^{trifloris} Spicis mucronatis quam in bractea
to. Spicis terminalibus bipollicares. Flores copiosi conferti
umbriati ~~parvi~~. Bractea ovata ciliata, acuminata longitudine
calycis. Calycis villosi

Spicata P. foliis ternatis foliolis ^{cuneatis} oblongis, spicis cylindricis bracteis flore
terioribus laciniis calycinis subsqualibus

8. *Triflora* P. foliis ternatis, foliulis obovatis, floribus axillaribus seorsim
ternis. Sepalis ovatis obtuse acutis

Habitat ad Cap. v. pui

Cum, capitata habitu convenit, diversa tamen mihi videtur
ramuli villosi cinerei. Folia petiolata. foliola obovata, latera
longius angustiora, scabriuscula margine obscure crenulatis superioribus
pilis raris adpressis. Sepala brevia patentissima, alba.
pallide ferruginea. Calycis pilosi

Rami varietaliter, concoloriter. Foliola subsessilia, lineari cuneata, apice
recurvato mucronata, vix angustiora villosula. Sepala minuto
ovata. Clavae axillares filiformes breviter pedunculatae, foliis brevioribus
Calycis laciniis filulatis habetur

bipedunculata B

Psoralea bipedunculata Gaigu. Coll. 4. p. 146.

Habitat.

Caulis bipedalis teres ramifus; ^{ad} centum villosi. Stipulae subulatae. Folio-
reticulatae ternatae parvae. Folioleae oblongae, obtusae, integerrimae, glabrae
reticulatae. Racemi axillares, erecti, multiflori, pollicares interdum gem-
mi altero brevior pauciflori. Flores parvi. Bractea minuta lanceolata
calyx pilis adpressis. Corolla purpurea. Filamenta omnia connata
legumen late lanceolatum, acutum, compressum uniloculare. Semen
unicum Gaigu.

9 *Paehodis* P. foliis ternatis petiolatis: foliolis oblongis mucronatis, spicis
terminalibus interruptis, calycibus villosis Len-Suppl. p. 330. &
L. V. p. 686.

Habitat ad P. b. spici

Rami teretes glabri striati. Ramuli spicis villosis cinerei. Folia trifolia: foliola
obovata pollicaria ^{lateralia minuta} mucrone reflexo utraque velis minutis ad presertim subtus
subcinerascens. Spicis terminalibus ^{ex} in apice ramulorum palmari-
pedunculato. Siliis 2-3 simul distanti. bractea lanceolata brevis
ad basin. Calycis cinerei infundibuliformis.

an mea Linnei corolla enixa in nosse flava nec ferruginea

10 hirta P. foliis ternatis; foliolis obovatis recurvato mucronatis, floribus ternis
sesquibus. Len. Am. acad. 6. p. n. 357
Habitat ad P. b. p. t.

Rami teretes glabri suprenses purpurascens, pubescentes
juniori hirti cinerascens folia breviter petiolata: foliola
unquiculana cusata obovata mucrone reflexo, scabru
pila margine costa et subtus pilis raris longis. Lateralia
altero latere angustiora. Stipula ovata obtusa pa
tertiojmo parte ciliata. Flores tres axillis supremis sesquis
Calycis hirti

hirta foliis ternatis foliolis obovatis recurvato mucronatis, sti
pulis ovatis floribus axillaribus sesquibus ternis

hirta foliis ternatis; foliolis obovatis recurvato mucronatis, floribus
sesquis axillaribus floribus ternatis, calycibus tomentosis
Rami teretes dense villosi. Folia petiolata. Foliola pollicaria
Lateralia minor, utraque pilis raris longis. Stipula lanceolata acumi
nata. Pedunculi axillares elongati villosi subtomen topipalmares

Flores distantes ~~sess~~ ternati. Calycis tubulosi subtus nigro supra
aerose tomentosi laciniis canaliculatis

Truncus nudus. Rami subflexuosi, iniani. Soliola unguiculata
lanescentia. Flores versus apices ramorum, terni, sessili
• Bractea loco foliorum ovata. Calycis limbo herb. Royenii.

11 repens ^P foliis ternatis obovatis emarginatis, caule repente, floribus sub
umbellatis Lin. Mant. 265. P. V. p 686 Berg.

Habitat ad Q. b. p. 4

Caules repentes radicanter, subligosi, summi firmi, longissimi. Folia ternata
petiolata: foliola obtusa nuda sessilia. Petioli longitudine foliolorum.
Stipula murice orata acuta. Umbellae sessiles, laterales, terminalesque.
Flores coerulei. Lin.

axillari P. foliatis Ternatis: foliolis lanceolatis, pedunculis axillaribus
unifloris Len. Suppl. p. 330. L. V. p. 686.

Habitat ad C. p. p. p.

Rami teretes. Ramuli sparsi, frequentes simplicissimi tripollicares superiores
sive minores, foliosi. ^{copiosa} Folia petiolata. Soliola sessilia lineari lanceolata
~~non inquetm~~ ^{ut} unguicularia subtus carinata supra canaliculata, glabra
Stipula axillaris minuta. Pedunculi axillares gemini longitudine
foliorum uniflori patentissimi, versus apicem bractei binis minutis, ac
ob oppositis. Calyx glaber punctis numerosissimis fere fere testis laciniis
lineari lanceolata acuta, inferior parum longior acutus

credo quod mea recte determinata

14 angustifolia P. foliis ternatis lineariibus, pedunculis axillaribus solitariis
In nuce paucifloris L. Heret. Prop. nov. 2. 1. 45.
Habitat in Cap. 6. p. 15

Non vidi

15 Decumbens P. foliis ternatis, foliolis cuneiformi- obovatis, pedunculis axillaribus cau-
le fruticoso decumbente

Poralea decumbens foliis ternatis, foliolis cuneiformi- lanceolatis
mucrone recurvato, floribus axillaribus Hort. kew. 3. p. 80.

Habitat in Cap. b. p. 5.

a repente diffidit caule caule fruticoso non radicante. Pedunculis non
umbellatis, p. 4 or

Caules lignosi, decumbentes, striato angulati, tenues, glabri, rami
debiles. Rami axillares remoti. Folia pedicelata

16 glutinosa P.: foliis ternatis: foliolis linearibus, stipulis semicondato-lanceolatis
foliolis latioribus

Habitat in cap. b. p. a. de Dall missa sub nomine Flor. Parth.
D. an vero hujus generis

Paulis fruticiosis ramis ramis elongatis teretes pubescentes
foliis petiolatis, foliolo linearibus extus convexa intus supra cana
ciliolata ex trospum versus parum latiora, obtusa, unguiculata
lateralia parum minor. Pubescentia. Petiolus facie et lati-
tudine fere foliorum. Stipula longitudine petioli basi versus
fere parum latiora obtusi stipuli. Flori ad apices ramorum, sessiles
interdum stipulis bracteas lanceolatas longitudine fere calycis,
alter flavi. Calycis bilabiati labium inferius major pubes-
centi viscoso.

convenit omnino cum descriptione in Loti mountain. Specimen
plantarum quoddam stipula, desentit. vero horum descriptio in
an Ononis? Bergio et Kenoso

17 bituminosa P. foliis omnibus ternatis, folioli lanceolatis, petioli ^{platinifolij} lobatis, flori-
bus capitati Lin. V. V. pag.

Trifolium bituminosum Dod. pempt. p. 566.

Trifolium bitumen redolens Bauh. pin. 327

18. *Trifolium bituminosum* inodorum Bass. syst. Op. 8. 11. fig. 2.

Trifolium bitumen redolens angustifolium Boeck. Lugdb. 2. p. 32.

Habitat in Sicilia, Italia, Narbono collebus montibus &

a Palloftina differt pilofitate minore foliis angustioribus basi
et apice latitudine aequali. Flores pauciores minus hepaticae rari-
minores

varietatem in herb. mus. vid: foliis lanceolatis

13 palostina P folus omnibus ternatis, folioli ovati, petioli pubescentibus, floribus
capitatis Lin. l. V. p. 686 + Suppl. p. 339. Jacq. hort. 2. t. 184.

Habitat in Palostina.

Caulis herbaceus striatus, pilosus pili cornuti patuli, petioli striati
pilosissimi. Stipulae subulatae unguiculatae. Foliolela ovata
in aliis dationibus in aliis parum angustioribus, mucronatis, pilosis
flores cornuti majores quam in reliquis. Pedunculati foliolela
duplo vel triplo longiores. bractea infima ovata acumina
ta inter flores lanceolata calycis herpeti. Legumen ovatum
rostratum fusco herpetum

Culta

19 glandulosa P. foliis omnibus ternatis: folioli lanceolatis, petioli pinnatis
scabris, floribus pinnatis Lin. Spec. pl. pag. 1075. 4

Barba jovi triphylla, flore ex albo et caeruleo Sewall. penus.

7. t. 3.

Phoralea foliis omnibus ternatis, caule erecto arborescente, pe-
dunculis pinnatis, bracteis minimis ciliatis Ardum. spec.

24. t. 8.

Habitat in Penus

Caulis teres, glaber punctis et prosi adpressis ut in reliquis
Foliola petiolata elongata, integerrima bipollicaria
vel ultra lateralibus minoribus, pilis minutis variis utraque
adpressa stipula setacea minuta. Spica pedunculata
axillares longitudine fere foliorum, multiflora. Bractea
minuta parva ovata longitudine pedicelli acuminata. Calyx
pelosus pilis

glandulosa

integerrima

folioli ovato-lanceolatis

cult

20 americana P. foliis ternatis: folioli ovatis dentatis spicis axillaribus longis
vidine folionim. Stipulis ovatis
Trifolium americanum Lob. ii. 2. p. 31. Dod. pempt. 567. Bauh.
pin 327

Phoralea americana foliis ternatis: folioli ovatis dentato
angulatis, spicis lateralibus Lin. Spec. pl. pag. 1075 & Torr.
in Com. Gotting. 1789. p. 64.

Habitat in maderia &

Caulis herbarici, diffusi. ^{glabra} Solovola pollicaria lateralibus parum
minora et latera interiori parum angustiora petiolata ter
trifolii acuta, terminalis subrhombium, obtuse remote denta
ta. Stipula acuminata. Spica interrupta. Flores sub
verticillati. Bracteae lanicolatae longitudine fere caly
cis. Calyx pelosus

24 Tetragonoloba P. foliis ternatis dentatis, caule flexuoso, fructibus lateralibus;
leguminibus fructis quadrangularibus Lin. Mant. 104. Pl. V. pag 686
Habitat in Arabia, Sualto

Caules herbaceus erectus, flexus sulcato angulatus rase piloso
Follicula elliptica basi acuta apice acuminata, bipollicaria
lateralia paucimembra scabibus remotis paucis mu-
ronatis ^{utrinque} pilis minutis raris adpresso subtus pallidiora. Squa-
la fetaceo. Spica axillaris, flosae pollicares petiolo multo
breuioribus ^{foliis} triplobrevioribus. Bractea fetaceo. Legumina longita-
dine foliorum sutura utraque utraque membranaceo-angula-
ta acuminata acumine elongato. Semina 4. f. 5

Tetragon-

fructibus longioribus squamis fetaceis

Mant

22 denticulata ^{Pf.} foliis ternatis: foliolis obovatis apice denticulatis, pedun-
culis axillaribus trifloris foliis brevioribus

Habitat in Cap. b. p. 5 & Lake

Ramosus, caulis uti rami cinerei. Folia petiolo foliola
unquiculata cinereo virentibus & pilis parvis adpressis
lateralibus minoribus subsessilibus. Petioli ternati. Pedun-
culi axillares breves. Calycis villosi cavi flores parvi
flavi. Legumen oblongum villosum albidum longitudine
calycis

Folia fere medicaginis, an huius generis?

Phoradendron

23 pentaphylla P foliis digitato-quinatis, folioli inaequalibus linc. 5. V

Pteralea pentaphylla, radice crassa B. Tuss. in Act. par. 1744.
p. 301. t. 17.

Habitat in Mexico vel Malabarā.

Caulis e pulis albidis cinereis: foliola et petioli pilosiusculi. Folio-
la ternata vel quinata digitata, obtusiuscula, utroque punctata.

Stipula ovata, membranacea herb. Tuss.

~~se~~ *Idem spec.*

24 pennata P foliis pennatis lineariibus, fleribus axillaribus Hort. Vesp.

102254

Genita affinis arbor africana monospermos, flore conleco, fo-
liis pennatis Herm. huydb. 272. & 273.

Habitat ad rivulos cap. b. p. i. 5

Rami striato-angulati superne villosi. Ramuli frequentes
parvi subtetragoni. Folio sparsa frequentia ramos undique
vegetia, pennata cum impari: foliolo circiter 7, mucronata
angustissima pubescentia pollicaria. Stipula lanicolata
attenuata patentis. Pedunculi axillares, versus apicem
ramulorum uniflori. Bractea duo subulata ad basin calycis
pedicelli. bractea sub infera tubulam connata. ^{lacina altera} lacina
calycis infera reliquis major

culta

26 enneaphylla P. foliis pennatis pinnis axillaribus. Len. mant. 450. * 1. V
p. 606x Saiqu

Habitat in India occidentali

Soleola novena obovata elliptica obtusa: punctis elevatis, par-
vis subtus majoribus. Filamenta omnia connata. Len.

Convergata P. foliis pennatis, stipulis solidis subacutis minutis fomis. Her. Suppl.
p. 339. + N. V. p. 687.

Habitat ad P. b. p. 5

Frustrum ramis coribus, striatis per parascentibus. Foliola lanceolata
de la via, septena, vix manifeste subtus punctata. Stipula
nullo, sed vix manifestum tuberculum acutiusculum utriusque
Coco stipula. Flores purpurei non striati. Len.

2^d *Ceporina P.* foliis pinnatis oblongo linearibus numerosissimis, spicis ebracteata
si villosi lanceolatis Hort. Kew. 3. p. 21. 4
4 habitat

Paulis glaber, fructus. *Q* folia sparsa, imparipinnata. Siliola numero
sa saepe 30 parium brevissime petiolata, obtusiuscula acumine brevi
glabra, subtus punctata, vix femunculis. Spica axillares solitane
cylindricae, vix binariae. pedunculi digitales, saepe foliis minutis pinnatis
si caespitibus. Calyx vellis longis hirsutus. Corolla corulea basi alba.
Filamenta in vaginam connata. Legumen tuberculato subrotundum
compressum membranaceum pellucidum pelosifidum non asper
mum Hort. Kew. l. c.

29 foliosa Pl. foliis pennatis oblongis numerosis, spicis terminalibus bractea
tis globosa ovatis, calycibus compressis Hort. kew. 3. p. 82. *

Habitat —

Paulis Teres, glaber, ramosus. Folca praesa impari pennata: foliola 10-
14 parium brevissime petiolata, acuta, glabra. Spica ramorum
multiflora, vix femunciales. Bractee sub fragulo flore ovata conica
vix, longitudine calycis. Calyx urceolatus villosus. Corolla pur-
purascens. filamenta connata superne fusca. Legumen subrotundum
oblique acuminatum, compressum, pubescens. Semen unicum Hort
kew. l. c.

30 Dalea P. foliis pennatis, spicis cylindricis terminalibus Lin. Spec:
pl. pag. 1076.

Dalea Hort. Cliff. 363. t. 22. *

Habitat in America: Vera cruce O

Caulis pedatis *Cerisyne* sulcatus rectus pilosus tenuis, glaber superne in
ramos floriferos divisi. Folia pollicaria, petiolata, foliola linearia
teretibuscula, pilis et certe raris pilosa, unguiculata supra sulco et
antra circiter quina, acuta. Stipula spatiosa spica pedunculata
sui ramulorum breviores vix pollicari. Flores copiosissimi imbricati
bractea linearis concava superne dilatata, apice in anastam et
acuminata, florem includenti. Corolla superne villosa-pilosa
calyx pubescens, bractea brevior. Corolla parva purpurascens

^{descript.}
plantam a F. W. Daleo qui eam vel varietatem foliis angustioribus
vidit vel specie diversa. forte folia spontanea angustiora
ideoque non diversam credo, cum in ceteris omnibus nomine eundem
sol. in h. P. bene convenit

emphyodes P

Pteralea emphyodes Gaerq. coll. 4. p. 144.

Habitat ad Caracas 5

Tota planta tuberculis glandulosis et flavo suffusantibus. ramis fus. folia
glabra pennata cum impari bipollicaria 7 puga. foliola ovata,
obtusius mucronata ad centem obsolete serrata petiolata quadrilinea
na. Pedunculi axillares et terminales solitarii, graciles bruniceo
flavescentes. Bractea lanceolata cono calyce duplo brevior.
Caulis purpurea. filamenta omnia basi connata Gaerq.

non vidi

Lagopus Pteralea foliis pinnatis & pinnulis numerosis oblongis glabris: aliis et
carina basi coalitis Cav. ic: 1. pag. 89. Tab. 16.
Habitat in Mexico O

non vidi

rectinata Psoralea caule procumbente: foliis pinnatis: floribus dense
spicatis decandris: radice longiore. Cav. ii: 1. pag. 60. Tab. 87.
Habitat in Mexico.

na di

verrucosa Pf. foliis ternatis: foliulis lanceolatis mucronatis integerrimis,
petiulis linearibus integris, pedunculis axillaribus unifloris Spreng. Cat
H. Hall. pag. 75.

Habitat in India orientali
an Pforalea axillari her.

Caulis, rami, petioli punctis callosis fuscis adpressi

Indica Pteris folis pinnatis, undenis. foliolis ellipticis acuminatis
stipulis acutis pinnis ciliatis, spicis axillaribus terminalibus pubes-
centibus pedunculatis Spreng. bot. 44. Hall. pag. 75.
Habitat in India orientali &
Solea utraque punctis callosis adpersa

Squarrosa Pteralea

Habitat in Cap. b. pui herb Royen. t

Truncus glaber, rigidus; dentato squarrosi a stipulis raris patentibus
brevibus: ramuli raris, frequentes, subpunctati. Folia petiolata, var. natu: foliula
obcordata, mucronata, mucrone patulo parvo, punctata. Flores hermaphroditi, cerni-
tes quinque, magnitudine et colore, ut videtur Pter. pinnata. Calycis glabri, lobes:
lacinis ovato, acuto

ononidis *Porulea*

Habitat in Cap. b. p. herb. Royeni 7

Caulis fruticofus. Rami ^{latentes} pinnatati, villosi, subinervi. Folia petiolata, ternata: folio
la unguiculata, ^{parum minor} fissis, lineari, cuneata, mucronata, mucrone patulo, utrinque pili
rarissimis adpressa. Stipula subpaleacea, nervosa, subulata, petiolo adnata, parva,
flores in summitate ramorum, axillares, terni, breviter pedunculati, appropi-
mati in spica foliacea. Calycis pilosi, subulati: laciniis longitudine corollae. Corol-
la parva.

Linifolia Sporlea

Habitat in Cap. b. p. herb. Roynii 5
Caulis fruticosus, erectus, vixatus. Rami teretes, glabri, striati, punctati. Folia
petiolata, ternata: foliola sessilia, terminale petiolatum, vix pollicaria, latera
lia parum breviora, linearia, mucronis transversis terminata, glabra, utrinque pun-
tata. Stipula ovata minuto. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, patentissimi
supra medium bractea duo ovata, parva. Calyx campanulatus, glaber, puncta-
tus: laciniis lanceolatis obtusis

genustifolia Poalea

Habitat in Cap. b. p. herb. Royeni. 7

Caulis fruticosus. Rami glabri, superne vix punctati, angulati, vix armato villosuli.
Folia brevissime petiolata: foliola ternata, sessilia, vix pollicina, lateralia parum
breviora, lanceolata, obtusiuscula, mucronata, basi acuta, glabra, utroque nigro
punctata. Stipula subulata, brevissima. Pedunculi ex apice ramorum, ore lenti
villosuli, tripollicares: pedicelli pauci, frequentes. Bractea minuta, ovata.
Calycis laciniis subulata, glabriuscula.

hamosa Pforalea

Habitat in Cap. b. ppi herb. Royani. 5

Trutax rugatus - Rami superne canescentes, impunctati. Folia vix petiolata, ternia,
unguiculata vel parum ultra, linearis-cuneata, mucronata, mucrone reflexo.
Stipulae breves subulatae, impunctatae. Pedunculi axillares, terni, uniflori, folio
brevioris. Calyx villosus, canescens: dentes subulati, longitudine corollae

habes confusus cum aculeata

Hedysaroides Ploarea foliolis lanceolatis glabris, racemis lateralibus terminatis
etibusque simplicibus.

Habitat in America boreali herb. Guss.

Rami Verticesque latis villis raris adspersi, Vener. Sola Vernata,
ut foliola petiolata. Foliola sesquipollidana, acuta, mucronata,
glabra, excepto costa et venis majoribus subtus, supra punctulatis.
Stipula subulata. Pedunculi axillares et terminalis multiflori. Brac-
tea ovata, acuminata, decidua, flore longioris, membranacea, fusco
glandulosa punctata. Flores parvi. Calycis cinerascens. Legumen
subrotundum, punctis elevatis scabrum.

axillari Psoralea

Habitat herb-la Mark.

Caulis erectus, 10 pedalis, punctatus, scaber, parum ramosus. Folia petiolata, ternata vel quinato-pinnata: foliola sesiplex, six pollicaria, asencia, pubes punctata, mucronata. Pedunculi axillares, solitarii vel gemini, uniflori, uniflori, pollicares, superne bracteati. Calycis laciniis ovato

Pteralea

Habitat in G. b. p. herb. la mark

Caulis glaberrime, superne pubescens, uti reliqua partes plantae punctati. Folia inferiora ternata, superiora simplicia, petiolata. Stipulae subulatae, flores in capitulo. bractea ovata. Vexillum punctatum.

pubulata *Psoralea folia Vernati*: foliis pubulatis glabris, pedunculis axillaribus
pluribus uni-floris

Habitat Geneta othonica pennatis foliis triphyllis *Pluch.* t. 298. fig. 1.

Habitat in Cap. b. p. c. herb. hes.

Rami tetragoni. Folia ex divisa supra bipulatum, angustissima, petiolata, omnia
policiana. Stipula bifida, striata: laciniis pubulatis. Pedunculi capillares
stipuli breviores; 3-7. superne bractea duo setacea. Flores parvi

bracteata floralea foliis pennatis linearibus glabris, capitulis terminalibus subglobosis
bracteis imbricatis ovatis

Kuhnifera Ventenat in act. sci. hist. Nat. panis Tom.

Habitat. herb. Guaf.

Caulis erectus, glaber, striatus, ramosus: rami simpliciter. Folia sparsa, 6-juga cum
in panis: foliola linearia, glabra, crassiuscula, punctis impressis. Capitula pedo
Duplo majora. Bractea ^{caetero} ovata, obtusa, fusca, calycem communem imbricatum
mententia: interior oblonga, intima linearis. Calyx hirsutus. Stamina
5na monadelphia. Stigma reflexum Capsula? 1-loculari, monosperma-
piperne angulati

Hypenidifolia Poiraler foliis pennatis: folioli oblongis, adami axillaribus, caule erecto
fructuoso.

Plum. 42: 42. fig. 2.

Habitat in Domingo Hab. La Revellera & Paris. 5

Rami alterni, teretes, glabri, distanter. Folia pennata cum impari 6-8 juya: ~~foli~~
Foliola opposita, petiolata, oblonga, basi acuta, glabra, uti rami utroque puncta
ta, subtus pallidiora. Stipula parva, subulata. Racemi laterales et terminales
pedunculati. Pedunculi post casum foliorum florum tuberculati. Calycis hispiti:
laciniis setaceis. Legumen longitudine calycis, monospermum, pelosum.

axillaris Pforalea.

Pforalea axillaris Hort. Kew.

Habitat herb. Guss.

Caulis teres, glaber, punctatus. Folia ternata, petiolata; foliola sessilia,
lineari-lanceolata, glabra, utrinque alata et punctata, subtus villi aliquid
diffusae, mucrone rigidiusculo terminata. Petioli universales ungui-
culares, radiales brevissimi. Stipulae abbreviatae, subulatae. Pedunculi
axillares, terni, uniflori, filiformes, medio superne bibracteati. Ca-
lycis lacini oblongae obtusae, lineatae, inter lineas puncta numerosae, spar-
sae, reflexae. Flores coerulei

subulata *Pterale folios Yernati linear-subulati, spici axillaribus, pedunculis etas*

Yernati

Habitat in Cap. b. spici. ex herb. Musci

9. Caulis teres, glaber, punctatus. Sola remotissima. Foliola pollicaria,
utrinque acuta, mucronata Yernata. Stipula subulata. Petali longiora

duo foliolis ^{longiora} ~~longiora~~. Pedunculi ex axillis supremis, folio duplo longiores.

Flores versus apicem, approximati. Bractea ovata, aristata, decidua,
longitudine calycis

prope Yernifoliam collocanda

4niflora? Pforalea

Habitat in Cap. b. spei Herb. mus. 3

Rami teretes, incani, villosi. Folia breviter petiolata, ternata, plura cum
floribus congesta: foliola pubescentia obovata, facie fere Pfor. aculeata,
mucronata unguiculata, glabra, punctata. Stipula bifida, e cujusdi
visum petiolus brevissimus, striato, arido villosa: laciniis lanceola
tis. Flores tres sessile.

Tomentosa *Phoraea* foliis ovato-lanceolatis, ramis petiolis, pedunculis calyci
busque tomentosi incanis, floribus spicatis
Habitat in Peruvia herb. Guss.

Rami angulati, valde tomentosi. Folia ternata, longe petiolata: folio
la petiolata bi-3 pollicaria, venosa, utrinque punctata, costa et venis
villis cinereis adspersa. Stipulae unguiculares, subulatae. Pedunculi
astellares solitarii, tri-4 pollicares. Flores in capitulo oblongo spica
ti. Bracteae lineari-lanceolatae villosae tomentosi, cinerei flore
longiores. Fides Palodino.

Citriodora Psoulea

Habitat

hab. ha Revalliere Le Poux

Caules herbarius, ramosus, glaber. Folia subsimplex, impari pennata, 11 pinnis, folio
ca oblongo, petiolata, ^{ve pubescentia} opposita, glabra, crassiuscula, obtusa, terminale cuneatum
emarginatum, glaucum viridia impunctata. Stipulae setaceae, patentes, decem
duo. Spica pedunculata, terminalis, oblonga, semipollicares. Calycis pinnis
villosi, pubescenti, glandulosi. Corolla purpurea. Ovaria conferta. Petala parva
et basi flava, glanduliformia.

Pteralea lutea Caron

Habitat

Herb. ha. riv. Le Pausse

Canescens. Stipulae supra glabrae. Flores flavi

mutans Pforalca

Habitat

Lesbi la Revell. le Paut

Rami filii formos, glabris, teretes, virgati. Folio pennata cum impari, 9 jugas, foliolo pedicelata, ^{unicam} oblonga, glabra, subter margine fere glandulosa, supra nuda, obtusa. Stipula setacea. Petioli pariales festi. Racemi terminalis sa monum. Flores distanter. Calyx nervosus, glandulosus: dentibus obtusis

melilotoides Pforalea

Trifolium pforaloides Waeth.

Habitat in Cardena herb. Ruth.

Caulis pedales, simpliciter. Pedunculi axillares et terminaliter. Flores coerulei.

Legumina transversim nigra

Lupinellus Florida

Habitat in Carolina Herb. Rich.

Caulis herbaceus, erectus, simplex, pedalis, ore lenticis villis raris adpressis. Folia petio-
lata, quinato-digitata, sesquipolluciana, ⁹lobata, angustissima, vix petiole latiora. Petio-
lus filiformis. Stipulae satae. Racemi axillares et terminales, sub cylin-
driformes. Pedunculus foliis longior

Pforlea

Habitat in Philippinis herb Thourini

Caulis herbaceus, ramosus, glaber. Stipula subulata, parva.

habes

carthagenensis *Pforalea* foliis quinato-pinnatis - subanceiformibus villosis, racemi
axillaribus

Barba poris lutea, foliis foraminulatis Plum. Cat. 19. fig. 42. fig. 2.

Pforalea carthagenensis

Habitat in America Herb. Fus. 5

Text. Rami teretes villosi. Folia peltata: foliola opposita, un-
guiculata, oblonga, basin versus sensim attenuata. Præami in

4 dentes ovato, ramulis, Flores copiosissimi. Calyces parvi, ^{quatuor, superiore hirsuti} subrotundi, pubescentes
anotati, hirsuti, lineæ novem calvata in singulis longitudinales, fenei punctorum inter lineas
inæquales, unicus pellucidum, coloris aurantii, # Germen triangulare, obovatum, com-
plectitur duplo lon- presum, minutum, 13 perium, superne puncta nonnulla pellucida.
gior, apice incur-
vus Stylus incurvus, villosus.

Pforales acuminat L. ment.
et planta e cap. b. spec. facit Cysip. foliis oblongis subtus pericis

von Mikellat
Mollera

canescens Pf.

Habitat Richard.

Caulis ramosus, fruticosus. Flores lutescentes.

Leinn. f. K. n. ~~Malva~~

angustifolia Indigofera
parviflora P. foliis pinnatis: foliolis subulatis, stipulis petalis minutis, racemis axillaribus
parviflora P. ^{acicularibus}
25 Habitat. 3 Schumacheri dedit

Caulis fruticosus ramosus, ramis teretes, glabri lineati, cortice purpureo piceo.
ramuli basi erecti stipulae simplicis. Tota in ramulis, sparsa unguis
cana, pinnata cum rariis 6 na: foliolo sessilia linearia subulata
subaequalia, mucronata, glabra interdum 13. Stipula minuto deciduo
patentissimo aciculis tuberculis infidentibus. Racemi axillares, pedicelli
res uniter novem flori. pedunculi filiformes e caepe floribus dentica
lati calycis lacinis subulato velillum villosam sine eum

Indigofera angustifolia

Est Indigofera tenuifolia est forte species Indigofera pinnata enim nulla in planta
vide

^{Dubio}
31 Pseudoporalea a La von Roth musa.

[Faint handwritten mark]

Pf. 2

Latoides & thepneum saxifraga pratensis folio multifloro in quaque
parte. Viridis Plyn. in. mar. 120 Amalth. app. tab. 425. fig. 2.
Habitat in cap. b. spec. herb. Royem 7

Caules lignosi, decumbentes, striato angulati, teneri glabri, ramosi, debiles. Rami
axillares, remoti. Folia petiolata, pennata: pennae 4. juxtae, oppositae, unguiculatae,
exteriores minores, oblongae, acutae, glabrae, utroque armato punctata. Stipulae ovatae
acutae. Peduncululi axillares, elongati. Flores umbellati, 6. 7. nutantes, villosi
viscosi. Calyx punctis canis glutinosi oviculis adpressi. Corolla glabra rubra
Legumina hispida.
an hujus generis

parviflora ~~Chama~~

3^r prostrata P. foliis supraecompositis digitatis linearibus Lin. Am. acad. 6. p.
93. n. 364 S.V

Habitat in P. b. p. p.
a reliquis habitu recedit. Caules decumbentes filiformes. Stipulae
erectae. folia digitata intermedia trifida partibus pen-
natis, foliis linearibus. Pedunculi axillares, racemoso-fibro-
sando. Flores lutei Lin