

Ptelea

1. In foliata P. foliis ternatis
2. pennata P. foliis abrupte pennatis

monophylla Ptelea

Habitat herb. la Martini

Ramiteretes, glabri, ramosi. Folia petiolata, lanceolata. Racemi terminales

ovata Pteleo foliis ovatis simplicibus, racemis prostratis Lour. fl. Cochinch.
pag. 82.

Habitat in Cochinchina

arborescens 4 pedalis. Folia integerrima utraque obtusa, altera
na integerrima, glabra, parva. Flores parvi albi. Racemi breves.

Cal. 4 partibus. Petala corata.

genus incertum cum nec perillum nec fructum in flore
invenit auctor

non vid.

monosperma Petalium foliis simplicibus lanceolatis ovatis suboppositis
fructibus trilocatis La Mart. P. E. pag 336
Habitat in Carolina
Racemi terminales

non vid.

triphylla F. foliis oppositis ternatis: foliulis ovatis-lanceolatis integerrimis
paniculis brevibus. La Mart. T. E. pag. 334

Habitat in Philippinis

an Fagara Ludovici Forst. prodr? an Euodia hookeri?

1. trifoliata *Ptelea folus ternatis* Lb. V. pag 160. Trax var. 12. Sobg

Tridax virginianus trifolius, ulmi samaris Pluk. alm. 159. Dill. Ekt. 147. Tab. 122. f. 148.

Ptelea Hort. Cliff. 36.

Ptelea similis Zan. Gött. 207. *

Habitat in Virginia

Tridax ~~ternatis~~ ^{altera} ramis glabris subangulatis. ^{at} folia petiolata, ternata. foliola elliptica, utrinque
attenuata-acuta, glabra transverse ^{in venis} nervosa, ^{6. 3. 3. 3.} glabra serrata, versus basin integerrima, latera
lia minore, altero latere angustiora. Petiolus bas. papposifera. ~~Corym-~~
^{capo} racemosi terminalis pedunculi pubescentes simpliciter vel divisi

~pinnata *Ptelea foliis abrupte pinnatis* L. Suppl. p. 126. P. V. pag. 160

Blati burma pinnata Forst. gen. 6. Forst. prodr. n. 53.

Habitat in Norfolkis Insula de Jeda.

Habitus a *Ptelea* non dissimilis forte genus distinctum, fructus vero ignotus.

Folia alterna, pinnata, sine impari b. f. trijuga: folioli oppositi obliqui, ovatis
integerrimis glaberrimis. Panicula axillares, parva. P. sup. l. c.

non vidi