

Pterocarpus

1. Draco P. foliis pennatis: foliolis obtusis
2. Lunatus P. foliis pennatis, ^{foliolis acuminatis} pinnis stipularibus fructibus lunatis
3. Kobri P. foliis pinnatis, stipulis nullis, fructibus subrotundis
4. bilobus P. foliis pennatis: foliolis oblongis apice bilobis
5. Santalinus P. foliis ternatis subrotundis retusis glaberrimis, petalis crenatis
undulatis
6. caespitellum P. foliis simplicibus ovatis acuminatis subtus sericeis

Castaphyllum Ptenocarpus foliis simplicibus ovatis acuminatis subtus sericeis Len-S.
V. pag. 642. Sw. obs. 3. pag. 875.

In montemat legit de Ryan

Rami glauci, inferne teretes superne compresso angulati villosi

Folia acumine obtuso, supra glabra, subtus villis brevibus adpresso villis adpresso

Petiolus unguicularis.

Racemi solitarii vel gemini, petiolo dimidio longiores.

aurum. Apitlenium

Draco

Suberosus Pterocarpus foliis pennatis: folioli ovatis oblongis acuminati nitidi
Moutouchei suberosa Qu. fl. Qu. p. 74 d. Tab. 299.

Habitat Surinami ad von Rohr

Rami teretes glabri, inferne cinerascetes, superne fusci.

Folia petiolata, alterna, pithamoa. ^{Soleola petio 4-7 d. petiolata, alterna,}
^{aequi pollicem usque feritate excepto apice}
Impolliciana, intermedia minor, oblonga, basi rotundata, acuminata,
acumine unguiculari, obtuso, mucronato; utriusque glabra, venosa
nitida.

Petiolus universalis, teretiusculus: partiales semiunguiculari.

Racemi axillares, plerumque solitarii, rarius terni, compositi. Pedunculi teretes, fusci, folio parum brevioris: partiales alterni, remoti, patentes.

Flores frequentes, sparsi, glabri.

(Pterocarpus draco differre videtur quantum a figura Saeguni conjecturari
licet. folioli basi non ovatis nec apice acuminati)

Pterocarpus incornis, foliis pennatis, fructibus subrotundis.
Habitat.

Rami teretes glabri, circumsati.

Folia petiolata, ^{trithamoa} ~~per~~ alterna, pennata cum impari pari. Siliola petiolata
alterna distantia, 6. 8. sesquipollicaria, sensim majora. magisque oblonga
acuminata, subconacia venos ^{utrinque glabra} reticulata, nitida, plana ~~glaberrima~~
^{integerrima}

Rachis ^{de petiolo} basi planis, ~~retinens~~ ^{sub} siliis canaliculatus, flexuosus
petioluli rachi articulati semiunguiculares. Stipulae deciduae

Racemi axillares foliis dimidio brevioribus simplicibus siliis; pedicelli sparsi
semitinguiculares siliiformes sub flore crassiores medio bracteis tenuis
setaceis oppositis

Calyx campanulatus villosus tomentosus ore obliquo quinque dentato
dentibus ovatis obtusiusculis ^{nanis} ~~superne~~ profundius fissis.

^{Sexallum} Corolla calycis duplo longior ^{retata o} ~~Sexallum~~ subtaludum obovatum emarginatum
natum ala longitudine vestilli. ^{in stylo} ~~Canina~~ basi bifida longitudine
alarum venis purpurascens uti ala et vexillum

Stamina 10 monadelphia decemfida.

Pistillum gemin basi dilatatum vellosum uti stylus

Legumen suborbiculatum glabrum basi emarginatum, latere interiore
stylo terminatum disco venoso reticulatum, membranaceum non
dehiscens parum ultra pollicem ^{longa} longa et latum.

In Roho qui plantam misit revar leg vidit et sub nomine apo-
caloo ^{deublotii} ~~revar~~ examinavit asperavit, eam falsissime ab Aublet
et descriptam et delineatam esse, nec quod folia di et
fructu differt, flores vero diversissimi

ovalifolius Pleurocarpus foliis ovalibus, leguminibus racemosis dimidiatis
fundatis sensis.

Habitat in Domingo herb. Jusf.

Rami teretes, glabri. Folia quadrifida absque impari; foliola, colluaria
interna membra, supra nitida, subtus villosa, subsessile. Racemi axillares
multiflori. Petioli villosi. Legumina pedicellata, unguiculata, altera la-
tere fere recta, altera convexa, membranacea, membrana latere angustio-
re ultra prominente.

Senecio Pleurocarpus foliolis oblongis subtus serratis, leguminibus medio setae longi

dis

Habitat in Senegal herb. Guss. 5

Foliola petiolata, alterna, 2-3 dist. supra glaberrima, subtus serrata, obtuse mucronata, bipollicaria et ultra - Legumina pubescentia, margine membranaceo, magnitudine thalarii. Flores racemosi

echinatus Pterocarpus folioli ovatis glabri, Leguminibus glabris medio fetacis-ke
fridis

Habitat in India Herb. Mus.

glaber. Sola quadrifida: foliola opposita 1-2 pollicaria, interiora minorum
membrana leguminis hirta.

populneus Pterocarpus

Kalawil Wallourou Herm. zeyl. 8. 21.

Draco arbor indica filigiosa, populi folio, angfara vel angfara javanica Commel.
Hort. 1. p. 213. tab. 107.

Pterocarpus her. fl. Zeyl. pag. 196. no 417.

Habitat in Zeylona her. Herm. in Biblioth. Lugd. 5

glabra. Folia petiolata, alterna, pennata cum impari, tripeza. Foliola petiolata, opposita, pollicaria, ovata, obtusa, integerrima, ut venosa, glabra. Racemi ex aliis supremis et apicis, erecti, pedales, compositi. Peduncululi pariter alterni. Ciliis et floribus, tomentosi, uti calycis. Calyx uncolatus, dentibus quinque obtusis obsoletis. Corolla glabra. Stamina 10 connata. Canna 2 petala.

Folia 3nata vel pennata. Legumen facie Siliqua lunaria in medio semine unicum magnum Linné l. c.

Dubius

Pterocarpus

~~radice~~ racemis axillaribus pedicellis uni floris calycibus villosis
foliis ^{glabris} pinnatis cum pari foliolo unico terminali

Habitat in India occidentali 5

an hujus generis

Rami glabri perparviflori. Folia petiolata alterna
foliola alterna ovata acuminate et breviter majora mem-
branacea venosa interiora minor exteriora 3 pollicia
na Racemi longitudine petioli floris nutante bracteae
duo setaceae sub calyce Calyx campanulatus sive dentatus
corolla alba. Stamina in duo corpora filamenta sive
in singulis

an sit Draco

apalatoa *Pteris arpus folioli oblongi abrupte pinnatis acuminatis*
legumina undique subaequali basi emarginata glabra exstipitata

Det. f. h. n. P. 1. p. 111

apalatoa Aubl.

Habitata Am. merid.

Pteris arpus Kuhnii

Acaena Hemicarpus

Habitat herb. Fusf.

Similis Pt. cicutaphyllo. Folia subcordato-ovata, utrinque glabra, panum ul-
tra pollicem longa. Racemi compressi, legumen semipollicare.

1, Draco Pterocarpus foliis pinnatis ^{folioli obtusi} Lin. S. V. pag. 64. Jacq. Amer. p. 90. ^{kat} V. 264. ¹⁸³
fig. 41. 92.

Draco arbor india pliquos, populi foliis Commel. kat 1. pag. 213. V. 109.
Lingoum Rumph. Amb. 2. p. 205. t. 70.

+ Draco arbor Coeff. 4. 266. 273. N. 147. 160.

Habitat in India

Orientali forte diversa ab occidentali confer Plum Ic. 246. fig. 1. 2.

Arbor. Inguita pedalis. Folia alterna. Folia pinnata cum impari
s, ^{foliola} trijuga, lanceolata oblonga obtusa, penosa, late viridia, intermedia
bipollicares, et tenues sesquipollicares, altera ^{no} Jacq. flores rari in
stipulis orati.

Montouchi suberosa Aubl. fl. Guian. p. 740. V. 299

Folia pinnata cum pari trijuga. foliola alterna unicum terminale
orato, acuminato, acumine emarginato tenuissime venosa herb. fus
est amara

unendi

an India vera eadem? confer Rumph. Char. haid sufficari

3 Rohri Pterocarpus foliis ^{Pterocarpus} pinnatis, ^{se} puleis nullis, foliolis ciliatis
Misit Dr. von Rohr qui plantam in America meridionali legit.
arbor. Ramis glabris, terribus, cortice fusco cinereo.

Folia petiolata, alterna, pennata cum impari foliolo cum pari,
foliolo 3-4 puga. Foliola petiolata, bipartita sesqui pollicaria,
exteriorum semper majora, alterna, ovato-oblonga, acuminata,
integerrima, glabra, nitida, utraque venis minutis
numerosisque, pulchre reticulata.

Petioles universales saepe pithamoi, flexuosi, vix tenuissime tomentosi,
supra glo sulco exarati, subtus leviter striati; partiales
bilineari, ad insertionem folii subtus rugosi.
Stipulae nulla.

Racemi axillares, folio duplo breviores, multiflori. Pedicelli
parvi, filiformes, uniflori, medio bracteis binis, setaceis
Floris nutantes

Calyx campanulatus, vix tomentosus, lavis, quinque denta-
tus: dentibus duobus superioribus oblongis, obtusis, in-
ferioribus 3bus ovatis, acutiusculis.

gompshia
nitida. *Ochna* foliis ovato-lanceolatis acuminatis serratis, paniculis termina-
libus calycibus corolla aequalibus
Ochna nitida; calycibus corolla aequalibus, dupli. receptaculo
superimpositis, foliis ellipticis serratis Schw. prod. p. 67

Habitat in Danent Banks

Rami ^{algem} superne flexuosi cortice fusco, teretes glabri, uti omnia.

bas folia brevissime petiolata, alterna, bis: tri pollicaria, pollicari-
binoi latera, coriacea vix vesosa coriacea, serraturis mucrona-
tas, basi integerrima.

Panicula terminalis, ^{patens} striata, palmatis vel utraque pedunculis
pedicellisque gl. alternis, pedunculi post capem foliosum
e pedicellis persistens; squarrosi

^{seors ante evolutis, ovatis attenuatis obtusis}
Calycis foliola longitudine petalorum, lanceolata

Petalis flava.

Silamenta vel tubercula decem parva. Antheris longitudine
corollae subulata.

germen pentagonum. Stylus longitudine antherarum
ma acutum

N^o # Corolla papilionacea. Vexillum subrotundum, emarginatum. Ala
oblonga. Carina bipetala.
Stamina. filamenta decem in unum connata, superne libera. Anthera
unica in singulo filamento, oblonga.
Germe oblongum. Stylus longitudine staminum. Stigma acutum
Legumen compressum, membranaceum, subrotundum, sesquiped
licae, glabrum, medio venosum. Seemen unicum.

Asperit Dr. Ron Rohr, qui plantam in solo natali obser
avit, non diversam esse ab Apalatoa pucata Aubl.
fl. Guian. pag. 302. tab. 147. Convenit diam in omnibus
cum figura et descriptione Aubletii, ^{et staminibus} f. floribus ^{et capsulis}
quo secundum tam false depicto quam descripto ^{sunt} ex obser
vatione vini laudati. Genus igitur Apalatoa Synonymum
vixit nostrae plantae erit Apalatoa pucata Aubletii, quod
Pterocarpa generis esse jam suspicavit Dr. Sussow vide
Ejundem Genera Plantarum pag. 365

2 Lunatus P foliis pennatis, spinis stipularibus fructibus lunatis her
Suppl. p. 317. + L. V. p. 641.

Medicago leguminibus lunatis Plum. u: 4201. fig. 2.

Habitat in America meridionali &

Rami teretes glabri supra pur purascentia. Folia pennata cum
impari quadrygia. foliola petiolata, alterna, inferiora striis
transversis subtilissimis copiosis, glabra, inferiora oblonga sup
superiora majora bipollicaria lanceolata basi vespere
angustata utraque obtusa. Spino gemino ad singulum petio
lum parum recurvi. Panicula terminalis ex pedunculis
subpinnatis, secundis, hinc a capite florum altero latere den
tatis. Spica deflecta incurva. Legumen compressum, seni
forme ~~per~~ diametris sesquipolliciare, glabrum, evolue

est Pterocarpus apterus Gortn. De seminat. V. 156

genus distinctum, nephosis Richardis. Hec hujus generis species vidi
apud rivum Candakum. Ebenus hinc peduncul. Fructus reniformis

4 bilobus ~~Pteris~~ foliis pennatis oblongis apice bilobis

Habitat in Zeylona } König

Rami teretes cortice cinereo-rugoso; glabri. Folia pennata cum
impari bipinna: foliola petiolata bipollicaria, venosissima
lata oblique nervosa basi acuta apice ⁱⁿ lobis geminis divi-
sa. ^{utroque glabra} ~~lobis~~ ^{subtus} ~~lobis~~ ^{panum} ~~lobis~~ ^{validum}
lobis rotundatis. Petioli interdum simul tres ex eodem
loco basi ~~et~~ inflexione articulati. Rami teretes et
axillares post caput florum cicatriciati. Flores alterni.
Calyx 5-dentatus. Germin vellosum fricuum.

a Lin. cum Santalino confunditur

Ecastraphyllum P foliis simplicibus ovatis acuminatis subtus pinnatis -

Ecastraphyllum *Andrieuxi* reclinatorum Brown. Jan. 299. V. 32. fig. 1.
Spartium scandens; c. tri foliis, floribus albis ad nodos con-
sertim nascentibus Plum. spec. 19. ii. 246. fig. 2.

Habitat in America

5 Santalener *P. foliis ternatis subrotundis, retusis glaberrimis, petalis crenatis undulatis* Lin. *Suppl. p. 318. S. V. pag. 642. Sw. obs. pag. 275*
Habitat in montibus palciatensibus Andis
Arbor altissima: cortice albi; ramis alternis. Folia alterna, foliola petiolata, ovato-obovata, fittus cana. Racemi axillares simpliciter erecti. Bractea nulla. Legumen subtundum pedicellatum, compressum, glabrum, margine inferiori cannatum: canna membracea, subundulata. Lin.

6 *Crastaphyllum* P. foliis simplicibus ovatis acuminatis ^{subtus ferris} ~~subtus subferris~~
Lin. S. V. pag. 642 Jacq. herb.
spatium scandens citrifolius, floribus albis ad nodos confertim
nascentibus Plum. Spec. 19. ii. 246. fig. 2.
Crastaphyllum frutescens reclenatum Brown. Jam. 299. v. 32.
fig. 1.

Berg in Act. Holm. 1769. p. 116. t. 4.

Hedyosarum crastaphyllum foliis simplicibus ovatis subtus
ferris petiolis muticis Lin. Am. acad. 5. p. 403. Spec. pl.
p. 1051.

Habitat in America meridionali

Rami inferne Vertes superne uti ramuli ~~et~~ angulat. cinera
scentes. folia petiolata bis. tripolliciana obscure veno
sa subtus pallidiora et pilis minutis adpressis. Petioli canis
Præcuncti ^{vide repetentia in codicibus} ~~longitudine~~ ^{longitudine} petioli unguicula
ris. Cyumen glabrum
salsa similes et Juncos vidi in herb. Jusf.

propinqua generi *Sec.* Rich. Filamenta diadelphica, singulaeque. Species
5que vidi apud Richon, etiam alia ex Africa, nonnulla monophyllea
alio folio simpliciterve pennatisque confer cum *ammannia*

hemipteris Pt capfula hinc-pitura tumida notata, inde in
alam membranaceam extenuata gortae. de frum. tab
156-fig 2.

mibi cognatus

bracteifolius foliis simplicibus et

puberulus

Pl. foliis pinnatis ovato-oblongis & acuminatis, pedunculatis glabris, leguminibus puberulis rugosis
Merrillia puberula fl. gr. t. 294
Habitat in India orientali

inter americana quorundam

antennae P. ~~Cassida~~ subcochleara ruda Gorta-de-fruct. 8-156
fig. 2
an hyspida genens

miti cyndus

Scandens. Pt folus pennati foliolis ovatis, caule volubi-
li.

Habitat in India orientali.

Rami teretes glabri. Folia alterna. Foliole
4-5. petiolat pollicaria obtusiuscula cum
mucronulo obscure venosa utraque glabri rari
elongati multiflori. Calyx truncatus. Legumi-
na suborbiculata se rose glabra

Acacia benghalensis bordier. folio, pliquis dorso nervosis Mus.
Petw. 601. heb Mus.