

Pteronia

1. *campithorata* P. foliis sparsis fasciculatisque filiformibus, basi ciliatis, calycibus
seriatis
2. *apicalis* hoides P. foliis sparsis fasciculatisque filiformibus basi ciliatis dentacula
tis, calycibus integris
3. *fabra* P. foliis fasciculatis filiformibus ciliatis denticulatis, calycibus inte
gris ramis pulverulentis
4. *flecti* caulis P. foliis filiformibus oppositis glabris, basi in vaginam connatis, caly
cibus subdiagonis terminalibus
5. *minuta* P. foliis oppositis vaginantibus filiformibus, floribus lateralibus sub
sessilibus solitariis ovatis
6. *pallens* P. foliis filiformibus oppositis sessilibus glabris, calycibus terminalibus
versutibus, squamis ovatis
7. *cicatricata* P. foliis linearibus carnosissimis glabris, calycibus terminalibus ob
longis squamisque oblongis
8. *vellosa* P. foliis linearibus obtusis hirsutis, calycibus ovatis squamis subrotundis
marginem membranaceis

7. succulenta P. foliis oblongis triquetris crenulatis glabris, calycibus ovatis, squamis subrotun-
 10. glomerata P. foliis ovatis triquetris imbricatis integerrimis glabris, ramis tetragonis, caly-
 cibus subciliatis
 11. penicilli formis P. foliis ovatis triquetris pulverulentis tomentosis
 12. membranacea P. foliis ovatis pulverulentis tomentosis, calycinis squamis subulatis
 13. cephalotes P. foliis linearibus oppositis conduplicatis margine carinaque cili-
 14. retorta P. foliis ovatis reflexis glabris margine ciliatis pubris, caule erecto,
 squamis calycinis integris
 15. inflexa P. foliis ovatis pilosis, calycinis squamis subarticulatis membranaceis, pe-
 dunculo inflexo.
 16. oppositifolia P. foliis oppositis, ramis dichotomis divaricatis
 17. rigida P. foliis linearibus obtusis tomentosis, squamis calycinis linearibus solo-
 18. cinerea P. foliis lanceolato-oblongis tomentosis, squamis calycinis exterioribus ovatis
 acuminatis, margine membranaceis
 19. spinosa P. ramis spiniferentibus, foliis ovalibus, calycibus spinosis lacini-
 20. spinosa P. foliis subulatis spiniferentibus pungentibus
 21. hispida P. foliis lanceolatis patentibus pilosis, caule procumbente, squamis calycinis
 integris

22. glabrata P. foliis lanceolatis glabris, squamis calycinis ovatis membranaceis
23. fasciculata P. floribus foliis lanceolatis basi auriculatis, floribus fasciculatis
in fasciculis
24. ciliata P. foliis linear-lanceolatis ciliato-ferrulatis, calycibus oblongis terminalibus

1. *Camphorata* *Asteronia* foliis fasciculatis solitariis que sparsis filiformibus, squamis calycis
subterratis

Pter. *Camphorata* foliis sparsis basi ciliatis Lin. Am. Acad. b. p. 9748 Mant. 464. x
L. V. p. 737

Conyza aromatica frutescens mauritanica, *Camphorata* foliis ad marginem pilosis,
flora magno aurea ex flosculis fissularibus composito Pluk. mant. 56. t. 345.
fig. 56. plant. 2.

Pterophorus camphorata foliis ad marginem pilosis. Vaill. art. 375

Habitat in C. bono sp. et r. llopsi

Varia ramis folisque subtomentosis folisque basi pubescentibus vel glabris. Folia
Rami infernae ^{cap.} in ramis majoribus fasciculata pluribus in junioribus sparsa, solitaria
foliorum ^{cap.} mucronata unguicularia vel pollicaria. Pedunculi terminales vel in superiore parte
ramorum solitarii, foliosi, uni flori. Folia Calyx Rami fruticosus. Calycis
squama subulata, cava glabrae longitudine radii Pappus longitudine calycis
Receptaculum foris setis multipartitis

fo-spiculatusque
camphorata Pteronia foliis parvis basi ciliatis calycibus serratis

Coryza aromatica frutescens mauritania, camphorata foliis admarginatis pilosis, flore magno aureo ex flosculis fistularibus composito Pluk. alm. mant. 56. t. 345. f. 56. 2.

Pterophorus camphorata foliis admarginatis pilosis Vaillant. art. 375.

Pteronia foliis parvis basi ciliatis L. S. V. pag. 937. Am. acad. 6. pag. 97.
n. 4. D. mant. 464 *

Habitat in Cap. b. p. 17

Pt. camphorata foliis parvis fo-spiculatusque si lufor mibus ciliatis, folioli calycinis serratis, receptaculi pilis fo-spiculatis
Hort. Kew. 3. p. 162.

2 Labra Pteronia foliis fasciculatis teratibus filiformibus ciliato denticulatis, ramis
pyrenolepis
Labris.

Habitat in Cap-bono per ty ^{romotica.}

Similis camphorata. Ad folia breviora margine et carina spinulis minutis semi
albis ciliatis ciliato denticulata. Flores minus duplo minores.

Rami pauci flexuosi pallide purpurascens pedunculi squarosi per ramis
uni flori adpressi folioli aliquot. Foliola calycina integerrima, ^{puberula} apice
exteriora apice reflexa.

an eadem cum Aneta

imbricata Stohelina

4 minuta *Pteronia* foliis oppositis vaginantibus ^{filiformibus} ~~linearibus~~, floribus lateralibus subsessilibus
solitariis ~~foliis~~

Her: minuta foliis linearibus vagis, floribus axillaribus Lin. Suppl. 357.

* S.V. p. 730.

Habitat in Cap. b. specij

Tridet ramis ^{statim} albis superne dichotomis. Folia teretia unguiculata basi
coalita in vaginam. Flores ovati pauci supra folia, magnitudine
sibi pedunculo vix ullo ^{unicum vel plures} folium utrinque ad basin. Squama calycina
ovato obtusa apice vix ses.

5 pallens. Pteronia foliis filiformibus oppositis sessilibus glabris calycibus teretibus
ovatis

Pter. pallens foliis filiformibus glabris, calycibus teretibus ovatis,
caule ramisque incurvis teretibus Lin. Suppl. p. 357.

Habitat in Cap. b. p. 4

Caulis Rami oppositi, albi, arborescens similis Galenia subtetragoni superne
sulcatis quatuor exaratis. Folia teretia pollicaria. Flores terminalis
interdum pedunculati ^{longe} breviter pedunculatus solitarius. Squama calycina oblonga ovata

+ interdum pedunculati
3. intermedio
trifloro

car omnes carinatis, subtimpala interiores subclivata

7 villosa Pteronia foliis ^{linearibus} lanceolatis ^{hirs} obtusis pilosis, calycibus squamis ^{subrotundis margine} ~~ovatis~~ membranaceis
Lin. Suppl. pag. 356.

Habitat in Cap. b. Maurit.

Pteronia foliis lanceolatis obtusis pilosis, calycibus squamis ovatis membranaceis Lin. Suppl. pag. 356. Sib. p. 730

Rami villosi, verdeti ^{tuberculati} superne hirti. Folia albescens, (officinalata?) linearia obtusa
pilosa hirta. Calyx ovatus. Squamis subrotundis villosis margine membranaceis. Disci plitani terminales pappi.

^{succulentor}
o ^{carnea} *Peronia* foliis oblongo triquetris crenulatis ^{glabris} calycibus ovatis squamis subrotundis

Habitat in cap. b. p. e. t.

Stemis vltis glaber caule tereti, ramis tercenonibus alternatim angustibus
adieu latis, superne dilatatis. Folia conferta patentia carnea supra
carina subtus carinata margine et carina subtilissime crenata, pater
tia. Flores terminali brevis pedunculatus ovatus: Squamis subrotun
do glabris flavescentibus superne viridifusca

9 glomerata Heronice foliis ovato triquetris ^{integerrimis, glabris} imbricatis, Ramis tetragonis, Calycibus subrotundatis.

Pter. glomerata foliis ovato triquetris glabris; caule tetragono Lin. Suppl.
356. V. p. 738

Habitat in C. b. / p. 7

Stem humilis ramis diffusis, tetragonis alternis, ^{ramulis oppositis brevibus} junioribus inferne squamis imbricatis. Folia sessilia opposita, coriacea, minuta, Flores terminaliter solitarii, sessilibus oblongis Calyx ante florescentiam oblongus utriusque acutus, glaber: Squamis oblongis flavescentibus.

10 penicilliformis *Pteronia foliis ovatis triquetris pulverulento tomentosis*

Habitat in cap. C. Speitz

Rami tetragoni glabri, tenella adnuculato imbricata pulverulenti folia
minuta supra plana subtus cinnata. Calyx cylindricus: squamae
ovato-acutae ciliolae dorsae farnosae, flavescentes omnes absque
margine farnosae

membranacea Pteronia foliis ovatis pulverulento-tomentosis; calycinis squamis subulatis
" margine scariosis Lin. Suppl. 357.

Habitat in C. b. frei.

Stem ramis bifloris oppositis ^{obtus} tetragonis cortice fusco, junioribus pulverulento
tomentosi. Folia crassifolia ovata, ^{municati} opposita, acuta, umbellata. Flores
terminalis sessiles; squama calycina ovata lanceolata.

12 *Cephalotes Pteronia* foliis linearibus oppositis conduplicatis margine carinaque ciliato serratis
Pter. *Cephalotes* foliis subulatis conduplicatis carinatis serratis, calycibus oblon-
gis terminalibus minutissime lacinis Lin. Suppl. p. 350* S. V. pag. 230.
Habitat in Cap. bono spec. 5

Truxea ramifera: Ramis oppositis, albis imbricatis & squamis & foliis deciduis.
Folia linearia, superne imbricata, fere glabra cuspis vix semiangulicariis, apice
peltata, supra canaliculata subtus cinnata, margine et carina ciliis albidis
minutis serratis. Flosterminalis solitaria ^{magis} obovata. Pedunculis
brevis squamis brevis. Lobula calycina ovata sicca apice fere
superne margine sublaevia. Pappus griseus.

17 redorta *Pteronia foliis ovatis reflexis glabris margine ciliatis scabris; caule erecto, squamis
calycinis integris* Lin. suppl. p. 356
Habitat in Cap. b. spei

non vidi

14. inflexa *Pteronia* foliis ovatis pilosis, calycinis squamis subarticulatis membranaceis,
pedunculo inflexo in Suppl. pag. 356
Habitat in Cap. b. spec.

1415 *Trigonotis* *Pteronia* foliis oppositis linearibus *Trigonotis*, calycibus ovatis.

Habitat in Cap. b. p. herb. Royni

Tris ex ramosis: Rami oppositi, tortuosi, glabri, teretes. Folia opposita, adnata, patentia, carnoso-trigonota, carnosia, supra planiuscula, margine tuberculata (saltem exsiccatione) semiunguiculata, glabra. Pedunculus terminalis, uni flori brevis. Flor. peso duplo major. Calyx squamis ovatis, obtusissimis, glabris, coloratis.

15 opposita folia Pteronia foliis oppositis, ramis dichotomis divaricatis. Lin. S. V. p. 837. *

Cyanus centauroides frutescens, lavandula folio Breyn. prodr. 3. p. 20. t. 17.

fig. 3. Cent. fascic. pag. 21.

Habitat in Cap. bono spei.

Eadem ac rigida dicitur.

16 rigida. Pteronia foliis linearibus tomentosis obtusis, squamis calycinis linearibus coloratis
Pteronia rigida foliis oppositis linearibus cuneiformibus tomentosis, floribus solitariis
Lespedeza Berg. Cap. p. 231. *

Habitat in Cap. b. spect.

oppositis ^{superior} Pteronia dichotoma

Indet ramus tetragonis destituti rigidi Tenellii a capite foliorum mucronati articulati
Folia ^{sub} parum angustiora, semiterminalia in ana. Flores terminalis sessilis
solitarii. Calyx subtuberculatus squamis linearibus, obtusis, subcarnatis flando
flavescenti fuscis vel late viridibus marginibus venis albo

forte eadem ac opposita folia ten.

17 *Cinerea Pteronia* ^{capicollis} foliis oblongis tomentosis, calycinis squamis exterioribus ovatis acuminatis
marginibus membranaceis

Pter. cinerea foliis oblongis tomentosis, calycinis squamis ovatis membranaceis
den. Suppl. pag. 356. P.V. pag.

Habitat in C. bonapartei.

Inde ex ramis oppositis tetragonis cortice fusco. Juniores tomentosi mucronati. Folia
opposita conferta et acuta, cineres tomentosa sive vix semi-unguiculata,
Flores terminalis solitarii squama interioribus lanceolata flavescentes
omnes margine membranaceo hyalino. Pappus subhirsutus

18 Scariofa *Aerona* ramis spinescentibus, foliis ovalibus, calycibus scariosis lacinis.
Pter. Scariofa ramis spinosis, calycibus scariosis, foliis ovalibus Lin suppl.
p. 356* S. V. 730.

Habitat in C. b. sp. 7

Fructus niger, ramifus: Rami alterni ^{glabri} remoti e caespitibus & caespitibus remotis
tuberculati, steriles in spinas definentes. Folia sessilia, alterna
vel subopposita, crassa ovalia, glabra vix unguiculata. St. termina
lis obovatus. ^{foliis tenuis} Equano calycine ovato cincto margine lato, scarioso hyali
no lacino. St. luteo.

19 *Spinosa Pteronia foliis subulatis spine pentipis pungentibus* Lin. Suppl. p. 357. t. 5. V.
p. 730.

Habitat in Capite b. spici

Caulis ramosus teres glaber uti tota planta striatus. Stems albidis tomentosis
Folia alterna, remota sesquipollicaria, rigida, persistens supra plana
subtus convexa, striata mox ramorum, patensima. Flores ex axillis
proemii solitarii vel plures, 4. Calyx cylindricus, squamis oratis cuppa
microtratis margine scaroso flavo nitente

20 hirsuta *Pteronia* foliis lanceolatis patentibus pilosis, caule procumbente, squamis caly-
cini integris Lin. Suppl. 356.
Habitat in Cap. b. p. 5

non ad:

21. glabrata *Pteronia foliis lanceolatis glabri, calycini squamis ovatis membranaceis*
cap. supple. p. 3, 56
Habitat in Cap. b. spec.

no. 21.

Lasiaculata *Phronia* ^{floribus} ~~concalycibus~~ fasciculatis uniflorulis. Lin. Suppl. p. 357. *

L.V. p. 730

Habitat in capite b. Speitz.

^{umbriato-}
^{lyramof;}

Frut. ex dichotome ramosis, farni e capu foliorum ~~lyramof~~ ~~lyramof~~

~~umbriati~~ ^{oblongata opposita} folia congesta in umbertia, rigida glabra, arenia
basi utrinque annulo minuto. Cori terminali ^{lobis} pappi in capitulo

magnitudine ^{sepe} calycis cylindrici umbriati flavescentis. Pappus unicus
sepe avellano in singulo calyce fermen conicum ~~trilobum~~ Pappus longitudine
calycis ~~albus~~ dentatus. Receptaculum nudum

Corymbosä Stachelina

^{Ciliato}
27 ~~Cephalotes~~ *Neronia* foliis linearibus lanceolatis ciliatis serrulatis calycibus oblongis ter-
minalebus

N. cephalotes foliis serrulatis cordatis carinatis serrulatis, calycibus
oblongis terminalebus minutis fere lanceolatis. *Suppl. 350* ~~et~~ *S.V.P. 138*

Habitat in Cap. b. part.

Rami cortice albo. Folia sessilia inferius opposita superiora alterna,
crassa, margine ciliis albidis rigidis serrulatis, pellucida cenna in meo
glabra. Squa. flos terminalis ~~foliis~~ ^{supra} ~~quibus~~ ^{perianthio} calycinis lanceolato oblongo
scarioso. Pappus helvolus semina obovata magna

Ciliata Neronia

elicifolia *Bohnelina*

perophyllum Heroniam foliis prope prostratis: pinnis decurrentibus
dentatis. Casar. 4i. vol. 3. pag. 13. tab. 228.
Habitat in non Hispania 0

non vid.

caroliniana Pt. folus radicalibus aggregatis gramineis pilosis,
paleis receptaculis setis simplicibus Walz. fl. Caro. p. 202
Habitat in Carolina

non vid.

Appalathasi ^{montis} Pteronia foliis fasciculatis basi ^{filiformibus} linearibus basi denticulis ciliatis, pedunculis
uni floris calycibus integris.

Habitat in Cap. b. Speitz

Prodest ramis teretibus elongatis, ^{+ utraque ap.} pinnatis, pinnis pinnatis ^{glabra} pinnatis

+ more Appalathou ^{no} folia ^{no} parva fasciculata ^{no} filiformia basi utroque denticulo 3-4.
remota ^{no} pinnis albis ciliata. Pedunculi terminalis uni flori foliolis
nonnullis adpressis. Calyx imbricatus flavescens basi foliolis lanicista
tis acuminatis integerrimis, can natis. Receptaculi ^{seeds} foris multiparti
tis petalici. Semina ^{seeds} radii aperiunt. Semina obovata glaberrima
fusca, compressa

Pteronia fruticosa foliis parvis fasciculatisque filiformibus basi subci
liatis, foliolis calycinis integris, receptaculi foris multipartiti
petalici Hort. kew. 3. p. 162.

palmaria lycop